


سرطان او د چاپیریال رادیو اکتیویټي

پوهنوال ډاکټر نظر محمد سلطاني

ارواښاد ډاکټر حاجي محمد سلطاني

ډاکټر غازي محمد سلطاني

Afghanic



ننگرهار طب پوهنځی

Pashto PDF
2014

Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan

Cancer & Environmental Radioactivity

Dr rer nat Nazar M Sultansei

Dr med Haji M Sultansei


Dr med Ghazi Sultansei

Download: www.ecampus-afghanistan.org



ننگرهار طب پوهنځی

سرطان او د چاپیریال رادیو اکتیویټي



پوهنوال ډاکټر نظر محمد سلطاني
ارواښاد ډاکټر حاجي محمد سلطاني
ډاکټر غازي محمد سلطاني



۱۳۹۳




Nangarhar Medical Faculty

Afghanic

Dr rer nat Nazar M Sultansei
Dr med Haji M Sultansei
Dr med Ghazi Sultansei

Cancer & Environmental Radioactivity

Funded by
Kinderhilfe-Afghanistan



2014

سرطان او د چاپیریال رادیو اکتیویټي

Cancer & Environmental
Radioactivity

پوهنوال ډاکټر نظر محمد سلطاني
ارواښاد ډاکټر حاجي محمد سلطاني
ډاکټر غازي محمد سلطاني

۱۳۹۳

بسمه تعالی

سرطان او د چاپیریال رادیواکتیویټي

دوهم چاپ

۱۳۹۳ هـ

پوهنوال ډاکټر نظر محمد سلطاني خُدران، ارواښاد الحاج حاجي محمد سلطاني خُدران،

ډاکټر غازي محمد سلطاني خُدران

د کتاب نوم	سرطان او د چاپیریال رادیواکتیویټي
لیکوالان	پوهنوال ډاکټر نظر محمد سلطانی خدران، ارواښاد الحاج حاجی محمد سلطانی خدران، ډاکټر غازی محمد سلطانی خدران
خپرندوی	تنګرهار طب پوهنځی
ویب پاڼه	www.nu.edu.af
چاپ شمېر	۱۰۰۰
د چاپ کال	۱۳۹۳، دوهم چاپ
ډاونلوډ	www.ecampus-afghanistan.org
چاپ ځای	افغانستان تایمز مطبعه، کابل

دا کتاب د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمټې په جرمني کې د Eroes کورنۍ یوې خیریه ټولنې لخوا تمویل شوی دی.

اداري او تخنیکي چارې یې په آلمان کې د افغانیک لخوا ترسره شوې دي.

د کتاب د محتوا او لیکنې مسؤلیت د کتاب په لیکوال او اړونده پوهنځی پورې اړه لري. مرسته کوونکي او تطبیق کوونکي ټولنې په دې اړه مسؤلیت نه لري.

د تدریسي کتابونو د چاپولو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ:

ډاکټر یحیی وردک، د لوړو زده کړو وزارت، کابل

تیلیفون ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

ایمیل textbooks@afghanic.org

د چاپ ټول حقوق له مؤلف سره خوندي دي

ای اس بی ان ۷-۲۴ - ۸۹۳۹۰۹ - ۱



د لوړو زده کړو وزارت پيغام

د بشر د تاريخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په لاسته راوړلو کې ډير مهم رول لوبولی دی او د درسي نصاب اساسي برخه جوړوي چې د زده کړې د کيفيت په لوړولو کې مهم ارزښت لري. له همدې امله د نړيوالو پيژندل شويو ستندردونو، معيارونو او د ټولنې د اړتياوو په نظر کې نيولو سره بايد نوي درسي مواد او کتابونه د محصلينو لپاره برابر او چاپ شي.

د لوړو زده کړو د مؤسسو د ښاغلو استادانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې ډېر زيار يې ايستلی او د کلونو په اوږدو کې يې په خپلو اړوندو څانگو کې درسي کتابونه تأليف او ژباړلي دي. له نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخه هم په درنښت غوښتنه کوم تر څو په خپلو اړوندو برخو کې نوي درسي کتابونه او نور درسي مواد برابر کړي څو تر چاپ وروسته د گرانو محصلينو په واک کې ورکړل شي.

د لوړو زده کړو وزارت دا خپله دنده بولي چې د گرانو محصلينو د علمي سطحې د لوړولو لپاره معياري او نوي درسي مواد برابر کړي.

په پای کې د افغان ماشومانو لپاره د جرمنی کمیټی او ټولو هغو اړوندو ادارو او کسانو څخه مننه کوم چې د طبي کتابونو د چاپ په برخه کې يې هر اړخيزه همکاري کړې ده.

هيله مند یم چی نوموړې پروسه دوام وکړي او د نورو برخو اړوند کتابونه هم چاپ شي.

په درنښت

پوهاند ډاکټر عبیدالله عبید

د لوړو زده کړو وزیر

کابل، ۱۳۹۳

د درسي کتابونو د چاپ پروسه

قدرمنو استادانو او گرانو محصلينو!

د افغانستان په پوهنتونونو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی له لویو ستونزو څخه ګڼل کېږي. یو زیات شمیر استادان او محصلین نوي معلوماتو ته لاس رسی نه لري، په زاړه میتود تدریس کوي او له هغو کتابونو او چپترونو څخه ګټه اخلي چې زاړه دي او په بازار کې په ټیټ کیفیت فوتوکاپي کېږي.

د دې ستونزو د هوارولو لپاره په تېرو درو کلونو کې مونږ د طب پوهنځیو د درسي کتابونو د چاپ لړۍ پیل او تر اوسه مو ۱۳۶ عنوانه طبي درسي کتابونه چاپ او د افغانستان ټولو طب پوهنځیو او نورو ادارو لکه عامې روغتیا وزارت، د علومو اکاډمي، روغتونونو او نورو... ته استولي دي.

دا کړنې په داسې حال کې تر سره کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د (۲۰۱۰-۲۰۱۴) کلونو په ملي ستراتیژیک پلان کې راغلي دي چې:

"د لوړو زده کړو او د ښوونې د ښه کیفیت او زده کوونکو ته د نویو، کره او علمي معلوماتو د برابرولو لپاره اړینه ده چې په دري او پښتو ژبو د درسي کتابونو د لیکلو فرصت برابر شي د تعلیمي نصاب د ریفورم لپاره له انګریزي ژبې څخه دري او پښتو ژبو ته د کتابونو او درسي موادو ژباړل اړین دي، له دې امکاناتو څخه پرته د پوهنتونونو محصلین او استادان نشي کولای عصري، نویو، تازه او کره معلوماتو ته لاس رسی پیدا کړي".

د افغانستان د طب پوهنځیو محصلین او استادان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نویو درسي موادو او معلوماتو ته نه لاس رسی، او له هغو کتابونو او چپترونو څخه کار اخیستل چې په بازار کې په ډېر ټیټ کیفیت پیدا کېږي، د دې برخې له ځانګړو ستونزو څخه ګڼل کېږي. له همدې کبله هغه کتابونه چې د استادانو له خوا لیکل شوي دي باید راټول او چاپ کړل شي. د هیواد د اوسني حالت په نظر کې نیولو سره مونږ لایقو ډاکترانو ته اړتیا لرو، ترڅو وکولای شي په هیواد کې د طبي زده کړو په ښه والي او پرمختګ کې فعاله ونډه واخلي. له همدې کبله باید د طب پوهنځیو ته لا زیاته پاملرنه وشي.

تراوسه پورې مونږ د ننگرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ او کاپیسا د طب پوهنځیو او کابل طبي پوهنتون لپاره ۱۳۶ عنوانه مختلف طبي تدریسي کتابونه چاپ کړي دي. د

ننگرهار طب پوهنځی لپاره د ۲۰ نورو طبي کتابونو د چاپ چارې روانې دي. د يادونې وړ ده چې نوموړي چاپ شوي کتابونه د هيواد ټولو طب پوهنځيو ته په وړيا توگه ویشل شوي دي.

ټول چاپ شوی طبي کتابونه کولای شي د www.ecampus-afghanistan.org ويب پاڼې څخه واخلو او نلورې کړي.

کوم کتاب چې ستاسې په لاس کې دي زموږ د فعاليتونو يوه بېلگه ده. موږ غواړو چې دې پروسې ته دوام ورکړو، ترڅو وکولای شو د درسي کتابونو په برابرولو سره د هيواد له پوهنتونو سره مرسته وکړو او د چپټر او لکچر نوټ دوران ته د پای ټکی کېږدو. د دې لپاره دا اړينه ده چې د لوړو زده کړو د موسساتو لپاره هر کال څه نا څه ۱۰۰ عنوانه درسي کتابونه چاپ کړل شي.

د لوړو زده کړو د وزارت، پوهنتونونو، استادانو او محصلينو د غوښتنې په اساس په راتلونکې کې غواړو چې دا پروگرام غير طبي برخو لکه ساينس، انجنيري، کرهڼې، اجتماعي علومو او نورو پوهنځيو ته هم پراخ کړو او د مختلفو پوهنتونونو او پوهنځيو د اړتيا وړ کتابونه چاپ کړو.

له ټولو محترمو استادانو څخه هيله کوو، چې په خپلو مسلکي برخو کې نوي کتابونه وليکي، وژباړي او يا هم خپل پخواني ليکل شوي کتابونه، لکچر نوټونه او چپټرونه ايډېټ او د چاپ لپاره تيار کړي. زموږ په واک کې يې راکړي، چې په ښه کيفيت چاپ او وروسته يې د اړوندې پوهنځۍ استادانو او محصلينو په واک کې ورکړو. همدارنگه د يادو شويو ټکو په اړوند خپل وړاندیزونه او نظريات زموږ په پټه له موږ سره شريک کړي، ترڅو په گډه پدې برخه کې اغيزمن گامونه پورته کړو.

له گرانو محصلينو څخه هم هيله کوو چې په يادو چارو کې له موږ او ښاغلو استادانو سره مرسته وکړي.

د يادونې وړ ده چې د مولفينو او خپروونکو له خوا پوره زيار ايستل شوی دی، ترڅو د کتابونو محتويات د نړيوالو علمي معيارونو په اساس برابر شي، خو بيا هم کيدای شي د کتاب په محتوی کې ځينې تيروتنې او ستونزې وجود ولري، نو له درنو لوستونکو څخه هيله مند يو ترڅو خپل نظريات او نيوکې مولف او يا موږ ته په ليکلې بڼه را وليږي، ترڅو په راتلونکې چاپ کې اصلاح شي.

د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې او د هغې له مشر ډاکټر ایروس څخه ډېره مننه کوو چې د دغه کتاب د چاپ لگښت یې ورکړي دي دوی په تیرو کلونو کې هم د ننګرهار د طب پوهنځي د ۴۰ عنوانه طبي کتابونو د چاپ لگښت پر غاړه درلود.

په ځانګړي توګه د جې آی زیت (GIZ) له دفتر او (CIM) Center for International Migration & Development چې زما لپاره یې په تېرو څلور کلونو کې په افغانستان کې د کار امکانات برابر کړي دي هم د زړه له کومې مننه کوم.

د لوړو زده کړو له محترم وزیر ښاغلي پوهاند ډاکټر عبیدالله عبید، علمي معین ښاغلي پوهنوال محمد عثمان بابري، مالي او اداري معین ښاغلي پوهنوال ډاکټر گل حسن ولیزي، د ننګرهار پوهنتون رییس ښاغلي ډاکټر محمد صابر، د ننګرهار طب پوهنځي رییس ښاغلي ډاکټر خالد یار، د ننګرهار طب پوهنځي علمي مرستیال ښاغلي ډاکټر همایون چارديوال، د پوهنتونو او پوهنځیو له ښاغلو رییسانو او استادانو څخه هم مننه کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ یې هڅولې او مرسته یې ورسره کړې ده.

همدارنګه د دفتر له همکارانو احمد فهیم حبیبی، سبحان الله او حکمت الله عزیز څخه هم مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې یې نه ستړې کیدونکې هلې ځلې کړې دي.

ډاکټر یحیی وردګ، د لوړو زده کړو وزارت

کابل، فبروري ۲۰۱۴

د دفتر ټیلیفون: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

ایمیل: textbooks@afghanic.org

wardak@afghanic.org

تقریظ

په وروستیو څو کلونو کې په هېواد کې د پوهې او علم په برخه کې یوڅه پرمختګونه شوي دي، چې ورسره د ښوونځیو، مسلکيې انستیتونو، پوهنتونونو او محصلینو په کمیت کې زیاتوالی راغلی دی.


که له یوې خوا پوهنتونونه د کمیت په لحاظ ډیر شوي دي، نو له بل پلوه اړینه ده چې د لوړو زده کړه کیفیت ته زیاته توجه وشي.

زموږ په وطن کې علمي او نوی آثار لاتر اوسه هم ډیر کم دي، خدای وکړي چې د داسې تدریسي کتابونو لیکل او چاپول به دغه تشه یوڅه ډکه کړي. هیله مند یوو چې زموږ نور استادان هم تشویق شي، ترڅو په خپلو مسلکي برخو کې نوي علمي کتابونه وليکي.


دغه کتاب د ننګرهار د طب پوهنځي لخوا وکتل شو، ښه معیاري او د محصلینو لپاره ګټور کتاب دی.

موږ د لیکوال دغه زیار ستایو، د لوی خدای ج له دربار څخه نوموړي ته د نورو بریاوو هیله کوو.

د ننګرهار د طب پوهنځي



(ډي اين اي DNA)



Vorwort

Es gibt im Bereich der Naturwissenschaften kaum ein Fachbuch in der offiziellen afghanischen Landes Sprache Pashtu, das als Lehrbuch oder als wissenschaftliche Bezugsquelle für Studenten und Assistenzärzte zur Verfügung steht. Die Autoren haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre langjährigen klinischen Erfahrungen auf dem Gebiet der diagnostischen Radiologie und Therapie der Krebskrankheit weiterzugeben und damit diesem Ziel gerecht zu werden.

Das Buch behandelt drei wichtige Fachbereiche der Naturwissenschaften, nämlich Strahlenphysik, Radiobiologie und Strahlentherapie, deren enge Zusammenhänge und theoretische Grundkenntnisse für die Therapie und Früherkennung der Krebskrankheit mit modernen bildgebenden diagnostischen Verfahren von großer Bedeutung sind.

Teil 1: Strahlenphysik (Kapitel 1-7): beschreibt die Grundlage der Atomphysik z.B. SI-Einheiten, Aufbau der Materie, Radioisotope, Radioaktivität, Strahlungsarten, Energiedosen sowie die Wechselwirkung der ionisierenden Strahlung in biologischen Geweben.

Teil 2: Radiobiologie (Kapitel 8-14): behandelt die Stochastische und deterministische Wirkung der ionisierenden Strahlen auf die Erbsubstanz (DNA) und biologische Gewebe. Dabei werden die Zusammenhänge zwischen der Umweltkontamination mit radioaktiven, chemischen und biologischen Stoffen und Entstehungsmechanismen der Krebskrankheit anhand epidemiologisch-statistischer Untersuchungen dargestellt. Mutation der somatischen Zelle wird als mögliche Ursache für die Entstehung einer Krebszelle angesehen. Im Kapitel zehn wird die Abschätzung der Gefahr des abgereicherten Urans diskutiert, falls die Umwelt mit diesem radioaktiven Material kontaminiert wird. Schließlich wird der sogenannte "Bystander Effect" vorgestellt, der als neueste Erkenntnis über die Wirkung der „low-level radiation“ in den Zellen entdeckt wurde.

Teil 3: Krebskrankheit (Kapitel 15-18): gibt allgemeine Informationen über die Krebskrankheit und beschreibt in Grundzügen die Behandlung der Krebskrankheit mit Strahlentherapie, Chemotherapie und Operation als den drei etablierten Methoden in der modernen Medizin. Dabei wird die diagnostische Bedeutung der Computertomographie und Kernspintomographie zur Früherkennung der Krebskrankheit hervorgehoben und deren prinzipielle medizinisch physikalische Arbeitsweise beschrieben.

Im letzten Kapitel ist gemäß Atomgesetz – AtG 1959 der Schutz von Personen, Sachgütern und der Umwelt vor den Wirkungen ionisierender Strahlung ausführlich erklärt. In diesem Zusammenhang sind die Errichtung einiger Mess-Stellen im Land vorgeschlagen worden, um die Umweltradioaktivität z.B. mit Hilfe von Gammaskpektrometrie zu überwachen.


Im Anhang des Buches sind medizinische Fachausdrücke alphabetisch zusammengestellt und in Pashtu ausführlich erklärt. Ein Sachregister in Pashtu ermöglicht dem Leser einen bestimmten Fachausdruck schnell wiederzufinden. Zu jedem Kapitel gibt es Fragen mit Antworten im Anhang, damit der Leser seine Kenntnisse zu dem jeweiligen Sachgebiet selber überprüfen kann.



(ډي اين اي DNA)

د

سرطان اود چاپېريال راډيو اکتیویتي



تقریظ

دمحترم پوهانو هريو پوهنوال ډاکتر نظر محمد سلطانزی ځدران ، خدای بښلي ډاکتر حاجي محمد سلطانزی ځدران ، او ډاکتر غازي محمد سلطانزی ځدران ، اثرمی چی د (سرطان اود چاپېريال راډيو اکتیویتي) تر عنوان لاندې په یوولسو برخو او نولسو فصلونو کی لیکل شوی دی ، سرتريايه په غور سره ولوست . په دغه کتاب کې لاندې موضوعات په ډېره ښه او روانه پښتوليکل شوي دي . لکه : دواحدونونړیوال سیستم - دورانگود فیزیک د اصطلاحاتونوم اېښودنه - دورانگود فیزیک بنسټیزه پوهه - طبیعی راډيو اکتیویتي - وړانگې - د مادې سره دایونایزوونکو وړانگو ټکر - کلینیکي ډوزیمتری - د بدن په حجره دایونایزوونکو وړانگوفیزیکي ، کیمیاوي ، اوبیالوژیکي اغېزې - دیورانیم دلاسته راوړلو اورایستلوتکنالوژي - په چاپېريال باندې د خوار شوي یورانیم اغېزې - په روغتیا باندې دورانگوناوره اغېزې - دورانگوناروغۍ - دورانگونه ساتنه - دطبیعی وانگوسرچینې - دسرطان دخطر احتمالي اټکل - دورانگود اندازه کولوتگلارې - دچاپېريال اکتیویتي څارنه اودسرطان ناروغۍ .

کله چې موضوعاتوته نظر واچوو نوښږې په سلوکی شپيته برخې فیزیکی مسایل احتواکوي او په سلوکی ۴۰ برخې طبي اوبیولوژیکي موضوعات احاطه کوي . څرنگه چې دکابل پوهنتون دساینس دپوهنځی د فیزیک په دیپارتمنت کې دهستی پنامه مضمون دلکچر (لولانه) په ډول اودهستی تطبیقی برخه دتطبیقاتوپه ډول دمضمون په حیث لوستل کیږي . نوزه په پوره باور سره ویلای شم چی د فیزیک دیپارتمنت له دې کتاب څخه دیوه ښه معتبر درسي کتاب په حیث استفاده کولای شي ، همدارنگه دطب په ساحاتواوهم دیولوژی په برخه کې یوگټور کتاب اوماخذدی . دنوموړو موضوعاتوپه لیکنه کې له ډېر دقت څخه کار اخستل شوی اوله ډیرونووماخذو څخه استفاده شوې ده . زه نوموړی اثر نه یواځی تائیدوم بلکه دقدروپی بولم اودافغانستان لپاره یې ستره سرمایه گڼم اوفکر کوم چې په دغه موضوع کې تراوسه چاداسې اثر نه دی لیکلای . نوزه له پاک خدای څخه دنوموړي کتاب لیکوالانوته دبریاوو غوښتونکی یم . پاتې دنه وي چی دکتاب په پای کې انگلیسي علمي اصطلاحات په ډیره روانه پښتو ژباړل شوي چی دا هم ددې علم مینه والوته ډېر ښه اوبارزښته معلومات دي .

په درناوی

پوهاند دکتور نور احمد میرازی
دکابل پوهنتون دساینس پوهنځی
دبیالوژي دیپارتمنت آمر

کابل: ۲۰۰۷/۸/۴

مننه

دهغوځپلوانو نومونه باید په ډیر درنښت اومننې سره یادکړم، چې ددې کتاب په بشپړ کولو کې یې راسره تخنیکي او معنوي هر اړخیزه مرسته کړې ده.

دخپلې گرانې میرمنې حضرت بي بي سلطانزې خُدران دزړه له کومې خاوند پالنې څخه مننه کوم، چې لږ څه دوه کاله یې، د دې کتاب په لیکلو اوبشپړ کولو کې، ستره حوصله وښودله او هر اړخیزې کورنۍ ستونځې یې په ویا له تنده په ځان ومنلې.

د تنکي اوځوان تکړه زوی وحید جان سلطانزې خُدران دکمپیوټري هراړخیزې مرستې او وړاندیزونو څخه دزړه له کومې خوښې او مننه کوم.


په پای کې دتولو هغو دوستانو اوملگرو هراړخیز ملاتړ څخه ډیره خوښې څرگندوم، چې دیوه داسې ځانگړي اوبې ساري، طبي، ساینسي، پښتو ژبې پوهنتوني اثر لیکلоте یې وه هڅولم .

نظر محمد سلطانزې خُدران اوملگري لیکوالان


دجرمني هیواد، داپریل میاشت، ۲۰۰۷ م کال

دمطالبولرلیک


شمیره	سرلیک	مخ
۱	دلیکوالاتولومړنی خبرې اود کتاب ځانګړتیاوې.....	ث
۲	سریزه	خ
۳	لومړی څپرکی لومړی برخه دواحدونونړیوال سیستم..... (International System of units = SI)	1
۴	دویم څپرکی دورانګو فزیک اصطلا حونه (نومونپوهنه)..... (Radiation Physics Terminology)	9
۵	د ریم څپرکی دورانګو فزیک بنسټیز پوهه..... (Fundamentals of Radiation Physics)	17
۶	څلورم څپرکی طبیعی رادیواکتیویټي..... (Natural radioactivity)	26
۷	پینځم څپرکی ورانګي..... (Radiation)	51
۸	شپږم څپرکی دمادې (توکی) سره د ایونایزکونکو وړانګو غبرګون..... (Interaction of ionizing radiation with matter)	78



95	اووم څپرکی کلینیکي ډوزیمټري..... (Clinical dosimetry)	۹
130	دریمه برخه اتم څپرکی د بدن په حجرو (ژونکو) باندې د ایوانایزکونکو وړانګو فزیکي، کیمیاوي او بیالوژیکي اغیزې..... (Physical, biological and chemical effects of ionizing radiation on body cells)	۱۰
155	څلورمه برخه نهم څپرکی د یورانیم د لاس ته راوړلو او راییستلو ټکنالوژي..... (Uranium mining and production)	۱۱
167	پینځمه برخه لسم څپرکی په چاپیریال باندې د غریب شوي یورانیم اغیزې..... (Environmental effects of depleted uranium)	۱۲
184	شپږمه برخه یوولسم څپرکی په روغتیا باندې د وړانګو ناوړه اغیزې..... (Health hazards of radiation effects)	۱۳
226	دوولسم څپرکی دورانګو ناروغي سپندروم..... (Radiation sickness syndrome)	۱۴
240	اوومه برخه دیا رلسم څپرکی دورانګو نه ساتنه..... (Radiation Protection)	۱۵



251	اتمہ برخہ ځوارلسم څپرکی د طبیعی وړانگوسرچینې..... (Natural radiation sources)	۱۶
255	نهمه برخه پینځلسم څپرکی د سرطان خطر احتمال اټکل..... (Estimating the risk of cancer Probability)	۱۷
282	لسمه برخه شپاړلسم څپرکی دورانگو اندازه کولوتگلارې..... (Radiation Measurement methods)	۱۸
292	اوولسم څپرکی د چاپیریال اکتیویټي څارنه..... (Environmental Radioactivity monitoring)	۱۹
298	یوولسمه برخه اتلسم څپرکی د سرطان ناروغي..... (Cancer disease)	۲۰
347	دوولسمه برخه نونسم څپرکی لنډیز - آخرنی خبرې او پایله..... (Conclusion)	۲۱
356	آخونه (References)	۲۲
369	ویپانگه (Glossary)	۲۳
391	ملونه Appendices	۲۴



لومړۍ برخه

لومړۍ څپرکۍ

دواحدونو نړيوال سيستم

(International System of units = SI)

په ۱۹۶۰ م کال کې دواحدونو نړيوال سيستم چې لنډيز يې په SI سره کيږي منځ ته راغی. په نوموړي سيستم کې کتله په کيلوگرام، وخت په ثانيه او اوږدوالی په متر سره بنودل کيږي او د متر-کيلوگرام-ثانيه (meter-kilogram-second = mks) په بڼه ليکل کيږي.


د فزيکي کميت نوم	بنسټيز کميت	د واحد علامه	د واحد نوم
اوږدوالی (طول)	length	متر	m
وخت	time	ثانيه	s
کتله	mass	کيلوگرام	kg
دبريننا شدت	electric current	امپير	A
تودوخه (حرارت)	temperature	کېلوين	K
دنور يا رڼا شدت	luminous intensity	کانډېلا	cd
دمادي کچه يا اندازه	amount of substance	مول	mol

۱- جدول: نړيوال بنسټيز واحدونه

يوه دقيقه = ۶۰ ثانيې 1 min = 60 s

يو ساعت = ۳۶۰۰ ثانيې (1h = 3600 s)

يوه ورځ = ۲۴ ساعته = ۸۶۴۰۰ ثانيې (1d = 86400 s)




د فزیکي کمیت نوم				واحد
انرجي (انرژي)	جول یاژول	J	$1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$	1 Joule
بریننا یزو لټج	ولټ	V	1 J/As	1 Volt
بریننا یز چارج	کولومب	C	1As	1 Coulomb
قوه (خواک)	نیوتن	N	$1 \text{ J/m} = 1 \text{ kgm/s}^2$	1 Newton
فشار	پاسکال	Pa	1 N/m^2	1 Pascal
فریکونس په یوه ثانیه کې د اهتزازو شمیر	هرخ	Hz	1/s	1 Herz
د رادیواکتیویټي واحد اومساوي ده : یوه تجزیه په ثانیه کې	بیکارل	Bq	1 decay/s	1 Becquerel
په یوکیلوگرام هوا کې دایونو دوز یا دچارجونو اندازه	کولومب پر کیلوگرام	1C/kg	As/kg	Ion dose
انرژي دوز یا د انرژي اندازه	گری	1 Gray = Gy	1 J/kg	Energy dose
اغیزمن دوز	گری	1 Gray = Gy	1 J/kg	Effective dose
معادل دوز	سیورت	1Sievert = Sv	1 J/kg	Equivalent dose

۲- جدول: مشتق شوي واحدونه چې د بنسټیزو واحدونو د حاصل تقسیم اوحاصل ضرب څخه ترلاسه کیږي.
 دبریننا جریان هغه شدت ته وایي چې دیوهادې په ساره سطحې نه او په یوه ثانیه کې یو کولومب چارج اویا د $6,24 \times 10^{18}$ کچه بنسټیز چارجونه تیر شي (1 Ampere = Coulomb/second).




۱- شکل: دبریننا جریان شدت دالکترونو تیریدلو شمیر په واحد ثانیه اوساره سطحه بنودل شوی دی



د فزیکي کمیت پخوانی نوم	نړیوال واحد	پخوانی واحد
یو رونتگن: roentgen هغه اندازه ایونونه چې په یوه سا نتي متر مکعب وچه هواکې تر عادي تودوخي او فشار لاندې منځ ته راځي	2,58x10 ⁻⁴ C/kg	1 Roentgen = R =
	1C /kg	3876 Roentgen =
په هواکې دیو رونتگن وړانگو انرژي دوز	0,87 cGy	R = 1 Roentgen =
راد: rad = radiation absorbed dose په یو کیلوگرام ماده کې جذب شوي انرژي	1 Gray = Gy	100 rad =
	0,01 Gy	1 rad =
رېم: rem = roentgen equivalent man دانرژي دوزیا معادل دوز پخوانی واحد	1 Sv	100 rem =
	0,01 Sv	1 rem =
کیوري: Curie (Ci) یو کیوري د اوه دیرش گیکا بېکاریل سره مساوي دي	3,7x10 ¹⁰ Bq	1 Ci =
	37 GBq	1 Ci =
یو ملي کیوري مساوي دی په 37 مېگا بېکاریل	37 MBq	1 mCi =

۳ - جدول: دکلینیکي دوزیمتر پخوا نیواو نړیوال واحد سیستم ترمنځ اړیکې بنودل شوي دي.

سمبول	پخوانی واحد	نړیوال واحد	فزیکي کمیت
1 Ci = 3,7 . 10 ¹⁰ Bq 1 Bq = 2,7 . 10 ⁻¹¹ Ci	کیوري Curie (Ci)	Becquerel (Bq) 1 Bq = 1/s بېکاریل	اکتیویتی Activity
1 rd = 0,01 Gy 1 Gy = 100 rd	راد Rad (rd)	Gray (GY) 1 Gy = 1 J/kg ګري	انرژي دوز Energy dose
1 rem = 0,01 Sv 1 Sv = 100 rem	ریم Rem (rem)	Sievert (Sv) 1 Sv = 1 J/kg سیورټ	معادل دوز Equivalent dose
1 R = 2,58 . 10 ⁻⁴ C/kg 1 C/kg = 3876 R	رونټگن Roentgen ®	Coulomb per Kilogramm (C/kg) کولومب تقسیم په کیلوگرام	ایون دوز Ion dose




E	10^{18}	Exa	ایکسا	یو ترلیون
P	10^{15}	Peta	پېټا	یو بیلیرد
T	10^{12}	Tera	ټېرا	یو بیلون
G	10^9	Giga	گیگا	یو میلیار
M	10^6	Mega	مېگا	یو میلیون
k	10^3	Kilo	کیلو	1000
h	10^2	Hekto	هېکټو	100
da	10^1	Deka	دېکا	10
d	10^{-1}	Dezi	دیسې	0,1
c	10^{-2}	Zenti	سانتي	0,01
m	10^{-3}	Milli	ميلي	0,001
μ	10^{-6}	Mikro	میکرو	0,000001
n	10^{-9}	Nano	نانو	0,0000000001
p	10^{-12}	Pico	پیکو	لس په طاقت د منفي دوولس
f	10^{-15}	Femto	فېمټو	لس په طاقت د منفي پنځلس
a	10^{-18}	Atto	اتو	لس په طاقت د منفي اتلس

۴- جدول: دواحدونو غټې او کوچنۍ برخې دطاقت په عدد(شمیره) سره بنودل شوي دي.

دپام وړ: په هستوي فزیک کې داورډوالي (length) لپاره اوس هم دفرمي واحد Fermi unit کارول کېږي. که څه هم فرمي دنړیوال واحد سیستم SI پورې اړه نه لري خو دایتالوي فزیک پوه او نوبل جایزې گټونکي علمي شخصیت اینریکو فرمي(Enrico Fermi) په افتخار سره داورډوالي لپاره اوس هم لکه داتوم شعاع، دپروتون او نیوترون شعاع په فرمي سره بنودل کېږي. دبیلګې په ډول دطلا اټوم دهستی شعاع لږ څه اته نیم فرمي 8,5 fermi اوردوالی لري.

$$1 \text{ fermi} = 1 \times 10^{-15} \text{ m} = 1 \text{ fm} = 0,001 \text{ pm} = 1000 \text{ am}$$




فزيكي كميت	واحد	شميره (عد د)	سمبول
بنسټيز چارج	C	$1,6021892 \cdot 10^{-19}$	e_0
په فضا کې دنور سرعت	ms^{-1}	$2,9979246 \cdot 10^8$	c
ډيپلانک اغيزمن کوانتم	J s	$6,626176 \cdot 10^{-34}$	h
ډپروتون کتله	kg	$1,6726485 \cdot 10^{-27}$	m_p
ډنيوترون کتله	kg	$1,6749543 \cdot 10^{-27}$	m_n
ډالکترون کتله	Kg	$9,109534 \cdot 10^{-31}$	m_e
ډاووگاد رو شميره	mol^{-1}	$6,022045 \cdot 10^{23}$	N_A
ډيوه کيلوگرام کتلي معادل هستوي انرژي	J	$8,98755 \cdot 10^{16}$	$1 \text{ kg } c^2$
ډيوکيلو گرام TNT کتلي کيمياوي انرژي	J	$4,6 \cdot 10^6$	1 kg TNT
1 kg TNT- Äquivalent ډيوه کيلوگرام تي ان تي معادل حرارتي انرژي	J	$4,184 \cdot 10^6$	1 Mcal _{th}
ډيوې کالوري حرارتي انرژي	J	4,184	1 cal thermic
ډاتوم کتلي واحد	kg MeV/c^2 J/c^2	$1,660 \cdot 10^{-27}$ 931,50 $1,4924 \cdot 10^{-10}$	$m_u = u$ $m_u = u$ $m_u = u$
ډيوه الکترون کتلي معادل انرژي	eV	$5,1101 \cdot 10^5$	$m_e c^2$


۵- جدول: دهستي فزيک ځيني مهم ثابت شميري (عددونه)

ډالکترون کتله مساوي ده: $m_e \sim 0,5 \text{ MeV}/c^2$

ډپروتون کتله مساوي ده: $m_p \sim 938 \text{ MeV}/c^2$



👉 **تي ان ټي (Trinitrotoluene (TNT)** د کيمياوي او يا هستوي انرژي هغه کچه رابښي چې په يوه چاودنه کې د تودوخي په بڼه منځ ته راځي. کيمياوي فرمول يې په لاندې ډول سره دی.



د البرت اينسټاين (Albert Einstein) دکتلي او انرژي معادل فرمول سره سم د ټي انټي انرژي په لاندې ډول هم ليکلای شو

$$(1\text{kg}) c^2 = 9 \times 10^{16} \text{ joules} = 22 \text{ megatons TNT}$$

$$4.1 \times 10^9 \text{ joules} = 1 \text{ ton TNT}$$


$$(1\text{gm}) c^2 = 9 \times 10^{13} \text{ joules} = 22 \text{ kilotons TNT}$$

يو تن يانې يو زرکيلوگرام ټي ان ټي د لږ څه څلورگيگا جول سره برابري. د بيلگه په ډول هغه اتوم بم چې په دوهمه نړيواله جگړه کې دجاپان هيرو شيما بنار باندې وغورځول شو دچاودنې قوه يې شل کيلو تن 20 kiloton TNT په شاوخوا کې اټکل کيږي.

لکه چې د پورتنۍ معادلې څخه په ډاگه کيږي چې که ديوگرام يورانيم دوه سوه پينځه ټول اتومونه وچوي نو دهيروشيما اتوم بم انرژي سره سمون خوري.


1Meter = 10^9 nm	1Meter = 10^{10} Å	1Meter = 10^{15} fm	يو متر
1 second = 1s	1s = 10^3 ms	1 s = 10^6 μs	يوه ثانيه
1 Ampere = 1 A	1 A = 10^3 mA	1 A = 10^6 μA	يو امپير
1 Ampere = 1 A	1 A = 10^9 nanoA	1A = 10^{12} picoA	يو امپير
1eV = $1,6 \times 10^{-19}$ joules	1 MeV = 10^6 eV	1 GeV = 10^9 eV	1TeV = 10^{12} eV

٦- **جدول:** په پورتنۍ جدول کې دهستي فزيک ځينې گټور او يو په بل اړوونکي واحدونه بنودل شوي دي





لاندیز:

- پروتون او یا نیوترون ته نوکلئون (Nucleon) ویل کیږي؟
- یوه هسته چې د نیوترونو شمیر N او د پروتونو شمیر Z یې په ځانګړي ډول او یو په یو ټاکل شوی وي د نوکلید (Nuclide) په نوم یادېږي.
- هغه هستې چې د پروتونو شمیر Z یې یوشان خو د پروتونو شمیر N یې د یوه بل نه توپیر ولري د ایزوټوپ (Isotopes) په نامه سره یادېږي. د بېلګې په توګه U^{238} او U^{235} ; O^{16} ; O^{15} ; C^{13} ; C^{12} ;
- هغه هستې چې د نیوترونو شمیر N یې سره یوشان خو د پروتونو شمیر Z یې سره توپیر ولري د ایزوټون (Isotones) په نامه یادېږي د بېلګې په ډول لکه بورون (Boron-12) او کاربون (Carbon-13) هریو یې اوه نیوترونه لري
- هغه هستې چې د کتلې شمیره A یانې د پروتونو جمع نیوترونو شمیره یې سره یوشان وي خود پروتونو شمیره یې توپیر ولري د ایزوبار (Isobar) په نامه یادېږي. د بېلګې په ډول لکه کاربون ډولس Carbon-12 او بورون ډولس Boron-12
- داتوم کتلې واحد $1U = 1,66 \times 10^{-27} \text{kg} = 931 \text{ MeV}/c^2$
- داتوم کتلې واحد د کاربون اتوم $^{12}_6\text{C}$ یوپه ډولسمه برخه ده
- دیونوکلید X بشپړ کیمیاوي سمبول په لاندې ډول بنودل کیږي. د بېلګې په ډول لکه کاربن $^{12}_6\text{C}_6$



$$\begin{matrix} \text{Mass number} = A \\ \text{protons} = Z \quad X \quad \text{neutrons} = N \end{matrix}$$





د پروتون شعاع 10^{-13} cm ، د پروتون کتله $1,7 \times 10^{-34} \text{ g} = 938 \text{ MeV}/c^2$

د نیوترون شعاع 10^{-13} cm ، د نیوترون کتله $1,7 \times 10^{-34} \text{ g} = 940 \text{ MeV}/c^2$

دهستي شعاع $10^{-13} \text{ cm} = 10^{-15} \text{ m} = 1 \text{ Fermi} = 1 \text{ fm}$

داتوم شعاع $10^{-8} - 10^{-7} \text{ cm} = 10^{-10} - 10^{-9} \text{ m}$

داتوم کتلي واحد: $1 \text{ amu} = 1,66 \times 10^{-24} \text{ g} = 931 \text{ MeV}/c^2 = 1/12 \text{ of the mass of C-12}$

د الکترون کتله $M_e = 9,1 \times 10^{-28} \text{ g} = 0,511 \text{ MeV}/c^2$

بنسټیز زره Particle		برېښنايز چارج Charge	کتله Mass(u)
پروتون	Proton	+1	1,007277
نیوترون	Neutron	0	1,008665
الکترون	Electron	-1	0,000549

پوښتنې (Questions):

(ځوابونه يې په نونسم څپرکي کې ورکړ شوي دي)

۱-۱ دواحدونو په نړيوال سيستم SI کې د اوږدوالي، وزن او وخت فزیکي کمیتونه څرنگه تعريف شوي

دي؟

۲-۱ دراديو اکټيويتی پخوانی واحد او نړيوال واحد څه دی؟


۳-۱ یو روښن وړانګې د هوا تر عادي فشار لاندې په یو سانتي متر مکعب وچه هوا کې څو مره

انرژی تولید وي؟

۴-۱ که یو ګرام ډبره دالبرت اینشتاین د فرمول له مخې په انرژي واړوونو څومره ژول تر لاسه

کيږي اود څومره هستوي انرژي سره برابره ده؟

۵-۱ په فضا کې دنور سرعت څومره قیمت لري؟



دویم څپرکی

دورانگو فزیک اصطلا حونه (نومونپوهنه)

(Radiation Physics Terminology)

دورانگو فزیک (Radiation physic)

دورانگو فزیک یا رادیوفزیک (Radiation physic) د طبیعي علومو یوه داسې ځانګړې څانګه ده چې په ماده کې د الکترومقناطیسي وړانگو فزیکي، بیالوژیکي او کیمیاوي اغیزې تر څیړنې لاندې نیسي .

دورانگو بیالوژي (Radiobiology)

دورانگو بیالوژي د طبیعي علومو یوه څانګه تشکیلوي چې په یوه ژوندي اورګا نیزم (Organism) او بیالوژیکي ماده کې دایونایزکونکو وړانگو هر اړخیز غبرګون (عکس العمل) لکه فزیکي، بیالوژیکي، کیمیاوي او کلینیکي اغیزو څخه بحث کوي.

الکترون ولټ (Electron Volt = eV)

یوالکترون ولټ دبریننا انرژي داندازه کولو واحد ټاکل شوی دی. یوالکترون ولټ هغه کار دی چې په یوالکترون باندې دیوولټ ولټیج په توپیر سره سرته رسیږي او یا په بل عبارت کله چې یو الکترون ته د یوولټ ولټیج په کچه تعجیل ورکړشي نو هغه حرکي انرژي چې یو الکترون یې تر لاسه کوي یو الکترون ولټ قیمت لري.


$$E = qV = (1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(1 \frac{\text{J}}{\text{C}})$$

$$e = \text{electron charge} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$V = \text{voltage}$$

$$1 \text{ electron volt} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

دیوه خاڅ (Condenser) په منځ کې یو الکترون دمنفي چارج شوي لوحې څخه مثبت چارج شوي لوحې خواته خوځیږي. که چیرته د نوموړولوحو ترمنځ د پوتنسیال توپیر یوولټ قیمت ولري نو دالکترون حرکي انرژي (Kinetic energy = KE) دتعریف سره سم یو الکترون ولټه ده.



ژول یا جول (Joule = J)

د مېخانيکي انرژي واحد ته ژول (Joule = J) ویل کیږي. یو ژول هغه انرژي او یا کار ته ویل کیږي چې یو کیلوګرام کتله باندې یو نیوټن (Newton = N) قوه اغیزه وکړي او یو متر واټن یې دخپل ځای څخه وخوځوي.

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$$

قدرت یا ځواک (Power = P)

قدرت P هغه کار او یا انرژي E ته ویل کیږي چې دوخت په واحد کې سرته رسیږي. قدرت مساوي دی انرژي تقسیم (ویش) په وخت (P = E/t)

د قدرت واحد یو ژول تقسیم په یوه ثانیه ده چې دواټ Watt په نامه سره یادېږي.

$$1 \text{ watt} = 1 \text{ W} = 1 \text{ joule/second} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ Js}^{-1}$$

$$\text{Power} = \text{Energy/time}$$

قدرت = انرژي تقسیم په وخت

* **بېلګه:** یو ځوان ساینس پوه چې د جسم کتله یې پینځه اويا کیلو ګرام 75 kg ده دیوه روغتون ودانۍ د لومړي پور څخه تر اووم پور پورې د لږ څه دروشت ثانیو په موده کې (23,6 s) پورته ځغلي. که چېرته دودانۍ ارتفاع (لوړوالی) لږ څه شپږوینست متره (25,8 m) قیمت ولري. **پوښتنه:** هغه کار چې هغه تر سره کړې دی او همدارنګه هغه قدرت چې منځ ته راغلی دی محاسبه کړئ؟

* **حل:** په ساینس پوه باندې د ځمکې جاذبې قوې Force = F اغیزه مساوي ده له: کتله m ضرب د ځمکې تعجیل $g = 9,8 \text{ ms}^{-2}$

$$F = 75 \text{ kg} \times 9,8 \text{ ms}^{-2} = 735 \text{ newtons} = 735 \text{ N}$$

او هغه کار چې سرته رسیدلي مساوي ده له: قوه F ضرب د واټن (F × L)


$$E = 735 \text{ N} \times 25,8 \text{ m} = 19\,000 \text{ N m} = 19000 \text{ Joule}$$

او د قدرت له پاره لیکلای شو چې :

$$P = 19000 \text{ J} / 23,6 \text{ second} = 805 \text{ J s}^{-1} = 805 \text{ watt}$$

* **ځواب:** د نوموړي سړي قدرت لږ څه اته سوه واط دی.

د الکترون ولټ eV اود میخانيکي انرژي واحد ژول joule = J تر منځ لاندنۍ اړیکې شته دي.



$$1 \text{ Electron Volt} = 1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \times 1\text{V} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ Joule}$$

دپام وړ: ديوالکترون بريننايز چارج e_0 ته چي قيمت يي مساوي
 $e_0 = 1,60 \times 10^{-19} \text{ Coulomb}$ سره دی بنسټيز چارج ويل کيږي.


په ورځني ژوند کي د انرژي هر اړخيز ډولونه په واحد د يو الکترون ولټ	
0,04 eV	په نورمال تودوخې کي د هوا يوه ماليکول، نيوترون اويا اتومي انرژي
1, 5-3,5 eV	دنور يا رڼا انرژي
4,2 eV	هغه انرژي چي د سوډيم کلوريد NaCl د تجزيي لپاره په کارده
13,6 eV	دهايدروجن اتوم ايونايږيزشن انرژي
33 eV	دهوايوه ماليکول ايونايږيزشن انرژي
20 000 eV	ديوه الکترون انرژي چي د تلويزيون په پرده باندې لگيږي
200 000 eV (= 0,2 MeV)	دنارو غيو په پيژندنه کي د اکسريز سرچيني فوتونو انرژي
0 - 3 MeV	دهستي په تجزيه کي د گاما وړانگو Gamma rays انرژي
0 - 3 MeV	دهستي په تجزيه کي د بېټا وړانگو Beta rays انرژي
2 - 10 MeV	دهستي په تجزيه کي د الفا وړانگو Alpha rays انرژي
1 MeV - 1000 TeV	د کازميکي وړانگو Cosmic rays انرژي
3727, 379 MeV	دالفا وړانگي دکتلي معادل انرژي $m_\alpha c^2$

داتومي کتلي واحد (Atomic Mass Unit = amu = 1u)

په هستوي فزيک کي داتومونو او ماليکولو کتلي لپاره يو ځانگړی واحد ټاکل شوی چي د اتومي کتلي په واحد سره ياديږي. داتومي کتلي واحد (1u) د خنثی او په کيمياوي ډول نه تړل شوی کاربون ($^{12}\text{C}_6$) اتوم مطلقه کتلي يو پر دوولسمه برخه ټاکل شوي ده. د نوموړي کاربون ايزوټوپ په هسته کي شپږ پروټونه او شپږ نيوترونه لري چي د کتلي نمبر يي دوولس اووزن يي د هايدروجن اتوم په پرتله لږ څه دوولس ځله دروند دی. داتومي کتلي واحد لپاره ليکلای شو چي:

داتومي کتلي واحد 1 U د خنثی کاربون اتوم کتلي ($^{12}\text{C}_6$) چي د هستي چارج نمبر يي شپږ او د کتلي نمبر يي دوولس دی يو په دوولسمي برخي ($1 \text{ U} = 1/12 \text{ mass } ^{12}\text{C}_6$) سره مساوي دی

د بلې خوا داتومي کتلي واحد 1 U دکاربون اتوم کتلي په واحد ډمول $m_{\text{mol}}(^{12}\text{C}_6)$ او داووکادرو عدد(شميره) د (Avogadro constant) دحاصل تقسيم څخه هم تر لاسه کيدای شي.



$$1u = \frac{m_{\text{carbon}}}{12} = \frac{m_{\text{mol,exp}}(^{12}\text{C})}{12} \frac{1}{6,022 \times 10^{23} / \text{mol}} = 1,661 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

په پورتنۍ معادله کې داوواگادرو عدد (شمیره) مساوي دې له: $(N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ per mole})$ کله چې داتومي کتلې واحد u د نور سرعت په مربع c^2 سره ضرب کړو نوډالبرت اینشتاین $A.Einstein$ نامتوفرمول سره سم دکتلي معادل انرژي ترلاسه کيږي. **$1 u \times c^2 = 931,50 \text{ MeV}$**

$$1u = 1,6606 \times 10^{-27} \text{ kg} = 931,50 \text{ MeV} / c^2 = 1,4924 \times 10^{-10} \text{ J} / c^2$$

دپام وړ: په فضا کې دنور سرعت c لږڅه $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ یانې دری سوه زره کیلومتره په یوه ثانیه کې قیمت لري.

د اوواگادرو ثابت یا عدد (Avogadro constant)


په یوه مول ماده کې دهستوي ذروشمیر ته د اوواگادرو ثابت ویل کيږي. که چیرته دیوه عنصر داتوم نسبي کتله په ګرام سره وښیو نوډ مادي یو مول واحد تر لاسه کيږي. د بېلګه په ډول د اوبویو مول نسبي کتله اتلس ګرام وزن لري $(2g+16g=18g)$. نو په یوه مول $(\text{Mole} = \text{Mol})$ ماده کې د فشار او تودوخي په عادي حالت کې داتومونو شمیر د اوواگادرو عدد (شمیره) یانې شپږ ضرب دلس په طاقت د درویشت اتمونو $(N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ per mole})$ سره مساوي دی.

مول (Mole=Mol)

مول د واحداتو په نړیوال سیستم کې د یوې مادي واحد ټاکل شوی دی. یو مول دیوې مادي هغومره کتلې ته ویل کيږي چې داوواگادرو عدد $N_A = 6,022 \times 10^{23}$ په شمیر سره اتمونه، مالېکولونه، الکترونه او یا نورې ذرې پکې شتون ولري. نو که چیرته دیوې مادي دعنصر داتوم وزن (Atomic weight) په ګرام سره وښیونوکتله یې یومول کيږي او داوواگادروشمیرپه اندازه ذرې پکې شته دي. د بېلګې په ډول دسودیم عنصر اتمومي وزن درویشته دی. نو یو مول سودیم په دې مانا چې که د نوموړي عنصر اتمومي وزن په ګرام سره وښیو نوویلاې شو چې درویشته ګرامه سودیم $(23 \text{ gramm Sodium})$ داوواگادروشمیر په کچه یا اندازه سره اتمونه لري چې کتله یې دیوه مول سره یوشان ده. همدارنګه دامونیاک کیمیاوي مرکب (NH_3) یو مول چې اتمومي وزن یې اولس ګرامه کيږي داوواگادروپه شمیر مالېکولونه لري.

د هرې مادي یو مول (Mole) هغومره ماده ده چې په هماغه کچه اتمونه ولري لکه څومره اتمونه چې دکاربون ایزوټوپ $(^{12}\text{C}_6)$ په دوولس ګرامه 12 g کې موجودوي. داتوم په ځای نورې ذرې لکه اتمونه، مالېکولونه، ایونونه، الکترونه او یا معادل نورې ذرې هم په کارول کېدلای شي.

که چیرته د یوه عنصر اتمومي وزن په ګرام سره وښیو نو د یوې مادي یو مول هغومره ګرام مادي ته ویل کيږي څومره چې دنوموړي مادي اتمومي وزن وي. د بېلګې په ډول دکاربون ایزوټوپ $(^{12}\text{C}_6)$ یو مول ماده دوولس ګرامه ده.



د هرې يوې مادې يومول (Mole) په مساوي کچه اټومونه او يا ماليکولونه لري چې شمير يې د تجربو له مخې $6,022 \times 10^{23}$ particle ذرې ټاکل شوي دي. نوموړي شمير ته د ساينس پوه لوشميدت ($N_L = \text{Loschmidt}$) په وياړ نوم ورکړ شوی چې داوگادرو عدد (شميره) سره يو شان دی. $N_L = 6,022 \times 10^{23}$ particle /Mol

د يوه اټوم مطلقه کتله تر لاسه کيږي کله چې ددغې مادې دکتلي يو مول د لوشميدت په عدد (شميره) وويښو.

پوښتنه: په يوه گرام اوبو کې داوډو څومره ماليکولونه شته دي؟

حل: څرنگه چې داوډو يو ماليکول ددو هایدروجن او يو اکسيجن اټوم څخه جوړ دی او هایدروجن اټوم په خپله هسته کې يو پروتون او اکسيجن په خپله هسته کې اته نيوترونه او اته پروتونه لري چې مجموعه يې شپاړس کيږي نو له دې کبله داوډو يوماليکول اتلس ذرې لري. دا په دې مانا چې يو مول اوبه اتلس گرامه وزن لري چې د $6,022 \times 10^{23}$ particle ذرو سره سمون خوري. نو په يوه گرام اوبو کې داوډو ماليکولو شمير N په لاندې ډول لاس ته راځي.

$$N = \frac{6,022 \times 10^{23}}{18} = 3,4 \times 10^{22} \text{ Water Molecules}$$

ځواب: په يوه گرام اوبو کې لږ څه لس په طاقت د دوه ويشت ماليکولونه شته دي.

پوښتنه: په يوه کيلوگرام سوچه کاربن کې د اټومونو شمير $N(C-12)$ څومره دی؟

حل: په يوه کيلوگرام کې د کاربن عنصر د اټومونو شمير د مولارکتلي $M = \text{Mole}$ او د اوگادرو شميره N_A د حاصل تقسيم څخه تر لاسه کيږي. همدارنگه يومول کاربن دولس گرامه 12g وزن لري.


$$N(C-12) = N_A / M = (6,022 \times 10^{23} \text{ particle /mol}) / (12 \text{g/mol}) = 5,02 \times 10^{25} / \text{Kg}$$

ځواب: په يوه کيلوگرام سوچه کاربن کې پينځه ضرب د لس په طاقت د پينځه ويشت اټومونه شته دي.

که د يوه نورمال سړي د بدن وزن اوبه 70 kg کيلوگرام ومنو د ټول بدن د اټومونو شمير يې لږ څه اوه ضرب د لس په طاقت داوه ويشت (7×10^{27} atoms) اټکل کيږي

يادونه: لس په طاقت د اوه ويشت دا مانا لري چې يواو په څنگ کې يې اوه ويشت صفرونه يانې

$$1000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000 = 10^{27}$$



داتوم نسبي کتله A_r

د یوې مادې د اټوم نسبي کتله A_r هغه اندازه کتله ده چې دنوموړې مادې داتومونو کتله څومره ځله داتومي کتلې واحد $1U$ په پرتله درنده ده. همدارنگه داتوم نسبي کتله د یوه مول کتلې د اندازې شمیر په واحد دگرام سره برابره دی. دبیلگې په ډول د هایدروجن اټوم نسبي کتله $A_{r,H} = 1,008$ داپه دې مانا چې د یومول هایدروجن اټوم کتله مساوي ده له: $A_{r,H} \times \text{gram} = 1,008 \text{ gram}$

داتوم مطلق کتله

داووکادرو عدد(شمیره) N_A او د مادې مول Mole په مرسته سره کولای شو چې د اټوم مطلق کتله تر لاسه کړو.

$$m = (A_r \text{ g/mol}) / (N_A)$$

دبیلگې په توگه دسودیم اټوم مطلق کتله m_{Na} لا س ته راځي کله چې ددغې مادې دکتلې یو مول د لوشمیدت په عدد(شمیره) وویښو.

$$m_{Na} = (22,99 \text{ g/mol}) / (6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}) = 3,8 \times 10^{-26} \text{ kg}$$


یوکیلووات ساعت kWh	الکترون ولټ eV	کیلوپوند متر kpm	کالوري cal	ایرگ erg	دالکترون کتلې معادل انرژي	یو جول Joule	
	kW h	eV	kpm ²)	cal ²)	erg ²)	m _e c ^{2 3})	Joule
1 kW h	1	2,25+25	3,67+5	8,60+5	3,60+13	4,40+19	3,60+6
1 eV	4,45-26	1	1,63-20	3,83-20	1,60-12	1,96-6	1,60-19
1 kpm ²)	2,73-6	6,12+19	1	2,34	9,81+7	1,20+14	9,81
1 cal ²)	1,16-6	2,61+19	4,27-1	1	4,19+7	5,11+13	4,19
1 erg ²)	2,78-14	6,24+11	1,02-8	2,39-8	1	1,22+6	1,00-7
1 m _e c ^{2 3})	2,27-20	5,11+5	8,35-15	1,96-14	4,18-7	1	8,18-14

۸- جدول: په پورتنی جدول کې دکیمیاوي، میخانیکي، هستوي او برېښنايزواحدونو تر منځ اړیکې ښودل شوې دي چې یو په بل باندې په اسانۍ سره اړول کيږي (49).

په پورتنی جدول کې دیوه داسې لنډ یزڅخه کاراخیستل شوی چې داکسپوننسیال تابع Exponential function لپاره چې قاعده یې لس (Base ten) ده دای توری E سره او یا بې له نوموړي توري نه لیکل کيږي.

دپام وړ: هغه برېښنايزگروپونه چې د رڼا په موخه ورڅخه په کورونوکي کار اخیستل کيږي برېښنايز قدرت یې د څلوېښتو څخه تر سل وټ پورې رسيږي.

خودیوې هستوي بټۍ برېښنايز قدرت لږ څه د پینځه سوه څخه تر دوه زره میگا وټ پورې وي.



- * بېلگه: یو کیلو وات ساعت مساوي ده له : $3,60 \times 10^6 \text{ J} = 3,60 \times 10^6 \text{ J} = 3,60 \text{E}+6 \text{ J} = 1 \text{ kWh}$
- * بېلگه: یو الکترون ولټ مساوي ده له : $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J} = 1,6 \text{E}-19 \text{ J} = 1,6-19 \text{ J}$
- * بېلگه: یو کیلوپوند متر مساوي ده له : $2,73-6 \text{ KWh} = 2,73 \text{E}-6 \text{ kWh} = 2,73 \times 10^{-6} \text{ kWh}$
- * بېلگه: یو کیلو وات ساعت مساوي ده له : $2,25+25 \text{ eV} = 2,25 \text{E}+25 \text{ eV} = 2,25 \times 10^{25} \text{ eV}$
- * $m_e c^2 =$ د الکترون کتلې معادل انرژي: $8,18-14 \text{ J} = 8,18 \text{E}-14 \text{ J} = 8,18 \times 10^{-14} \text{ J}$


رادیوایزوتوپ (Radioisotope)

ایزوتوپ هغو عنصرونو ته ویل کیږي چې په هسته کې دهغوی د پروتون شمیر سره یوشان خو د نیوترونو شمیر یې د یوه بل څخه توپیر ولري. که نوموړي عنصرونه د ځان څخه وړانګې خپروي نو دراديو ایزوتوپ په نامه سره یادېږي. که څه هم دیوه عنصر د ایزوتوپونو کیمیاوي خواص سره یوشان دي خو فزیکي خواص یې دیوه او بل څخه توپیر لري.

		
Proton	Deuteron	Triton
${}^1_1\text{H}$	${}^2_1\text{H}$	${}^3_1\text{H}$
پروتون	دویترون	تریسیوم یا تریتون

۱- شکل: د هایډروجن اتوم درې ډوله ایزوتوپونه ښودل شوي دي (30).

لومړی ایزوتوپ په هسته کې یو پروتون (H^1) لري چې سپکې اوبه (H_2O) ورڅخه جوړې دي. دویم ایزوتوپ په هسته کې یو پروتون او یو نیوترون لري چې د دویترون ($\text{Deuteron} = \text{H}^2 = \text{d}$) په نامه سره یادېږي او درندې اوبه (D_2O) ورڅخه جوړې دي. دریم ایزوتوپ په هسته کې دوه نیوترونه او یو پروتون لري چې د تریتون ($\text{Triton} = \text{H}^3$) په نامه سره یادېږي. درندې اوبه (D_2O) د یوه موډراتور مادي په صفت (Moderator) په هستوي بټۍ کې د بریښنا د تولید په کړنلاره کې خورا اغیزمن ماده تشکیلوي. داځکه چې ددرندې اوبو یوه هسته د چټکو نیوترونو سره ایلاستيکي غبرګون کوي او په دې ترڅ کې دغه سریع نیوترون خپله لږڅه ټوله حرکي انرژي داوبو مالیکول پروتون ته انتقال کوي. په پایله کې پروتون خټ خواته خوځيږي. څرنگه چې دغه پروتون اوس د سریع نیوترون حرکي انرژي تر لاسه کړې ده نو کولای شي چې داوبو ګاونډیو مالیکولونو سره غیر ایلاستيکي غبرګون وکړي او الکترونه ورڅخه جلاکړي (ایونایزیشن). درندې اوبه نن ورځ هم د سریع نیوترونو د بریک کولو او په حرارتي نیوترونو اړولو په موخه په هستوي تکنالوژي او صنعت کې خورا اهمیت لري. دبیلګې په ډول یوازې حرارتي نیوترونه کولای شي چې د یورانیم $\text{U}-235$ او یا د پلوتونیم $\text{Pu}-239$ هستې څخه جذب شي او دهغوی د چاودنې کړنلاره تر سره کړي. کله چې یو حرارتي نیوترون n دیوه پروتون p څخه جذب شي او په پایله کې دویتریم d او دګام یوه وړانګه خپریږي. دنوموړي هستوي تعامل معادله داسې لیکل کیږي $p(n,\gamma)d$



د پام وړ: په هستوي بټۍ اوسیکلوټرون **Cyclotron** کې دهستوي طب لپاره گڼ شمیر رادیو ایزوټوپونه په مصنوعي ډول تولید کيږي چې ځیني مهم یې په لاندني جدول کې ښودل شوي دي.

رادیو اکتیوایزوټوپونه لکه اکسیجن O^{15} ; O^{16} ; O^{17} ، د کاربون ایزوټوپونه لکه C^{13} ; C^{14} ; C^{15} 

Radionuclide درادیونوکلید نوم	Decay mode دتجزی کرنا لاره	Production reaction دهستوي تعامل معادله	Cross section عرضاني مقطع
C^{14}	β^-	$N^{14}(n,p)C^{14}$	1,81 barn
F^{18}	$\beta^+; EC$	$Ne^{20}(d,\alpha)F^{18}$	91 barn
O^{15}	β^+	$N^{14}(d,n)O^{15}$	99 barn
I^{131}	$(\beta^-; \gamma)$	$Te^{130}(n,\gamma)I^{131}$	0,24 barn

پوښتنې (Questions):

(ځوابونه یې په نونسم څپرکي کې ورکړ شوي دي)

۱-۲ کله چې دیوه تومور نسجونه لږ څه یو سانتي متر مکعب غټوالي ته ورسېږي نو د تماس له لارې

Palpable پیژندل کیدلای شي. په یوه سانتي متر مکعب تومور کې د حجرو شمیر څومره اټکل کيږي؟


۲-۲ د هایدروجن اټوم درې ډوله ایزوټوپونه څه نوم لري؟

۳-۲ رادیوایزوټوپ څه ډول عنصر ونو ته ویل کيږي؟

۴-۲ په یومول ماده کې څومره اټومونه شتون لري؟

۵-۲ د اټومي کتلې واحد کوم عنصر ټاکل شوی دی؟

۶-۲ د اټوم کتلې واحد u په گرام، کیلوگرام، ژول او میگا الکترون ولټ سره محاسبه کړی؟



دریم څپرکی

دور انګوفزیک بنسټیز پوهه

(Fundamentals of Radiation Physics)

د اټوم جوړښت (Atom Structure)

د اټوم کلمه د لومړي ځل لپاره لږڅه دوه نیم زره کاله پخوا د یونان فیلسوف سقراط (Socrates) نه هم دمخه د لویکیپوس (Leukippos) او دهغه زده کوونکي دېموکریت (Democrit) له خوا کارول شوې ده. د اټوم کلمه د یوناني ژبې د اټوموس (átomos) کلمې څخه اخیستل شوې ده او (نه ویشوونکې) ما نا لري ټومور و فیلسوفانو دا نظر درلود چې هره ماده د داسو کوچنیو ذرو څخه جوړه ده چې هغوي په کیمیاوي کړنلاره سره ددې نه په ډیرو نورو وړو برخو یا بڅرکونه شي ویشل کیدای. دغه کوچنی ذره دومره کوچنۍ ده چې په سترگو نه لیدل کیږي او دومره کلکه ده چې نوره نه وینل کیږي (indivisible). د مادي دغه رنگ یوه کوچنۍ ذره چې دیوه متر په یو ملیاردمه کچه کوچنۍ ده د اټوم په نامه ونومول شوه. په نونسمه پېړۍ کې تجربو وښودله چې اټوم د مادي تر ټولو کوچنۍ ذره نه ده بلکې په لا نورو وړو ذرو هم ویشل کیږي. داپه دې مانا چې اټوم د یوې مادي هغه کوچنۍ ذره گڼل کیږي چې په کیمیاوي کړنلاره سره نو ردتجزيې وړ نه ده خو په فزیکي کړنلاره سره په نورو ذرو او لا کوچنیو برخو تجزیه کیدای شي. په داسې حال کې چې تر نن ورځ پورې د اټوم کلمې نوم همداسې په خپل حال پاتې دي خو تجربو وښودله چې د اټوم څخه نورې کوچنۍ ذرې هم شته دي چې شمیر یې لږ څه دوه سوو نه هم وراړي. دغه بنسټیز ذرې یانې (Elementary particles) په مصنوعي توګه سره دهستوي تعاملونو او چاودنو په کړنلاره کې پیدا کیږي. د بیلګه په ډول لکه په یوه هستوي بټۍ، هستوي وسلو لکه اټوم بم او دهستوي ذرو خطي تعجیل کوونکو (Linear Particle accelerator) تخنیکي آلو کې بنسټیز ذرې منځ ته راځي. لږڅه درې سوه کاله د میلاد نه دمخه د یونان یو بل فیلسوف اریستوتېلېس (Aristoteles) د اټوم موډل نظریه د طبیعي علومو په رڼا کې په بل ډول بیان کړه او ددې دعوا یې وکوله چې ګڼې ټولې مادي د څلورو عناصرو لکه اور (Fire)، ځمکه (Earth)، اوبه (Water) او هوا (Air) څخه جوړې دي. په ۲- شکل کې دنوموړو عناصرو او د هغوی خواصو په هکله د پلاتو (Plato) او اریستوتېلېس (Aristoteles) اړیکې دیوه ګراف په بڼه سره ښودل شوې دي. د اټوم کلمه د قرآن شریف په څلور دیرشم سورت (سبا) دریم آیت کې د ذرې په نوم راغلي ده. دغه مبارک آیت په ډاګه کوي چې د اټوم څخه کوچنۍ ذرې هم شته دي. نن ورځ پوهیږو چې دغه ذرې لکه پروتون، نیوترون، الکترون او نورې ذرې تشکیلوي.

عَلِيمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

ژباړنه: هسې رب چې عالم دی په غیبو، نه پټیږي له ده، په اندازه د یوې ذرې (اټوم) په آسمانونو کې او نه په ځمکه کې او نه وړوکی له هغې ذرې او نه لوی ترې مګر (چې دا ټول لیکلي پراته دي) په کتاب ښکاره (لوح محفوظ) کې.






Chart of Plato and Aristotle (~400 BC)



۲- شکل: د میلاد نه لږ څه څلورسوه کاله پخوا دیونان فیلسوفانو هر یو اریستوتېل (Aristotle) او پلاتو (Plato) د څلورو بنسټیزو عناصرو لکه اوبه، اور، هوا او ځمکه او د هغوی د خواصو په هکله وړاند وینه کړې ده (51) . .


ترنومسمي پېړۍ پورې دیونان پوهانو داتوم موډل نظریه بې پامه او ګونګه پاتې شوه. په ۱۸۹۷ م کال کې یو انګریز فزیک پوه تومسن (J. Thomson) له خوا د الکترون ذره رابرسیره شوه چې نوموړې ذره داتوم څخه لږ څه دوه ذره واړه کوچنۍ ده. کله چې نوموړي فزیک پوه دکتود وړانګو په څېړنه بوخت وه نو په ډاګه شوه چې دکتود وړانګې (Cathod Rays) بل شئ نه دي بلکه د الکترون وړانګو څخه جوړې دي چې بیا وروسته د بېټا وړانګو نوم ورکړ شو. په ۱۹۱۲ م کال کې یو انګریز فزیک پوه راترفورد (Ernest Rutherford) په دې بریالی شو چې د تجربو په اساس داتوم هستی شته والی په ثبوت ورسوي او داتوم یوه نوي موډل وړاندیزې وکړ. څرنګه چې د راترفورد اتمو موډل ځینې نیمګړتیاوې لرلې نو په ۱۹۱۳ م کال کې دیوه سویډني فزیک پوه نیلز بور (Niels Bohr) له خوا داتوم یو بل موډل وړاندې شو چې په ۳ شکل کې بنودل شوی دی. دغه وروستی اتمو موډل اوس د نیلزبور او راترفورد (Niels Bohr- Rutherford) اتمو موډل په نامه سره یادېږي. داتوم نوموړی موډل دساینس پوهانو تر منځ په نړیواله کچه منل شوی دی او ترنن ورځې پورې اعتبار لري او په ۳- شکل کې بنودل شوی دی.



د ډیرو الکترونو اتمو موډل




دهایدروجن اتمو موډل



دهیلیم اتمو موډل

۳- شکل: د نیلزبور او راترفورد (Niels Bohr- Rutherford) اتمو موډل په ډاګه کوي چې یو اتمو د مثبت چارج شوي هستې څخه جوړ دی چې په شاوخوا کې یې په ټاکلو بیضوي شکل ډارونو کې الکترونه راڅرخېږي. په دغه شکل کې دهایدروجن اتمو او دهیلیم اتمو موډل شول شوي دي (31).



د نیلز بور او راتر فورډ اتوم موډل (Niels Bohr- Rutherford Atom Model)

◀ اتوم د یوې مثبت چارج شوې هستې (Nucleus) او په شاوخوا کې د منفي چارج شوو الکترونو څخه جوړ دی. څرنګه چې د هستې ټول مثبت چارج د اتوم الکترون ټول منفي چارج سره برابر دی نو اتوم د باندې خوا ته خنثی حالت غوره کوي. د اتوم لږ څه ټوله کتله په هسته کې پرته ده.

◀ لکه څرنګه چې سیارې (Planets) د لمر په چاپېر راګرزي همدارنګه دغه الکترونه هم د اتوم هستې په شاوخوا کې په ټاکلو مدارونو کې را څرخيږي.

◀ د اتوم الکترونه کولای شي چې یوازې په ټاکلو بیضوي بڼه مدارونو (Orbits) او ټاکلي واټن کې د هستې په چاپېر حرکت وکړي. دغه مدارونه د ثابت انرژي لپول سره ورته دي او الکترون خپله انرژي د لاسه نه ورکوي.


◀ یو الکترون یوازې په هغه حالت کې انرژي د لاسه ورکوي چې د لوړ انرژي مدار څخه یو ه ټیټ مدار ته راولوړيږي. دغه انرژي د یو فوټون (Photon) په ډول خپریږي او د هریوه مدار لپاره ټاکلي څپه یانې ځانګړی فریکونسي لري.

◀ که د اتوم په مدار کې یو الکترون د باندې خوا یوه فوټون په لګیدلو سره انرژي تر لاسه کړي نو د خپل ټیټ مدار څخه یوه جګ پورې مدار ته پورته ټوپ وهي. په دغه ډول کړنلاره کې اتوم د **تحریک** یا نه راپارول شوی حالت ځانته غوره کوي.

☞ د اتوم هسته د برېښنایز مثبت چارج شوی پروتونوچې شمیر یې په زاید Z او برېښنایز خنثي یا بې پلوه نیوټرونو چې شمیر یې داین (N) په توري سره ښیو جوړه ده. لکه څرنګه چې لمر او سیارې د جاذبې قوې په مرسته سره تړلي دي همدارنګه پروتون او الکترون د الکترو ستاتيک (Electrostatic force) قوې په واسطه یو بل ځکوي (attraction) او له دې کبله یو ځای سره پاتې کیږي .

په هسته کې د مثبت چارج شوو پروتونو شمیر Z ته دهستي چارج عدد (شمیره) یا داتومي نمبر (**Atomic number**) هم ویل کیږي چې دهغه اتوم د الکترونو شمیر سره مساوي قیمت لري. په هسته کې د پروتونو شمیر Z او نیوټرونو شمیر N مجموعي ته د نوکلینون (Nucleons) شمیر A ویل کیږي یانې ($A = Z + N$). همدارنګه دهستي د پروتونو او نیوټرونو کتلې مجموعي وزن ته د اتوم کتلې نمبر (**Atomic Mass Number**) نوم ورکړ شوی دی.

د اتوم هره یوه هسته دهغه عنصر په کیمیاوي سمبول لکه ${}_Z^A X_N$ ، نوکلینونو شمیر A ، نیوټرونو شمیر N او پروتونو شمیر Z په مرسته سره پیژندلای او مشخص کولای شو. د بېلګه په ډول دیورانیوم U ، سوډیم Na او کاربون C هسته په لاندې ډول لیکل کیږي.



${}^A_Z X_N$	${}^{12}_6 C_6$	${}^{22}_{11} Na_{11}$	${}^{238}_{92} U_{146}$

ډيورانيوم ايزوتوپ لپاره دغه پورتنۍ لنډه ليکنه دا ما نا لري چې د يورانيم هسته يو سلو شپږ څلوېښت ($N=146$) نيوترونونه او دوه نوي ($Z=92$) پروتونه لري چې مجموعه يې ($A=238$) نوکليونه کيږي په همدې ډول سره سوډيم يوولس پروتونه او يوولس نيوترونه لري چې مجموعه يې دوه ويشت نوکليونه کيږي. همدارنگه دکاربون دنيوترونو او پروتونو مجموعه دولس ده.

${}^4_2 He$	${}^{12}_6 C$	${}^{238}_{92} U$
دالفا ذره يا د هيليم اتوم هسته	دکاربون اتوم هسته	ډيورانيوم دوه سوه پينځه ديرش اتوم هسته


۴- شکل: د هيليم يا الفا ذرې، کربون او يورانيم اتوم هستو جوړښت د يوه موډل په بڼه ښودل شوي دي. دپروتونو او نيوترونو يوځاي ټول شمير د هيليم لپاره څلور، د کربون لپاره دوولس او د يورانيم لپاره دوه سوه پينځه ديرش قيمت لري چې دنوموړو هستود سمبول په سر ليکل شوي دي (31).

داسانتيا لپاره د نوموړو هستو دنيوترونو او پرتونو شمير په پام کې نه نيول کيږي او په لاندې ډول هم ليکل کيږي.

يورانيوم ${}^{238}U$ ، سوډيم ${}^{22}Na$ ، کربون ${}^{12}C$ ، او يا په لاندې ډول: ${}^A X$

$X - A$	$C - 12$	$Na - 22$	$U - 238$

د پروتون کتله لږ څه يوزرواته سوه ځله 1800 د الکترون کتلي څخه ستره ده. دپروتون اوډالکترون برېښنايز چارج ديوه او بل سره مخالف خومطلقه قيمت يې سره يوشان او مساوي په ($1.602 \times 10^{-19} C$) کولومب دی. څرنگه چې داتوم په هسته کې دپروتونو شمير داتوم په مدارونو کې دالکترونو شمير سره برابري دی نو له دې کبله دهستي مثبت اود الکترونونو منفي چارجونه يو بل سره دفع کوي او همدا سبب (لامل) دی چې اتوم دباندې خوا ته کوم برېښنايز چارج نه لري او د خنثی يا بي پلوه شکل



غوره کوي. داتوم هریو مدارچې پوستکي (Shell) هم ورته ویلای شودیوي ټاکلي انرژي سره برابر اود هر یوه عنصر لپاره ثابت قیمت لري. داتوم مدارونو ته دننه څخه پیل دباندي خواته په خپل وار سره د کي (K)، اېل (L)، اېم (M)، اېن (N) او او (O) ټکونومونه ورکړشوي دي. داتوم الکترونه په ټاکلو مدارونو او ټاکلي شمیر سره په خپلو مدارونو کې حرکت کوي او ترڅو چې پورته او یا بنکته نورو مدارونو ته ورتیر نه شي نو اتم خپله انرژي دلایسه نه ورکوي. خو کله چې داتوم الکترونه دباندي خواڅخه په هر ډول که وي لکه دغبرگون په پایله کې انرژي ترلاسه کړي نو بیا دخپل مدارڅخه راوځي او پر ځای یې یو تش سوري پا ټي کيږي. دبیلگه په ډول لکه چې په ه شکل کې ښودل شوي ده چې که یوالکترون او یا ایونایزکونکي وړانگي لکه یو فوتون د (K) مدار ته ور ننوځي او دهغه مدار د یوه الکترون سره و لگيږي او خپله ټوله انرژي ورته انتقال کړي نو په پایله کې دنوموړي مدارڅخه همغه الکترون را وباسي (ejected electron). څرنگه چې په مدار کې دنوموړي الکترون ځای دیوه سوري په بڼه تښ پاتي شو نو سمدلاسه د (L) مدار څخه یوالکترون هلته ورتوب کوي. همدارنگه د (L) مدار تش سوري په خپل وار سره د (M) او ددغه مدار تش سوري بیا د (N) او همدغه ډول کړنلاره بیا پرلپسې د اخري مدار (O) لپاره هم ترسره کيږي. کله چې نوموړي الکترونه دلورومدارونو څخه ټیټو مدارونو ته راولوړي نودهغوی دانرژي تو پیر دالکترومقناطیسي وړانگو په ډول خپريږي چې دهریوه عنصر او هم دهر یوه مدار لپاره ځانگړی او ثابت قیمت لري.



دبیلگه په ډول کله چې یوالکترون د (K) مدار لېول (Level) څخه راووزي او د (L) مدار لېول (Level) ته پورته شي داپه دې مانا چې دانرژي په حالت کې یې بدلون راشي نو دنوموړومدارونو دانرژي تو پیری $\Delta E_K = E_K - E_L$ د الکترو مقناطیسي وړانگو په ډول خپريږي چې د دغه مدار ځانگړي اکسریز (X-rays) په نامه سره یادیږي. د (K) مدار لپاره لیکلای شوچې:

$$\Delta E_K = h\nu_K = E_K - E_L$$

په پاسنئ معادله کې $h\nu$ دهغه الکترو مقناطیسي وړانگو انرژي ده چې دنوموړو مدارونو دانرژي تو پیر څخه تر لاسه کيږي اود فوتون وړانگو په بڼه خپريږي. ν_K د K مدار فریکوینسي او h د پلانک ثابت په نامه سره یادیږي .

فوتون دنور یوه ذره یا دنور کوانت Quant په نامه سره یادیږي چې د الکترومقناطیسي څپو یوه برخه جوړوي. څرنگه چې نوموړي وړانگي د هر یوه عنصر لپاره یو ټاکلي قیمت لري نو له دې کبله ورته دځانگړوایکس وړانگو (Characteristic k-X-ras) او یا k اکسریزاویا رونتگن وړانگو نوم ورکړشوی دی.


که چیرته د یوه اتم په هر مدار کې دالکترونو انرژي بدلون منځ ته راشي نود یادشوي کړنلارې په پایله کې دهغه اتم دانرژي خپريدونکی طيف Emission Spectrum لا س ته راځي. دیوه اتم ټوله خپره شوې انرژي د دغه اتم د اکسریز ځانگړی انرژي طيف او یا د انرژي سپیکترم (Characteristic x-ray energy spectrum) په نامه سره یادیږي.




۵- شکل: د نیلزبور (Niels Bohr) اتوم موډل: یو اتوم یواځې هغه وخت انرژي دلاسه ورکوي کله چې د الکترونو د انرژۍ په حالت کې یې بدلون راشي. د بېلګه په ډول کله چې د بهر نه یو فوټون او یا یو الکترون (Incident electron) د اتوم تر ټولو د ننه مدار K ته ورننځي او دنوموړي مدار یو الکترون سره غبرګون وکړي نو په پایله کې دغه الکترون بیخي د اتوم څخه راوباسي (Ejected electron) اوځای یې تش پاتې کیږي. په دې ترڅ کې د اتوم د ایل L لور او بهرني مدار څخه یو الکترون k مدار ته راتوب کوي او دغه سورۍ ډکوي. همدارنګه د ایل L مدار الکترون تش ځای د ایم M او د این N مدار الکترون تش ځای د O مدار الکترون څخه په خپل وار او پرلپسې ډک کیږي. دا په دې مانا چې په پایله کې یو الکترون د انرژي یوه لوړ مدار لکه (O) څخه په خپل وار د L, M, N, او بیا د انرژي یوه ټیټ مدار لکه (K) ته راوړي او د نوموړو مدارونو انرژي توپیر دورانګو په ډول خپریږي. په نوموړي کړنلاره کې یو اتوم په دوام لرونکي یا **متمادي (continuous)** توګه سره انرژي نه خپروي او نه یې جذب کوي بلکه په یوه ټاکلي اندازه سره چې د انرژي کوانټ (Energy quant) په نامه سره یادېږي جذب کوي او یا یې خپروي. په نوموړي شکل کې دیوه اتوم د اکسریز ځانګړۍ انرژي طیف (مشخصه انرژي طیف) (Characteristic k-X-ray photons) ښودل شوی دی چې انرژي یې د هر یوه مدار لپاره ځانګړی قیمت لري او په خپل وار سره په O shell; L shell; M shell; N shell او k shell سره ښودل شوي ده (15).

په ۶ شکل کې د دټنګسټن عنصر (Tungsten = W) د اتوم انرژي طیف ښودل شوی دی. کله چې یو الکترون د K انرژي لېول څخه د L انرژي لېول ته پورته وځي او بیا بیرته د K مدار ته راوولېږي نو د انرژي توپیر یې $h\nu_K$ د اکسریز ځانګړو وړانګو (Characteristic k-X-ray) یانې یوه فوټون په ډول خپریږي چې قیمت یې دننه پنځوس زرو الکترون ولټه سره یو شان ده دا ځکه چې:

$$(h\nu_K = 70\,000 - 11\,000 = 59\,000 \text{ eV})$$



Atomic Energy Levels




۶- شکل: دتنگستن عنصر (Tungsten = W) داتوم انرژي مدارونه لکه K,L,M,N,O کيښي خوا اود انرژي لېول (Atomic energy levels) يې ښی خواته ښودل شوي دي(15).

دانرژي لېول د K ,L ,M مدارونو لپاره په خپل وار سره مساوي ده له: اویازره الکترون ولټه، یوولس زره الکترون ولټه او دوه نیم زره الکترون ولټه (2500 eV; 11 000 eV; 70 000eV). داپه دې مانا چې که وغواړو دنوموړي اټوم د K مدار څخه یو الکترون راوباسو نو اویازره الکترون ولټه انرژي ورته په کارده. هغه وړانګې چې دنوموړومدارونودانرژي توپیر په پایله کې خپریږي د K مدار وړانګې K-radiation ، د L مدار وړانګې L-radiation او د O مدار وړانګې O-radiation په نامه سره یادېږي.

داتوم تحریک یا راپارول (Atomic excitation)

یو الکترون دیوه ټیټ مدار څخه یوه بل لوړ مدار ته هغه وخت پورته کیدای شي چې دهمغوبرخه اخیستونکو مدارونودانرژي توپیر په کچه انرژي دباندي نه په ورپیره شي . دپېلګه په ډول په ۷- شکل کې د (L) مدار څخه و (M) مدار ته یو الکترون پورته ختلئ دی. کله چې دغه او یا بل الکترون بیرته ښکته مدار ته راولویري نوهمغه اخیستل شوې انرژي دنور اویا الکترومقناطیسي وړانګو په ډول ورڅخه خپریږي. دغه ډول فزیکي کړنلارې ته داتوم تحریک یا راپارونه ویل کیږي.

دپام وړ: کله چې داتوم یوه هسته فوتون جذب کړي نولکه څرنگه چې داتوم مدار څخه یو الکترون یوه لوړ پوړي مدار ته پورته کیږي په همدې ډول په هسته کې هم یو نوکلېون (Nucleon) انرژي ځانته جذب کوي او په هسته کې دانرژي یوه لوړ حالت (state) ځانته غوره کوي..



پاس شکل داتوم راپارولو او لاندنی شکل د یوفوتون د خپرولو کرنلاره را ښیي	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="726 831 1086 1048"> دالفا ذره په یوه الکترون لگيږي او هغه د ټیټ انرژي مدار څخه لور انرژي مدار ته پورته کوي </td><td data-bbox="1086 831 1366 1048"> یوالکترون د لوړ انرژي مدار څخه بیرته ښکته را لویږي او یوفوتون خپريږي </td></tr> </table>	دالفا ذره په یوه الکترون لگيږي او هغه د ټیټ انرژي مدار څخه لور انرژي مدار ته پورته کوي	یوالکترون د لوړ انرژي مدار څخه بیرته ښکته را لویږي او یوفوتون خپريږي
دالفا ذره په یوه الکترون لگيږي او هغه د ټیټ انرژي مدار څخه لور انرژي مدار ته پورته کوي	یوالکترون د لوړ انرژي مدار څخه بیرته ښکته را لویږي او یوفوتون خپريږي		

۷- شکل: داتوم د راپارولو فزیکي کرنلاره (31)



په پورتنی شکل کې یوالکترون ته دباندي خوا څخه دالفا ذري په لگیدلو سره انرژي انتقال کيږي اوله دې کبله د خپل مدار څخه پورته لوړ مدار ته خيږي. خو کله چې یو الکترون بیا بیرته خپل تش ځای ته راولویږي نو همغه اخیستل شوي انرژي د فوټون په ډول دلاسه ورکوي.

ایونایزیشن (Ionization)

ایونایزیشن هغه فزیکي کرنلاري ته وايي چې دخنثی اتومونو او یا مالیکولو څخه یو یا څو الکترونه جلا او یا ورباندې زیات شي او هغوی په مثبتو او یا منفي ایونو واړوي. دغه ایونایز شوي اتومونه او مالیکولونه داسې رنگ بیا لویزیکي او کیمیاوي خواص غوره کوي چې دنورو اتومونو سره ډیر زرد بیو کیمیاوي تعامل کولوتیاري ښیي.

په ۸- شکل کې دایونایزیشن فزیکي کرنلاره ښودل شوې ده. کله چې الکترومقناطیسي وړانګې د بېلګه په ډول لکه دنور یوه ذره چې د فوټون (Photon) په نامه سره هم یادیږي او یا لکه دالفا یوه ذره د مادي په یوه اتوم ولگيږي نو خپله یوه برخه حرکي انرژي داتوم الکترون ته انتقال کوي او په پایله کې الکترون دخپل مدار څخه راوځي او په دې ډول دبرېښنا مثبت او منفي چارجونه لا س ته راځي. دغه رنگ فزیکي پېښه د ایونایزیشن او ټولې هغه وړانګې چې نوموړې فزیکي کرنلاره تر سره کولای شي د ایونایز کوونکو وړانګو (Ionizing radiation) په نامه سره یادیږي.

ایونایزیشن انرژي هغه اندازه انرژي ده کوم چې دیوه خنثي اتوم څخه دیوه الکترون دبیلودپاره په کارده. دبېلګه په ډول دسودیم لپاره نوموړې انرژي 5,14 eV/atom اودنیون نجیب غاز لپاره 22eV/atom قیمت لري.



۸- شکل: د الفا یوه ذره په اتوم لگيږي او دمدار څخه یې یو الکترون را وباسي . نوموړې فزیکي کړنلارې ته ایونایزېشن (Ionization) ویل کیږي(9) .

پوښتنې (Questions) :

(ځوابونه یې په نونسم څپرکي کې ورکړشوي دي)

۳-۱ داتوم کلمه څه مانا لري او هسته دکومودرو(بخرکو) نه جوړه ده؟

۳-۲ یو نوکلید څه ته وایی؟


۳-۳ دیوه ایزوتوپ او یوه ایون تر منځ توپیر څه دی؟

۳-۴ ډاکسریز اود گاما وړانگو تر منځ توپیر څه دی؟


۳-۵ یو عنصر دبل عنصر څخه څرنگه په توپیر سره پیژندلای شو؟

۳-۶ ایونایزېشن څه ډول فزیکي کړنلاره ده؟

۳-۷ ایزوتوپ څه ډول اتومونو ته وایی او په لاندني شکل کې څرنگه پیژندل کیدای شي؟



۸-الف شکل: په عمودي محورکي دپروتونوشمير Z او په افقي محورکي د نيوترونوشمير N بنودل شوی دی.



دويمه برخه

څلورم څپرکی



طبيعي راديو اکتیو یتي

(Natural Radioactivity)

سریزه

په ۱۸۹۶ م کال کې یو فرانسوي فزیک پوه هنري بېکارېل (Henri Becquerel) په خپل یوه تور تیاره لابراتوار کې چې هلته رڼا هیڅ موجوده نه وه دیورانایوم مالګې په یومعدني مرکب یانې (Kalium-Uran-Sulfat) باندې تجربې ترسره کولې. په دې ترڅ کې ورته جوته شوه چې دنوموړي عنصر په اړخ کې ځای په ځای شوی فوتو فلم توررنگ ځانته غوره کړی وه. په داسې حال کې چې د فوتو فلم هغه وخت تور کیږي چې الکترومقناطیسي وړانګې لکه رڼا ورته ورسېږي. نو په دې ترڅ کې دا پوښتنه ورته پيدا شوه چې پرته د لمر رڼا څخه دغه فوتو فلم ولې تور شوی دی؟ نوموړي دا ومنله چې د فوتو فلم توروالی خامخا دیورانایوم معدني ډبرې سره تړاو لري. نو بېکارېل دا پریکړه وکړه چې پخپله یورانایوم یو ډول وړانګې د ځان څخه خپروي او له دې کبله د لمر رڼا ته اړتیا نه لري. وروسته ثابت شوه چې دیورانایوم عنصر راديو اکتیو خاصیت لري دا په دې مانا چې هستوي ذرې لکه الفا ذرې ور څخه خپریږي او د هغوی اغیزه په فوتو فلم باندې پاتې کیږي. بېکارېل په لومړي وخت کې نوموړو وړانګو ته دیورانایوم وړانګو نوم ورکړ.

نن ورځ په ډاګه شوې ده چې طبیعي راديو اکتیويټي زموږ دځمکې دپیدایښت سره یوځای تړاوتلري اودځمکې یوه برخه تشکیلوي. په ځمکه کې ډیرې تیزې، معدني ډبرې، کانونه او راديو اکتیو عنصرونه شته دي چې طبیعي راديو اکتیويټي ښيي او طبیعي وړانګې خپروي. زموږ په چاپیریال کې، لکه کورونه، هوا، اوبه او ډوډۍ او نورو خوراکي شیانو کې هم طبیعي راديو اکتیو مواد شتون لري. همدا سبب (لامل) دی چې د بدن په ډیرو برخو لکه هډوکو، عضلاتو، او نسجونو کې راديو اکتیو مواد جذب شوي دي او وړانګې خپروي. په بدن کې پوتاسیم (Potassium 40)، کاربن څوارلس (Carbon 14) او رادیم دوه سوه شپږ ویښت (Radium 226)، یورانیم دوه سوه اته دیرش U^{238} هغه طبیعي راديو اکتیو عنصرونه دي چې دنورو عنصرو په پرتله په ډیره کچه پيدا کیږي.



La radioactivité
 par H. Becquerel
 et M. Curie
 Paris, 1903

په ۱۸۹۶ م کال کې د هېنري بېکارېل Henry Bequerel له خوا څخه دطبيعي راديو اکتیویتي قانون کشف شو.

په ۱۸۹۸ م کال کې د پیري کیوري Piere currie او میرمن ماري کیور Marie curie له خوا درادیم راديو اکتیو عنصر Radium کشف شو


په ۱۹۰۱ م کال کې د لومړي ځل لپاره یو فرانسوي ډاکټرلوپوس Lupus په پاریس ښار کې د پوستکي سرطان ددرملنې په موخه درادیم څخه کار واخیست

بېکارېل په لاندنې عکس کې خپل کشف شوي مالومات چې ګڼه یورانیم د خپل ځان څخه داسې ډول وړانګې خپروي چې یو فلم تور کولای شي پر لیکه کړي دی. د عکس لاندې توره برخه هغه فلم دی چې د رادیم الفا وړانګو په لګیدو سره تور شوی دی.

په ۱۸۹۸ م کال کې یوې فرانسوې ښځینه فزیک پوهې میرمن ماري کیوري (Marie Curie) دخپل میره پېپرکیوري (Pierre Curie) په ګډون سره په دې بریالي شوه چې د رادیم (Radium) په نامه یو بل نوی راديو اکتیف عنصر را بر سیره (کشف) کړي. نوموړی عنصر راديو اکتیو خواص لري یانې د الفا هستوي وړانګې خپروي او پخپله یې په یوه بل نوي عنصر باندې اوري. په ۱۹۰۳ م کال کې ماري کیوري، پېپر کیوري او بېکارل په ګډه سره د طبیعي راديو اکتیو عنصرنو در ا برسیره کولو او پوهنیز اثاروپه بدل کې **د نوبل جایزه Nonel prize** تر لاسه کړه.

تر نن ورځ پورې لږ څه یوزرو پینځه سوه توپیر لرونکي اټوم هستې یا نوکلید (Nuclid) پیژندل شوي دي چې دهغوی څخه یې یوذر هستې په مصنوعي توګه لاس ته راځي او پینځه سوه هستې په طبیعي ډول پیدا کيږي. څرنګه چې د هریوه نوکلید د پروتونو شمیر او دکتلي شمیرد یوه او بل سره توپیر لري نوهر یو یې په ځانګړي ډول سره پیژندلای شو. دنوموړو هستو څخه یې یوازې دوه سوه نهه څلوېښت ثابت یانې راديو اکتیو نه دي او پاتې نور یې ټول راديو اکتیو خاصیت لري. دهستې د پروتونو او نیوترونو مجموعې ته نوکلېون (Nucleon) هم ویل کيږي.

دپام وړ: هغه اټومونه چې په هسته کې یې د پروتونو شمیرد 83 څخه اوړي په خپل سریاني اوناڅاپه (Spontaneous) چوي.



دعنصرونو په پریودیک سیستم کې ټول هغه عنصرونه چې د اټوم نمبرپاڼې دپروتونو شمیر یې ددوه اتیا (۸۲) او یا په بل عبارت د سرب عنصر (Pb-82) څخه پورته وي رادیو اکتیو خاصیت لري او په نورو هستو باندې تجزیه کېږي تر څو په اخرنی پړاو کې په ثابت او مستقر سرب باندې واوړي. په طبیعت کې رادیو اکتیو عنصرانو درې ډوله سلسلې موجودې دي چې په ځمکه کې پیدا کېږي او په ۹- شکل کې ښودل شوي دي. څلورمه سلسله په مصنوعي توګه دهستوي تعاملاتو په کړنلاره سره لاس ته راځي چې د پلوتونیم او نیپتونیم سلسلې (Plutonium-Neptunium serie) په نامه سره یادېږي.

لومړۍ: دیورانیم ۲۳۵ سلسله (Uranium-235 serie)

دویم: دیورانیم ۲۳۸ سلسله (Uranium -238 serie)

دریم: دتوریم ۲۳۲ سلسله (Thorium232 serie)



څلورم: د پلوتونیم او نیپتونیم سلسله (Plutonium-Neptunium serie)

دنوموړو سلسلو رادیو اکتیو هستې په خپل حال ثابت نه پاتې کېږي بلکه دوخت په تیریدلو سره چې نیمایي عمر یې دلسو ملیاردو کالونو (10^{10} a) څخه پیل او تر لسو پیکو ثانویو (10^{-10}) پورې رسېږي په بیلو بیلو پړاونو کې تجزیه کېږي او په دې ترڅ کې په بیخي نویو هستو اوږي چې په څنګ کې ورڅخه هستوي وړانګې لکه د الفا ذره، بېټا وړانګې او ګاما وړانګې خپرېږي. دلومړنیو دریو سلسلو د تجزیه اخرنی ثابت عنصر د سرب (Pb = Plumbum) په نامه سره یادېږي.

ایزوتوپ	په بدن کې د جذب کیدلوځای	فزیکي نیمایي وخت	بیالوژیکي نیمایي وخت
C-14	Fat وازده	5570 کالونه	35 ورځې
P-32	Bone هډوکي	14 ورځې	1000 ورځې
S-35	Skin پوستکي	88 ورځې	23 ورځې
Ca-45	Bone هډوکي	164 ورځې	1900 ورځې
Fe-59	Blood وینه	45 ورځې	65 ورځې
I-131	Thyroid تایرایډ	8 ورځې	120 ورځې

۸- الف جدول: هغه طبیعي رادیو اکتیو مواد چې په بدن کې موندل کېږي اودنوموړو رادیو اکتیو سلسلو د تجزیه په ترڅ کې منځ ته راځي ښودل شوي دي. که ومنو چې دیوه رادیو اکتیو عنصر فزیکي نیمایي وخت پینځه کاله وي نو په لاندني جدول کې دهغه اټومونه دوخت په تابع سره کمښت مومي.


20 years شل کاله	لس کاله 10 years	پینځه کاله 5 years	0	وخت t =
125	250	500	1000	N د اټومونو شمیر =




۹- شکل: په طبیعت کې درادیاو کتیاو سلسلودتجزیې کړنلاره ښودل شوي ده. د بېلگه په ډول درادیاوکتیاوونو یورانیم - ^{238}U ، یورانیم - ^{235}U (توریم - ^{232}Th) او اوپلوتونیم - ^{241}Pu د تجزیې سلسلې په پایله کې په خپل وار سره په نورو نه چاودیدونکو عنصرولکه سرپ - ^{206}Pb ، سرپ - ^{207}Pb ، سرپ - ^{208}Pb (208 او بیسموت - ^{209}Bi) باندې اوړي (31).

رادیاوکتیو تجزیه (Radioactive decay)

په طبیعت کې ځینې عنصرونه پیداکیري چې بې له بهرنۍ اغیزې څخه نا بېره او په خپل سرتجزيه کیري او په څنګ کې د اټوم دهستی څخه هستوي وړانګې خپروي چې په پایله کې توپیرلرونکي اودنیو عنصرونو هستې لاس ته راځي او یا داچې دهمغه عنصر په یوه رادیاو ایزوټوپ باندې بدلیري. نوموړې فزیکي کړنلارې ته رادیاوکتیو تجزیه یا وړانګې خپرونکي تجزیه اودغه رنګ خاصیت ته رادیاوکتیویتی (Radioactivity) ویل کیري.




هغه هستې چې وړانګې خپروونکې فعال خواص و لري دراديو اکتیو (Radioactive) اودهغوی هستې د رادیونوکلید (Radionuclid) په نامه سره یادېږي. په نوموړې ویی یا نې لغت کې رادیو (Radio) په مانا د وړانګه چې دلاتین ژبې رادیوس (Radius) څخه اخیستل شوی او دلاس او څنگلي ددواوږدو هډوکو څخه د یوه هډوکي نوم دی او اکتیو (Active) دفعال مانا ورکوي



۱۰- شکل: دیوه رادیواکتیو اتم هستې څخه د الفا وړانګې، نیوترون، پروتون، پوزیترون او الکترون خپریږي (IAEA)

لکه څرنګه چې یواټوم دالکترونو لپاره د انرژي ټاکلي مدارونه لري چې هلته په هر مدار کې په ټاکلي شمیر الکترونه دهستې په شاوخوا راڅرخي په همدې ډول سره د هر یوه عنصر داتوم هسته هم دانرژي لیول (Nuclear energy levels) څخه جوړه ده چې دهستې مدارونه ورته ویلای شو. دهستې په مدارونو کې پروتونه او نیوترونونه په خپلو انرژي لیول کې ځای په ځای ولاړ نه دي بلکه تل یو خوځېدو نکی او اهتزازي حرکت تر سره کوي چې په پایله کې یو پر بل باندې لګیږي او په دې ډول یوه ذره بلې ذرې ته په خپل وارسره انرژي انتقال کوي. که څه هم داتوم په هسته کې دپروتونو تر منځ دکولومب دفاع کوونکې بریښنايز قوه (Coulomb repulsion force) اغیزه کوي خودبلې خوا په ډیر لنډ واټن کې لکه یو فرمي (10^{-15} m) دپروتونو تر منځ یو بل ډول قوه اغیزمنه کیږي چې دهستوي قوي (Stronge forces or nuclear forces) په نامه سره یادېږي اود کولومب قوي په پرتله سل ځله زوروره ده. دنوموړې هستوي قوي لامله نوکلېونه لکه پروتونه اونیوترونه په هسته کې یوځای ساتل ساتل کیږي. یو پروتون د گاونډي نیوترون سره د یوې بلې هستوي ذرې چې د پي میزون (π -Meson) په نوم سره یادېږي د یوه ځنځیر شکله پله (Bridge) په ډول کلک تړلی دی. په داسې حال کې چې پروتونه دکولومب بریښنايز قوي په اساس یو بل سره دفع کوي او دهغې سره سم د یوه بل څخه لیرې کیږي خو برعکس هستوي قواوې نوموړې ذرې سره یوځای ځکوي او یا په بل عبارت یو بل سره جذب کوي. نوکه چیرته د پروتونو تر منځ هستوي قواوې موجودې نه وای چې هغوی یوځای سره وساتي نو به نوموړې ذرې دهستې څخه دباندې وتلې وای او یوه نوی هسته به منځ ته راغلې وه. په داسې حال کې چې په یوه ثابته هسته کې یانې نه رادیواکتیو هسته کې دپروتون اونیوترون هیڅ یوه



ذره هم په کافي اندازه انرژي نه شي تر لا سه کولای چې دهستي څخه ووځي خو په يوه راديو اکتیو هسته کې ديوې ذرې لپاره ددې چانس او احتمال شته دی چې ديوه داسې اهتزازي حرکت (Oscillating) په پایله کې پوره انرژي تر لاسه کړي او د هستې څخه د باندې ووځي. دهستي څخه ديوې ذرې خپریدل يوه سوچه احسائيوي کړنلاره ده او سړۍ دا وړاند وینه نه شي کولای چې کله به يوه هسته په بله هسته واوري او يا په بل عبارت سره يوه هسته تجزیه شي.

دبيلگې په ډول که چيرته موږ د راديو اکتیو مواد و يوه نمونه (Sample) ولرونودا پوښتنه پيدا کيږي چې څومره واره په دغه سمپل کې يوه چاود نه يا تجزیه تر سره کيږي. دا په دې مانا چې يو فزيکي کميت ته اړتيا ليدل کيږي چې هغه دچاود نې شدت يا ډيرښت وښيي. نوموړی کميت د اکتیويټي په نامه سره يادېږي او په لاندې ډول سره تعريف شوی دی.

❏ ديوې مادي اکتیويټي A مساوي دی دهستودچاودنې يا تجزيو منځنۍ شميرتوپير dN تقسيم په واحد دوخت dt .

$$A = - \frac{dN}{dt} = \lambda \cdot N$$

په پورتنۍ معادله کې منفي علامه دا په ډاگه کوي چې دهستو دتجزی شمير دوخت په تيريدلو سره کمښت مومي. لامدا (Lamda = λ) د هر يوه راديو نوکلید لپاره دتجزیې يوه ځانگړې ثابته ده چې دتجزیې سرعت رابني او دتجزیې احتمال په نامه هم ياديږي. ديوه ټاکلي نوکلید لپاره د هستود تجزيو نسبي شمير په واحد دوخت کې ثابت دی. دلامدا ثابته دچاوديدونکو هستو هغه سليزه برخه رابني چې په واحد دوخت کې چوي. دبيلگې په ډول دتخنيسيم Tc99 دتجزیې ثابته مساوي ده له : $0,115/\text{hour}$ λ دا مانا لري چې په يوه ساعت کې يوولس نيم په سلو کې 11,5% هستې چوي.

ډاکتیويټي واحد


د اکتیويټي واحد د فرانسوي فزيک پوه بېکارېل په وياړ سره ټاکل شوی دی. کله چې يوه هسته په يوه ثانيه کې تجزیه شي نو اکتیويټي يې د يو بېکاريل (1Bq = 1/s) سره سمون خوري. د بېلگه په ډول که يوزر هستې په يوه ثانيه کې وچوي نو ليکلای شو چې :

يو کيلو بېکاريل (1kBq = 1000 /s) . همدارنگه د اکتیويټي نور واحدونه عبارت دي له : ميگا يا نې يومليون او گيگا يا يو مليار د بېکاريل اونور ټاکل شوي دي.

❏ ډاکتیويټي پخوانی واحد کيوري (Curie = Ci) نومېږي چې د ميرمنې ماري کيوري په وياړ سره ټاکل شوی وه.

❏ کله چې په يوه ثانيه کې يوه هسته وچوي نو د يوې مادي نوموړي اکتیويټي ته يو بېکاريل و يل کيږي (1 Becquerel = 1 nuclear decay per second).

❏ په هستوي طب کې دناروغیود تشخيص په موخه د لس ميگا بېکاريل څخه تر سل ميگا بېکاريل (MBq) اکتیويټي څخه کار اخيستل کيږي.



مخصوصه رادیواکتیویتي (A_{specific})

مخصوصه رادیواکتیویتي A_{specific} د یوې رادیواکتیو مادې اکتیویتي A اودددغي مادې د کتلي m د حاصل تقسیم سره مساوي ده. که په یوه ماده کې N رادیو اکتیو هستې موجودې وي نوکولای شو چې دمخصوصه اکتیویتي A قیمت د اووگادرو عدد (شمیره) N_A ، اکتیویتي A ، د تجزیې ثابت λ او دمولار کتلي M په مرسته سره تر لاسه کړو.

$$A_{\text{specific}} = A/m = \lambda \times N/m = \lambda \times m \times N_A / (m \times M) = \lambda \times N_A / M$$

که په یوه بیالوژیکي نمونه کې چې ټوله کتله یې په m_{tot} او د یوه رادیواکتیو عنصر سلیزه برخه یې په Percent = P سره وښیونود مخصوصه رادیواکتیویتي قیمت په لاندې ډول تر لاسه کيږي.

$$A_{\text{tot}} = A/m_{\text{tot}} = \lambda \times p \times N_A / M$$

پوښتنه: دیورانیم U^{238} ایزوټوپ کچه په طبیعت کې 99,27% اټکل کيږي. دیوگرام یورانیم مخصوصه اکتیویتي مالوم کړی؟

حل: دیورانیم مولار کتله مساوي ده: $M = 0,238 \text{ kg/mol}$ اود تجزیې ثابت λ دیورانیم د نیمایي وخت څخه چې څلورنیم ملیارده کاله دی ($4,47 \times 10^9 \text{ years}$) تر لاسه کولای شو ($\lambda = \ln 2 / T_{1/2}$). د اووگادرو عدد (شمیره) مساوي دی له: $N_A = 6,022 \times 10^{23} / \text{mol}$ نو دیوه گرام یورانیم U^{238} مخصوصه اکتیویتي مساوي دی له:

$$A_{\text{tot}} = \lambda \times p \times N_A / M = 0,491 \times 10^{-17} / \text{s} \times 99,27\% \times 6,022 \times 10^{23} / 0,238 \text{ Bq/Kg} = 12342 \text{ Bq/g}$$


$$A_{\text{tot}} = 12342 \text{ Bq/g}$$

ځواب: دیوه گرام یورانیم دوه سوه اته دیرش U^{238} مخصوصه رادیواکتیویتي دلږڅه دوولس زره دری سوه بیکاریل سره مساوي ده.

دپام وړ: دیوه گرام رادیم عنصر اکتیویتي ($1 \text{ g Radium} \approx 1 \text{ Curie}$) د لږ څه یو کیوري سره برابره ده. دکیوري او بیکاریل تر منځ اړیکې په لاندې ډول دي. کله چې اوه دیرش ملیارده هستې په یوه ثانيه کې وچوي ($37 \times 10^9 \text{ nuclear decay per second}$) نو یو کیوري لاس ته راځي.

1Bq = 1/s	یو بیکاریل مساوي ده له یوه تجزیه په ثانيه کې
1KBq = 1000 Bq	یوزر یا کیلو بیکاریل
1MBq = 1000 000 Bq	یو ملیون یا یو مېگا بیکاریل
1GBq = 1000 MBq = 1000 000 KBq = 1000 000 000 Bq	یو گیگا یا یوزر ملیونه بیکاریل

۹- جدول: داکتیویتي لوی او کوچني واحدونه په مفصل ډول سره لیکل شوي دي.



داتلسو هستوڅه څلور هستي چوي او دڅلوروثانيو په موده کې دالفا څلور وړانگي خپروي

Aktivität = $\frac{\text{Anzahl der Kernumwandlungen}}{\text{Zeit}}$

$$A = \frac{\Delta n}{\Delta t} = \frac{4}{4 \text{ s}} = 1 \cdot \text{s}^{-1} = 1 \text{ Bq}$$

Quelle:

بني اړخ ته دوخت اندازه کولو په موخه یو ساعت څخه کار اخیستل کيږي او په کین اړخ کې د یوه رادیو اکتیو عنصر هستي بنودل شوې دي چې د الفا وړانگي خپروي

د یوه ساعت په مرسته وخت اندازه کيږي چې موده یې څلور ثاني ده

اکتیویتی A مساوي ده د تجزیه شوو هستو شمیر Δn تقسیم په وخت Δt .


څرنگه چې په څلوروثانیو کې څلور هستي چاودلي دي نو حاصل تقسیم یی یو بیکاریل دی

پایله: یو بیکاریل 1 Bq مساوي دی له یوه تجزیه په یوه ثانیه کې یانې (1.S⁻¹)

۱۱- شکل: په پورتنی شکل کې د اکتیویتی A په واحد باندې چې بیکاریل نومیږي رڼا اچول شوې ده. د یوه رادیو اکتیو عنصر د هستو تجزی شمیر په یوه ثانیه کې د بیکاریل په نوم یادېږي. (31)

1 Curie (Ci)	= 10 ⁰ Ci	= 3,7 x 10 ¹⁰ Bq	= 37 GBq
1 Millicurie (mCi)	= 10 ⁻³ Ci	= 3,7 x 10 ⁷ Bq	= 37 MBq
1 Microcurie (μ Ci)	= 10 ⁻⁶ Ci	= 3,7 x 10 ⁴ Bq	= 37 kBq
27 Millicurie (27 mCi)	= 1 GBq		
27 Microcurie (27μ Ci)	= 1 MBq		
1 Nanocurie (1nCi)	= 10 ⁻⁹ Ci	= 3,7 x 10 ¹ Bq	
1 Picocurie (1pCi)	= 10 ⁻¹² Ci	= 3,7 x 10 ⁻² Bq	

په ۱۰- جدول کې د اکتیویتی پخوانی واحد یانې کیوري په بیکاریل سره اړول شوی دی



د رادیواکتیو تجزی قانون (Radioactive Decay Law)

دیوه رادیواکتیو عنصر اکتیویټي A دوخت t په تابع سره دلاندني قانون په بنسټ کمښت مومي.

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda \cdot N$$

نوموړې تفاضلي معادله دلاندني فرمول په اچولو سره حل کيږي.

$$N(t) = N(0) \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

په پورتنۍ معادله کې $N(t)$ درادیواکتیو هستو شمیر په وخت t ، او $N(0)$ درادیواکتیو هستو شمیر دوخت شمیرنې په پیل کې یانې کله چې وخت صفر وټاکل شي ($t=0$) او بیا رادیواکتیو هستې اندازه شي اولامده λ دتجزیې یوه ثابت ده چې دهر نوکلید لپاره ځانګړی قیمت لري. په نوموړې معادله کې د اکسپوننسیال تابع (Exponential function) قاعده (Basis) یو عدد(شمیره) ټاکل شوې چې دیوه جرمني ساینس پوه په نامه یانې اویلرنومي Euler ریاضي پوه ($Euler Number = e$) په ویاړ سره نومولی شوی او مساوي دی له:

☞ د اویلر عدد(شمیره) مساوي دی له: ($e = 2,7182$)

فزیکي نیمایي وخت یا د عمر موده ($Half\ life = T_{1/2}$)


فزیکي نیمایي وخت هغه وخت ته ویل کیږي چې په نوموړې موده کې د یوه ټاکلي رادیواکتیو عنصر دهستو شمیر $N(t) = N(T_{1/2})$ د لومړني وخت هستو شمیر $N(t=0)$ په پرتله نیمایي ته راولوړي. کله چې په پورتنۍ معادله کې دغه کرنلاره تر سره کړو نولرو چې:

$$N(T_{1/2}) = \frac{N(0)}{2} = N(0) \cdot e^{-\lambda \cdot T_{1/2}}$$

کله چې دپورتنۍ معادلې د دواړو اړخونو طبیعي لوګاریتم ($\text{Logarithmus Naturalis} = \ln$) ونیسو نو د فزیکي نیمایي عمر $T_{1/2}$ او د تجزیې ثابت لامده λ تر منځ دلاندنی اړیکې لاس ته راځي.

که په یادولرو چې د دوو عدد(شمیره) طبیعي لوګاریتم یانې ($\ln 2 = 0,693$) سره مساوي دي نو د فزیکي نیمایي عمر لپاره لیکلای شو چې:

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,693}{\lambda}$$



اویا د لامدا لپاره لیکلای شو چې:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \frac{0,693}{T_{1/2}}$$

کله چې د لامدا دغه فرمول څخه کارواخلو نو د اکتیویټي A لپار لیکلای شو چې:

$$A = N(0) \times \lambda \times e^{-0,693 t / T_{1/2}}$$

که د لومړني وخت اکتیویټي په A(t=0) سره وښوونو لیکلای شو چې:

$$A(0) = N(0) \times \lambda$$


په پایله کې د رادیو اکتیویټي تجزیي قانون د فزیکي نیمایي وخت په تابع سره تر لاسه کیږي.

$$A(t) = N(0) \times \lambda \times e^{-0,693 t / T_{1/2}} = A(0) \times e^{-0,693 t / T_{1/2}}$$

د ریاضي د یوه بل فرمول په مرسته سره هم کولای شو چې دهغورادیو اکتیو هستو شمیر N(t) چې په اوسني وخت کې یې اندازه کوو تر لاسه کړو. که چیرته د هستو نیمایي عمر په $T_{1/2}$ او د لومړني وخت هستو شمیر په N(0) سره وښوونو دهغو هستو شمیر N(t) چې په وخت t کې موجود دي په لاندې ډول سره تر لاسه کولای شو:

$$N(t) = \frac{N(0)}{2^{t/T_{1/2}}} = N(0) \times 2^{-t/T_{1/2}}$$

ددې لپاره چې موږ وښودلای شو چې پاسنۍ معادله لکه درادیو اکتیویټي قانون په شان دباور وړده نو لاندنۍ شمیرنه تر سره کوو. د بېلگه په ډول که چیرته دوخت t په ځای په خپل وار سره یو ځل نیمایي عمر ($t = 1T_{1/2}$)، دوه ځله نیمایي عمر ($t = 2T_{1/2}$) او درې ځله نیمایي عمر ($t = 3T_{1/2}$) په پورتنۍ معادله کې واچوو نو درادیو اکتیو هستو شمیر N هم دنوموړي وخت دتیریدلو سره سم په خپل وار سره د لومړني وخت رادیو اکتیو هستو شمیر N(0) په پرتله نیمایي برخې ($N(0)/2$)، څلورمې برخې ($N(0)/4$) او اتمې برخې ($N(0)/8$) ته رالویږي. **دوروستي ریاضي فرمول گټه په دې کې ده چې که د خپلې خوښې سره سم وخت وټاکو او بیا یې د نیمایي عمر په وخت واړوو نو په ډیره اسانۍ سره په نوموړي معادله کې د اکپونېسیال تابع (Exponential function) چې په قاعده کې یې ددو عدد (شمیره) (2) او په طاقت کې یې دنیمایي عمر دی شمیرنه تر سره کړو. په پایله کې دوروستي ریاضي فرمول په مرسته سره کولای شو چې د اکتیویټي A لپاره یو اسانه فرمول ولیکو:**



$$A(t) = A(0) \times e^{-\frac{0,693}{T_{1/2}} t} = \frac{A(0)}{2^{t/T_{1/2}}}$$

د کین اړخ اکسپوننسیال تابع په بل ډول اړوو.

$$e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t} = (e^{-\ln 2})^{\frac{t}{T_{1/2}}}$$

څرنگه چې $e^{-\ln 2} = 1/2$ سره دی نو لرو چې:


$$\frac{A(t)}{A(0)} = 2^{-\frac{t}{T_{1/2}}}$$

کله چې دپورتنۍ معادلې دواړه اړخونه دطبیعی لوگاریتم (ln) لاندې ونیسو نو د یوه نا څرگنده وخت t او اکتیویټي دتناسب (A/A_0) تر منځ لاندنۍ اړیکې تر لاسه کيږي.


$$-\frac{t}{T_{1/2}} \ln 2 = \ln \left(\frac{A(t)}{A(0)} \right)$$

$$t = -\ln \left(\frac{A(t)}{A(0)} \right) \times T_{1/2} \times 1,443$$

د بېلگه په ډول په ۱۲- شکل کې د هایدروجن اتوم یو ایزوټوپ تریسیم (Tritium) نیمایي عمر دکالونو په واحد په افقي محور او د اتومونو تجزیه په عمودي محور باندې شول شوی دی. دنوموړي ایزوټوپ نیمایي عمر لږ څه ۱۲ کاله دی داځکه چې وروسته له نوموړو کالونو څخه دراديو اکتیو هستو شمیر د لومړني وخت په پرتله پنځوس په سلو کې یانې نیمایي ته را لویږي.



۱۲- شکل: دهایدروجن اتوم ایزوټوپ تریسیم (Tritium = H-3) لپاره د تجزيي قانون دنیمايي عمر



په تابع اودکالونوپه واحد سره بنودل شوی دی. رادیواکتیو اتومونه په زیررنگ اونه رادیواکتیواتومونه په سپین رنگ بنودل شوي دي. (34)

دنوموړي شکل څخه بنکاريزي چي که دوخت موده صفروي نودتریسیم رادیواکتیوهستوشمیرپه سلوکي سل دی. دیونیمایي وخت یانې 12,3 a کاله څخه وروسته پنځوس په سلو کې اود دوه ځله نیمایي وخت یانې 24,6 a کاله څخه وروسته لږ څه پینځه وینست په سلو کې رادیو اکتیو اتومونه پاتې کيږي.


په سلوکي داکتیویتي پاتې برخه	Activity(2^{-n}) داکتیوهستوبرخه	n. $T_{1/2}$ د نیمایي وخت شمیر
100%	$1/2^0$	0 $T_{1/2}$
50%	$1/2^1$	1 $T_{1/2}$
25%	$1/2^2$	2 $T_{1/2}$
12,5%	$1/2^3$	3 $T_{1/2}$
6,25%	$1/2^4$	4 $T_{1/2}$
3%	$1/2^5$	5 $T_{1/2}$
1,5%	$1/2^6$	6 $T_{1/2}$
0,7%	$1/2^7$	7 $T_{1/2}$
0,4%	$1/2^8$	8 $T_{1/2}$
0,2%	$1/2^9$	9 $T_{1/2}$
0,1%	$1/2^{10}$	10 $T_{1/2}$

۱۱- جدول: دیوه رادیو اکتیو عنصر درادیواکتیویتي کمښت د نیمایي عمر شمیر ($n \times T_{1/2}$) په تابع سره بنودل شوی دی.

د بېلگه په ډول دیوه نیمایي عمر څخه $n = 1T_{1/2}$ وروسته یوازې پنځوس په سل کې او دلسو نیمایي عمرو $n = 10T_{1/2}$ څخه وروسته د لومړي اکتیویتي یوازي زرمه برخه پاتې کيږي.

هر یو رادیونوکلید ځانگړی فزیکي نیمایي وخت لري چي کچه یې د یوې ثا نېې نه هم کوچني کېدای شي او تر بلیونو کالونو پورې هم رسیږي. د بېلگه په ډول دایوداین Iodine-131 نیمایي عمر اته ورځې، دسېزیم Caesium-137 نیمایي عمر لږ څه دیرش کاله، دکاربون څوارلس Carbon-14 ایزوتوپ پینځه زره اوه سوه دیرش کاله 5730 y او یورانیم دوه سوه اته دیرش Uranium-238 څلورزره څلورسوه اويا ملیونه کالونو 4470 million years ته رسیږي.

* **پوښتنه:** په هستوي طب (Nuclear Medicine) کې د تخنېسیم (Technecium 99m) څخه د سرطان ناروغیوپه پیژندلوکې هراړخیزه گټه پورته کيږي. دنوموړي رادیواکتیو عنصر نیمایي وخت شپږساعته دی ($T_{1/2} = 6 \text{ hour}$). دڅومره وخت څخه وروسته د دغه عنصر یو په شپاړسمه برخه ($1/16$) برخه پاتې کيږي؟



* **حل:** د تخنيسيم Tc-99m راډيوآکټيو عنصر نيمايي وخت $T_{1/2}$ او د تجزيې ثابت λ او تير شوي وخت t تر منځ لاندنی اړيکې شته دي.

$$\lambda = \frac{0,693}{T_{1/2}} = \frac{0,693}{6} = 0,1155 / \text{hour}$$

کله چې د لامبدا پورتنی قیمت د تجزيې په معادله کې واچو او د لومړي وخت اتومونو شمير په N_0 سره وېښو نولرو چې:

$$\frac{N_t}{N_0} = \exp(-\lambda t)$$

$$\frac{N_t}{N_0} = \frac{1}{16}$$

$$\frac{1}{16} = \exp(-0,1155t)$$

$$t = \frac{\ln 16}{0,1155} = 24 \text{ hours}$$

* **ځواب:** د څلرو شتو ساعتونو څخه (24 hours) وروسته د تخنيسيم يوه شپاړسمه برخه اکتیویتي پاتې ده.

* **بېلګه:** يوه سيمه په طبيعي يوراننيوم U-238 باندې ککړه شوې ده او يوه سمپل Sample يا نې نمونه چې وزن يې دوه سوه اته ډيرش گرامه دي په يوه لابراتوار کې تجربه شوه او د اکتیویتي اندازه يې لږ څه درې مېگا بېکارېل (2,95 MBq) وټاکل شوه.


* **پوښتنه:** دنوموړي يوراننيوم د نيمايي عمر وخت به څومره وي؟

* **حل:** څرنگه چې د يوراننيوم مولار کتلي وزن Mole Mass دوه سوه اته ډيرش گرامه دي (238 g) نو په يوه مول کتله کې د اتومونو شمير N د اووگادرو عدد (Avogadro Number = N_A) سره مساوي دی نو د اکتیویتي A ، د تجزيې ثابتي لامدا λ او نوموړي عدد (شميره) N_A تر منځ لاندنی اړيکې اعتبار لري.

$$A = \lambda \times N_A$$

اکتیویتي = د تجزيې ثابت × اووگادرو عدد

څرنگه چې په يوه مول يوراننيوم کې د اتومونو شمير مساوي ده له $N_A = 6,022 \times 10^{23} / \text{Mol}$ او د سمپل اکتیویتي مساوي ده له $A = 2,95 \text{ MBq} = 2,95 \times 10^6 \text{ Bq}$ نو د لامدا λ قیمت په لاندې ډول سره تر لاسه کولای شو:




$$\lambda = \frac{A}{N_A} = \frac{2,95 \times 10^6 \text{ Bq}}{6,022 \times 10^{23} \text{ Mol}} = 4,899 \times 10^{-16} \text{ s}^{-1}$$

د یورانیمو د عمر نیمایي وخت $T_{1/2}$ دلاند معادلې څخه لاس ته راځي


$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,693}{4,899 \times 10^{-16} \text{ s}^{-1}} = 1,42 \times 10^{15} \text{ s} = 4,49 \times 10^9 \text{ a}$$

* **ځواب:** د طبیعي یورانیمو د عمر نیمایي وخت **لږ څه څلور نیم ملیارده کاله** (Year = a) دی. دا په دې مانا چې وروسته له نوموړې مودې څخه به هم دغه سیمه په رادیواکتیو موادو ککړه پاتې شي داځکه چې د یورانیمو سمپل د لومړي وخت درې مېگا بېکاریل اکتیویټي څخه به یونیم مېگا بېکاریل اکتیویټي لا نور هم پاتې وي.

د یوه رادیو اکتیو ایزوټوپ د تجزي اکسپوننسیال (Exponential decay) گراف د وخت په تابع سره په دوه ډوله بنودلای شو. لومړې داچې عمودي محوري سم سیخ یا خطي ویش (سکېل) ولري او دوهم داچې عمودي محوري لوگاریتم په شکل سره وي. په ۱۳- شکل کې د رادیو اکتیو ایزوټوپ لکه طلا (Au^{198}) لپاره نوموړې دواړه کړنلارې بنودل شوي دي.



۱۳- شکل: د طلا رادیو اکتیو ایزوټوپ (Au^{198}) د لومړني وخت سل ملیونو اتومونو (10^8 atoms) د تجزي گراف دورځو (days) په تابع سره چې نیمایي وخت یې لږ څه درې ورځې ($t_h = 2,69 \text{ d}$) دی په دوه ډوله بنودل شوی دی. په چپ اړخ گراف کې عمودي محور په خطي او شي اړخ گراف کې په لوگاریتم ویش سره بنودل شوی دی (15).



دېلام وړ: په يوه گرام ماده کې د الکترونو او يا اتومونو شمير کولای شو چې داوگادرو عدد(شميره) څخه تر لاسه کړو. اوگادرو عدد(شميره) د اتومونو شمير د يوې مادې په يوه گرام کتله کې مالوموي او دهمغه عنصر داتومي وزن ($\text{Atomic Weight} = A$) سره مساوي دی.

دبيلگې په ډول څرنگه چې د کاربون عنصر داتومي وزن ډولس دی نو داسې مانا لري چې د کاربون عنصر ډولس گرامه $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ شمير اتومونه لري. که چيرته يوه ماده تر نظر لاندې ونيسو چې داتوم وزن يې په A او داتوم عدد(شميره) يې ($\text{Atomic Nuber} = Z$) په Z سره وښيو نو داوگادرو عدد(شميره) د دتعريف سره سم ليکلای شو:

په يوه گرام ماده کې داتومونو شمير $\text{Number of atoms per g} = N_A/A$
 په يوه گرام ماده کې دالکترونو شمير $N_e = \text{Number of electrons per g} = N_A Z/A$

دهايدروجن عنصر داتومي وزن مساوي دی له لږ څه يوگرام تقسيم په يو مول او د طبيعي يوراننيوم داتومي وزن دوه سوه اته ديرش گرامه په يو مول قيمت لري.

* پوښتنه: په (0,2 gramm) يانې دوه سوه ملي گرام اوبو کې د ماليکولو شمير مالوم کړی؟

* حل: څرنگه چې د يومول اوبو وزن اتلس گرامه دی 18.0 g/mol نو د صفر عشاريه دوه گرام اوبو وزن په مول سره مساوي دی له:


$$0,2 \text{ g} \div 18 \text{ g/mol} = 0,0111 \text{ mol}$$

$$0,0111 \text{ mol} \times 6,022 \times 10^{23} \text{ molecules/mol} = 0,067 \times 10^{23} \text{ molecules/mol}$$

* ځواب: په دوه سوه ملي گرام اوبو کې لږ څه اوه شپيته ضرب د لس په طاقت دشل ماليکولونه شته دي.

د يوه راډيواکتيو عنصر منځنی وخت ($\text{Average time} = T_a$)

نوموړی هغه وخت ته وايي چې ديو عنصر راډيواکتيويتي داويلر عدد(شميره) ($e = 2,718$) ضريب په کچه کمښت ومومي. تجر بو ښودلې ده چې ديوه راډيو اکتيو عنصر منځنی وخت T_a د تجزيې ثابته λ او د نيمايي عمر $T_{1/2}$ ترمنځ لاندنی اړيکې تر لاسه کيږي.



$$T_a = \frac{1}{\lambda} = \frac{t}{0,693} = 1,44 \times T_{1/2}$$

د یوې رادیو اکتیو مادې د هستو شمیر N = د مادې اکتیویټي A ضرب رادیو اکتیو مادې منځنۍ وخت T_a

$$N = \text{Number of nuclei} = T_a \times \text{Activity} = 1,44 \times T_{1/2} \times \text{Activity}$$

اویا د یوې مادې د اکتیویټي A لپاره په لنډ ډول لیکو:

$$\text{Activity} = 0,693 \times N / T_{1/2}$$

رادیو اکتیویټي = د هستو شمیر $0,693 \times$ تقسیم په نیمایي وخت

* **پوښتنه:** د یوه ناروغ پروستا تا Prostata په غده کې د وه ملي کیوري 2 mCi رادیو اکتیو طلا ایزوتوپ Au-198 د درمل په موخه کینودل کیږي. دنوموړي ایزوتوپ د خپرې شوو هستو شمیر محاسبه کړئ چېرته د طلا ایزوتوپ نیمایي عمر $2,9 \text{ d}$ ورځې وې.

* **حل:** یوه ورځ چې په ثانیه و اړول شی نو مساوي ده $1 \text{ day} = 8,64 \times 10^4 \text{ s}$
منځنۍ وخت T_a مساوي دی له:

$$T_a = 1,44 \times T_{1/2} = 1,44 \times (2,69 \text{ d}) = 3,7 \text{ d}$$


څرنگه چې د خپرې شوو هستو شمیر مساوي دي له: اکتیویټي ضرب د منځنۍ وخت نو لروچي:

$$2,0 \text{ mCi} \times 3,87 \text{ d} = 7,74 \text{ mCi d} = 7,74 \text{ mCi} \times 8,64 \times 10^4 \text{ s} = 6,69 \times 10^5 \text{ mCi s}$$

$$2,0 \text{ mCi} \times 3,87 \text{ d} = 6,69 \times 10^5 \times 3,7 \times 10^7 \text{ Bq s} = 2,48 \times 10^{13} \text{ Bq s} = 2,48 \times 10^{13}$$

* **ځواب:** د منځني وخت په موده کې لږ څه دیرش بلایونه هستې او یا په بل عبارت لږ څه درې ضرب د لس په طاقت د دیا رلسو هستې د رادیو اکتیو طلا څخه خپرېږي او د ناروغ په نسجونو کې جذب کیږي.

* **پوښتنه:** د رادیو اکتیو طلا ایزوتوپ Au-198 نیمایي عمر $T_{1/2} = 2,69 \text{ d}$ ورځې دی نو وروسته له اوو ورځو 7 d د پاتې شوو رادیو اکتیو اتومونو N شمیر معلوم کړئ په داسې حال کې چې د طلا د لومړي وخت د اتومونو شمیر $N_0 = 10^8$ قیمت ولري.



* **حل:** کله چې د تجزيي تیر شوی وخت t موده د نیمایي عمر په واحد وایرونو لرو چې :

$$t/T_{1/2} = 7/2,69 = 2,60$$

دېلې خوا لاندنۍ شمیرنه را ښيي: $2^{2,60} = 6,06$ د طلا تومونو شمیر N د وخت t د تیریدلو څخه وروسته د لاندني فرمول څخه لاس ته راځي.

$$N = \frac{N_0}{2^{\frac{t}{T_{1/2}}}} = \frac{10^8}{2^{2,60}} = 1,65 \times 10^7$$

* **ځواب:** د اوو ورځو په موده کې د رادیو اکتیو طلا څخه لږ څه شپاړس نیم ملیونه هستې خپریږي.

* **بیلگه:** د پولونیم Po-210 نیمایي عمر یو سلو اته دیرش 138 d ورځې دی. دنوموړي عنصر یوه نمونه تر لاسه شوه چې اکتیویټی یې درې سوه مایرکروکیوري $A(0) = 300 \mu\text{Ci}$ وټاکل شوه.

* **پوښتنه:** وروسته له دریو کالونو څخه (1095 days = 3 years) به د پولونیم اکتیویټي څومره وي؟

* **حل:** تر هر څه دمخه د نیمایي عمر شمیر $n = t/T_{1/2}$ تر لاسه کوو نولرو چې:
 $n = t/T_{1/2} = 1095 \text{ days} / 138 \text{ days} = 7,91 \text{ half lifes}$ یا نې لږ څه اته نیمایي عمره کیږي.


$$A(t) = A(0) \times (1/2)^n = 300 (1/2)^{7,91} = 300 (0,00416) = 1,25 \mu\text{Ci}$$

* **ځواب:** وروسته له دریو کالو څخه د پولونیم نمونې اکتیویټي لږ څه $1,25 \mu\text{Ci}$ را شکته کیږي که دلومړي وخت رادیو اکتیو تومونو شمیر په N_0 سره وښیونو د این n شمیر نیمایي وخت تیریدلو څخه وروسته د پاتې رادیو اکتیو هستو شمیر N د لاندې فرمول څخه تر لاسه کیږي .

$$N = N_0 \times (1/2)^n$$

په رادیوکیمیا (Radiochemistry) کې د فزیکي نیمایي عمر ګټور استعمال

د یوه رادیو اکتیو عنصر د فزیکي نیمایي عمر په مرسته سره کولای شو چې د معدني ډبرو، نباتاتو او لرغونو اثارو د منځ ته راتلو او یا د عمر موده وټاکو. په دې اړوند د رادیو کاربون طریقه (Radiocarbon Methode) دیادونې ورده چې دلوموړي ځل لپاره د یوه امریکایي ساینس پوه له خوا په کار و اچول شوه او په ۱۹۶۰ م کال کې د نوبل جایزې په اخیستلو بریالی شو. د بېلګه په ډول کله چې د کیهان له خوا



کازمېکي وړانګې (cosmic rays) د ځمکې اتموسفیر ته راننځي نو د هوا داتومونو سره غبرګون کوي چې د هستوي تعامل په پایله کې یولر ګڼ شمیر هستوي ذرې لکه پروتون، نیوترون، مېزون، ګاما کوانت اونورې ذرې منځ ته راځي. نو کله چې یو حرارتي نیوترون n د هوا نایټروجن N^{14} هستې څخه جذب شي نو په پایله کې رادیو اکتیو کاربون ($C-14$) لا س ته راځي. دنوموړي هستوي تعامل معادله په لنډ ډول سره داسې لیکل کیږي: $N^{14}(n,p)C^{14}$. په دغه هستوي تعامل کې پیدا شوي کاربون ($C-14$) عنصر رادیو اکتیو خاصیت لري او د بېتا وړانګې خپروي چې په پایله کې په نه چاودیدونکي ثابت نایټروجن باندې اوږي.



په اتموسفیر کې دکاربون دوه ډوله ایزوټوپونه موجود دي. یورادیو اکتیو $C-14$ او بل نه رادیواکتیو $C-12$. نوموړي د کاربون دواړه ایزوټوپونه په ګډه سره یو داسې مرکب په هوا کې جوړوي چې دهغوی تناسب په اتموسفیر کې تل ثابت دی $C^{14}/C^{12} = \text{constant}$ او له دې کبله په سل کې یوه ټاکلي اندازه سره یوه برخه د رادیو اکتیو کاربون $C-14$ او بله برخه یې د نه رادیواکتیو کاربون $C-12$ څخه جوړه شوی ده.

➤ د کاربون $C-14$ اټومونو او کاربون $C-12$ تناسب مساوي دي له: $C^{14}/C^{12} = 1,2 \times 10^{-12}$

رادیو اکتیو کاربون C^{14} چې نیمایي عمر یې 5730 years کاله دي دځمکې په لور اتموسفیر کې منځ ته راځي او بیا د هوا د نه رادیواکتیو کاربون C^{12} سره یو مرکب جوړوي. کله چې هوا دیوه ژوندي اورګانیزم له خوا تنفس شي نو د بدن په حجرو کې یې دکاربون دواړه ایزوټوپونه په یوه ثابت تناسب سره موجودوي. کله چې یو اورګانیزم ومري نودهغې سره سم د هوا کاربون هم اضافه نه شي تنفس کولای. خو په اورګانیزم کې درادیواکتیو کاربون برخه دوخت په تیریدلو سره تجزیه کیږي. کله چې درادیواکتیو کاربون اندازه د اورګانیزم په یوګرام ماده کې تر لاسه کړو نو کولای شو چې ددغه اورګانیزم د پیدایښت نیټه وټاکو.

که فرض کړو چې یوه لرغوني مجسمه چې دونې لرګي څخه جوړه وي تر نظر لاندې ونیسو او کله چې دغه ونه زړه شي او ومري نو وروسته له هغه دواړه ډوله کاربون د ځان په حجرو کې نه شي جذب کولای. نو ددې نیټې څخه وروسته درادیو اکتیو کاربون برخه $C-14$ دوخت په تابع سره اکسپونېنسیال کمښت مومي او د نه رادیو اکتیو کاربون $C-12$ برخه ثابته او په خپل حال پاتې کیږي. څرنگه چې نوموړي دواړه ایزوټوپونه داسې یو مرکب جوړوي چې په خپل منځ کې یو ثابت سلیز تناسب لري نو کله چې ددغې ونې د یوه تازه لرګي یوه ټا کلی نمونه د بېلګه په ډول لکه یوګرام راواخلو او د رادیو اکتیو کاربون اکتیویټي یې اندازه کړو او بیا دیوه ګرام لرغوني مجسمې لرګي یو ګرام اکتیویټي اندازه کړو نو د نوموړو نمونو د رادیو اکتیویټي د توپیر څخه کولای شو چې د لرغوني مجسمې د عمر مخ وینه وکړو. درادیوکاربون طریقه په لرغون پوهنه (Archaeology)، حیا لوجي، بیالوژي، طبابت، بیوفزیک او ګیوفزیک کې د شیانو د عمر معلومولو په موخه په کار اچول کیږي.

* **پوښتنه:** د لرګي په یوه لرغوني مجسمه کې دیوه کیلوګرام رادیواکتیو کاربون $C-14$ اکتیویټي یو سلو او یا بیکاریل $A(t) = 170 \text{ Bq/Kg carbon}$ او دیوه تازه او همدغه جنس لرګي لومړني وخت دیوه کیلو ګرام اکتیویټي $A(0) = 230 \text{ Bq/Kg carbon}$ اندازه شوه. د نوموړي مجسمې د عمر موده مالومه کړی؟



۱۳- شکل: دیوه کیلو گرام تازه لرګي دکاربون عنصر اکتیویټي دوه سوه دیرش بیکاریل او د لرغوني مجسمي یو کیلو گرام لرګي اکتیویټي یوسلو او یا بیکاریل اندازه شوی دی.

حل: څرنګه چې په لومړي وخت کې د رادیو اکتیو او نه رادیو اکتیو کاربون تر منځ په سلیزه برخه کې یو ثابت تناسب موجوده نو دهغه وخت نه راپدې خوا تر اوسه پورې دومره وخت تیر شوی دی چې د تجزیې وخت t سره برابر دی. نوموړی وخت د نیمایي وخت $T_{1/2}$ په مرسته سره په لاندې ډول محاسبه کولای شو.


$$t = -\ln\left(\frac{A(t)}{A(0)}\right) \times T_{1/2} \times 1,443$$

څرنګه چې درادیو اکتیو کاربون C-14 د تجزیې فزیکي نیمایي وخت پینځه زره اوه سوه دیرش کاله (5730 a) دي نو لرو چې:

$$t = -\ln\left(\frac{A(t)}{A(0)}\right) \times T_{1/2} \times 1,443 = -\ln\left(\frac{170 \text{ Bq}}{230 \text{ Bq}}\right) \times 5730 \text{ a} \times 1,443 = 2500 \text{ a}$$

خواب: د لرغوني مجسمي د عمر موده لږ څه دوه زره پینځه سوه 2500 a کاله ده.

پوښتنه: په یوه بڼ کې دوه کټ مټ یوشان نیالګي کینول شول چې د رادیو اکتیو او نه رادیو اکتیو کاربون کثافت یې په تازه حالت کې سره یو برا بر دی. که چیرته یو ددغو نیا لګیو څخه وچ شي نو د کاربون تناسب یې سره توپیر کوي. که فرض کړو چې د لامده نیالګي په یوه ټاکلي نمونه کې د کاربون اندازه څلور ګرامه (4 g) اود وچ شوي لرګي په همغه کچه نمونه کې د کاربون اندازه درې عشریه پینځه نوي ګرام (3,95 g) قیمت ولري نو د وچ شوي لرګي د مړینې نیټه معلومه کړی؟



* **حل:**

* په لومړي وخت کې د کاربون اندازه $N_i = 4 \text{ g}$

* په اخير وخت t کې د کاربون اندازه $N_f = 3,95 \text{ g}$

* د راديو کاربون نيمايي وخت مساوي ده له: $T_{1/2} = 5730 \text{ y}$

کله چې پاسني قېمتونه په لاندنۍ معادله کې واچوو نو د وچ شوي لرگي د مړينې نيټه t ترلاسه کېږي.

$$N_f = N_i \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{T_{1/2}}}$$

$$3,95 = 4 \left(\frac{1}{2} \right)^{t / 5730}$$

کله چې د پورتنۍ معادلې لوگاريتم ونيسو نو لرو چې: $t = 5730 \ln(3,94/4)$

او د تيروخت لپاره لاندنۍ موده لاس ته راځي. $t = 104 \text{ years}$


* **ځواب:** د وچ شوي نيالکي د مړينې موده يوسلو څلور کاله ده.

بيالوژيکي نيمايي وخت (Biological half life = T_{bio})

بيالوژيکي نيمايي وخت يا نيمايي عمر هغې مودې ته وايي چې په هغه کې ديوه بيالوژيکي اورگانيزم لکه د انسان بدن او څلورپېښي ته دخوراک له لارې ورننوتلي راديواکتيو موادو اندازه د فزيکي او بيالوژيکي پروسو لکه مېتاباليزم، افراز او ترشح له لارې د لومړي وخت په پرتله نيمايي ته را ټيکنه شي او په پايله کې نيمايي په بدن کې پاتې شي او نيمايي د بدن څخه ووځي.

اغيزمن نيمايي وخت (Effective half life = T_{eff})


اغيزمن نيمايي وخت هغه وخت دی چې دهغه د تيريدلونه وروسته په بدن کې د يوراديواکتيو عنصراندازه د لومړي وخت په پرتله ديوې خوا د فزيکي کړنلارې لکه راديو اکتيو تجزيه او دبلي خوا د بدن څخه د بيالوژيکي پروسو لکه افراز او ترشح له لارې نيمايي ته راولويزي. اغيزمن نيمايي وخت په هستوي طب کې ديوه غړي لکه تايرايډ او يا پښتورگي دانرژي دوزد اټکلو او دنوموړو غړو د کارکولو په هکله مالومات تر لاسه کول يو ډير غوره اوگټور کميت گڼل کېږي. دنوموړو دريونيمايي وختونو يانې بيالوژيکي T_{bio} ، فزيکي T_{phys} او اغيزمن نيمايي وخت T_{eff} تر منځ لاندنۍ اړيکې اعتبار لري.




$$\frac{1}{T_{eff}} = \frac{1}{T_{biol}} \oplus \frac{1}{T_{phys}}$$

دپاسنی معادلې څخه اغیزمن نیمایي وخت T_{eff} په لاندې ډول لاس ته راوړو:

$$T_{eff} = \frac{T_{biol} \times T_{phys}}{T_{biol} \oplus T_{phys}}$$



۱۴- شکل: د بدن په یوه غړي کې دیوه رادیو اکتیو عنصر د نسبي اکتیویټي کمښت د اغیزمن نیمایي وخت T_{eff} ، فزیکي نیمایي وخت T_p او بیالوژیکي نیمایي T_b وخت په تابع سره ښودل شوی دی. د بېلگه په ډول که چیرته یو رادیواکتیو عنصر بدن ته دناروغی دپیژندلو په موخه پیچکاري شي چې بیالوژیکي نیمایي وخت یې درى ساعته او فزیکي نیمایي وخت یې پینځه ساعته وي نو اغیزمن نیمایي وخت یې لږ څه دوه ساعته دی. دا په دې مانا چې دنوموړئ وخت څخه وروسته په بدن کې دلومړي وخت نیمایي اکتیویټي پاتې کیږي. (37)



- * **بېلگه:** د ټايرايډ غدې دناروغۍ دتشخيص په موخه يوه ناروغ ته د راديو اکتیو ^{131}I لس ميگا بيکارل 10 MBq اکتیویتی په رگونوکي ور پېچکاري شول. د نوموړي راديو اکتیو عنصر فزیکي نیمایي وخت اته ورځې 8d او بيالوژيکي نیمایي وخت اتيا ورځې 80d قيمت لري.
- * **پوښتنه:** داغيزمن نیمایي وخت موده څومره ورځې $(d = \text{day})$ ده؟

$$T_{\text{eff}} = \frac{80 \times 8}{80 \oplus 8} = 7,27\text{ d}$$


- * **ځواب:** اغيزمن نیمایي وخت لږ څه اوه ورځې دی.

اغيزمن نیمایي وخت	بيالوژيکي نیمایي وخت	فزیکي نیمایي وخت	راديو نکليد
13,99 لږ څه څوارلس کاله	14 څوارلس کاله	4500000000 څلورنيم مليارده کاله	Uranium-238 په هډوکو کې
49,9 کالونه	50 کاله	24110 کاله	Plutonium-239 په هډوکو کې
109 ورځې	110 ورځې	30,2 کاله	Caesium-137 غړوکي جذب کيږي
96 ورځې	110 ورځې	2,1 کاله	Caesium-134 غړوکي جذب کيږي
7,3 ورځې	80 ورځې	8 ورځې	Iod-131 ټايريد غده کې جذب کيږي

۱۲- **جدول:** دځينو راديو اکتیو عنصر ونولپاره چې د بدن په غړو کې په لوړه کچه جذب کيږي د فزیکي نیمایي وخت، بيالوژيکي نیمایي وخت او اغيزمن نیمایي وخت شميرنه ښودل شوې ده.

- (1) په هډوکو کې ديورانيم ^{238}U بيالوژيکي نیمایي وخت څوارلس کاله دی (14 years)
- (2) ديورانيم ^{238}U فزیکي نیمایي وخت څلورنيم مليارده کاله دی (4500000000 years)
- (3) ديورانيم ^{238}U اغيزمن نیمایي وخت لږڅه څوارلس کاله دی

👉 **پايله:** که ديوې سيمي چاپيريال په يورانيم ککړشي نو تر زرگونو کالونو پورې به نوموړې سيمه د اوسيدلو وړ نه وي. داځکه چې دنوموړي عنصر اکتیویتی د څلورنيم مليارده کالو څخه وروسته بيا هم نیمایي راديو اکتیواتومونه لري اوله دې کبله چاپيريال په راديو اکتیويورانيم ککړ پاتې کيږي.



* **بېلگه:** په يوه ناروغ کې دتایراید اډینوم (Adenom cancer) سرطان وپیژندل شو او ددرملنې په موخه هغه ته دراديواکتيوایوډین J-131 نهه سوه شپيته ميگا بيکارل $A = 960 \text{ MBq}$ اکتیویتي د گوليو په شکل ورکول کيږي. دسودیم ایوډید ډيډکتور (NaI-detector) په مرسته داندازه کولو په پایله کې ثابت شوه چې دنوموړي اکتیویتي څخه په تایراید کې یوازې اته ویشته په سل کې $S = (28\%)$ ذخیره شوئدی.

* **پوښتنه:** که چیرته دتایراید اډینوم سرطان کتله نونس گرامه $m_{Th} = 19 \text{ g}$ اود ایوډین راديوایزوتوپ اغیزمن نیمایي وخت اوه ورځی قیمت ولري ($T_{eff} = 7 \text{ d}$) نو په تایراید کې د بېتا وړانگو جذب شوي انرژي D معلومه کړی؟

* **حل:** د ایوډین انرژي طیف څخه څرگندیږي چې د بېتا وړانگو منځنی خپرېدونکي انرژي $E = 0,183 \text{ MeV}$ قیمت لري نوپه تایراید کې دجذب شوي انرژي ډوز $D[\text{Gy}]$ په واحد ډگري د لاندني فرمول په مرسته سره تر لاسه کولاى شو.


$$D = \frac{1}{m_{Th}} (S \cdot A \cdot E \cdot \frac{T_{eff}}{\ln 2})$$

$m_{Th} = 19 \text{ g} = 0,019 \text{ Kg}$	د تایراید سرطان کتله
$S = 28 \%$	په تایراید کې جذب شوي اکتیویتي
$0,183 \text{ MeV}$	د بېتا وړانگو منځنی انرژي
960 MBq	د درملنې په موخه ټاکل شوي ایوډین اکتیویتي
$1,602 \times 10^{-19} \text{ Joule} = 1 \text{ eV}$	ډیو ژول او الکترون ولټ تر منځ اړیکي
$\ln 2 = 0,693$	د دوو طبیعي لوگاریتم مساوي ده له:
$d = 86400 \text{ s}$	یوه ورځ مساوي ده له شپږ اتیا ذره او څلورسوه ثانیه

کله چې پورتنی قیمتونه په معادله کې واچوونو لرو چې :

$$D[\text{Gy}] = \frac{1}{0,019 \text{ Kg}} (0,28 \times 960 \text{ MBq} \times 0,183 \text{ MeV} \times 1,602 \times 10^{-19} \frac{\text{J}}{\text{eV}} \times 86400 \frac{\text{s}}{\text{d}} \times \frac{7 \text{ d}}{0,693}) = 361 \text{ Gy}$$


* **ځواب:** ددرملنې په موخه د اووورځو په موده کې تایراید ته درى سوه یو شپيته گري (361 Gy) انرژي ډوز رسیري.



بيالوژيکي نيمايي وخت	فيزيکي نيمايي وخت	نخيره کوونکي غړی	راديونکلید
10 ورځې	12,3 کاله	د بدن په اوبو کې	Tritium (H 3) تریسیم
40 ورځې	5730 کاله	د بدن په وازده کې	Carbon 14 (C 14) کاربون
30 ورځې	$1,28 \times 10^9$ کاله	عضلات	Potassium 40 (K 40) پوتاشیم
50 کاله	28,6 کاله	هډوکي	Strontium 90 (Sr 90) سټرونسیم
80 ورځې	8,02 ورځې	د تائیراد غده	Jod 131 (J 131) ایوډین
110 ورځې (په نارینه کې)، 65 ورځې (ښځو کې)	30,2 کاله	عظلاتو کې	Cäsium 137 (Cs 137) سیزیم
23 کاله	1600 کاله	سکېلیټ	Radium 226 (Ra 226) رادیوم
دوه کاله په پڼه او شل کاله په هډوکو کې	$1,4 \times 10^{10}$ کاله	په پڼه او هډوکو کې	Thorium 232 (Th 232) ټوریم
14 کاله د هډوکو په پوستکي کې	$4,5 \times 10^9$ کاله	په پښتورگو او هډوکو کې	Uran 238 (U 238) یورانیم
20 کاله په پڼه کې، 50 کاله د هډوکو په پوستکي کې	$2,4 \times 10^4$ کاله	په پڼه او هډوکو کې	Plutonium 239 (Pu 239) پلوتونیم

۱۳- جدول: د یو لړ مهمو رادیو اکتیو ایزوټوپونو فزیکي او بیالوژیکي نیمایي وخت او همدارنګه دا چې د بدن په کوم یوه غړي کې ډیر جذب کیږي ښودل شوې دي. دبیلګي په ډول پلوتونیم په ډیره خوښۍ سره د هډوکو په پوستکي کې جذب کیږي او د پینځوس کالو څخه وروسته یې نیمایي برخه په هډوکو کې پاتې کیږي او نیمایي برخه یې د بدن څخه وځي.

✓ **ډیام وړ:** کله چې بدن ته د سیماب زهرجن مواد ننوځي نو په لوړه کچه په ماغزو کې جذب کیږي. دنوموړي ډیر زهرجن عنصر بیالوژیکي نیمایي وخت په ماغزو کې لږڅه اتلس کاله دی. دا په دې مانا چې د اتلسو کالونو څخه وروسته دنوموړي عنصر نیمایي برخه لا هم په ماغزو کې پاتې ده او نیمایي برخه یې د بدن څخه وتلې ده.




پوښتنې (Questions) :

- ۱-۴ دراديو اکتیویتي تعریف څه دی؟
- ۲-۴ دراديو اکتیویتي واحد څه دی؟
- ۳-۴ دورانگو بیالوژیکي اغیزې دراديو اکتیو هستې په کومو خواصو پورې اړه لري؟
- ۴-۴ دطبیعی یورانیم فزیکي نیمایي وخت څوکاله دی؟
- ۵-۴ دهغه اټوم دکتلي نمبر اواتومي نمبر وښی کوم چې دیورانیم دوه سوه څلورد دیرش U-234 په کرنلاره کې منځ ته راځي؟
- ۶-۴ دیوه راديو اکتیو عنصر دنیمایي عمر شمیر مالوم کړی کله چې ددغه عنصر اکتیویتي په خپل وار سره پنځوس په سل، لس په سل اویوپه سل دلموري اکتیویتي په پرتله راولویري؟
- ۷-۴ په ۱۹۷۵ کال کې دکوبالټ شپيته یوگرام راديو اکتیو سرچینه Co-60 دعلي اباد په روغتون کې دسرطان ناروغیو په موخه په کار واچول شوه.


الف: دنوموړې سرچینې راديو اکتیویتي په اوسني کال ۲۰۰۷ م کال کې څومره ده

ب: دکوبالټ سرچینې وزن اوس هم یوگرام دی او که نه؟

- ۸-۴ دیوې زراعتي ځمکې یو کیلو گرام ترکاریو راديو اکتیویتي $A(t)$ اندازه شو او د هستو شمیرې دوه دیرش وټاکل شوچې په لاندني شکل کې دنیمایي وخت t په تابع سره په تورو ټکو ښودل شوي دي. دڅومره نیمایي وخت څخه وروسته د ترکاریو اکتیویتي صفر ته راولویري تر څوې له اندېښنې دخوراک وړ وگرځي





- ۱-۴ الف شکل: دیوکیلو گرام ترکاریو اکتیویتي $A(t)$ دنیمایي وخت t په تابع سره ښودل شوي دي.




پينځم څپرکی

وړانگې (Radiation)

په ۱۸۹۸ م کال کې يو انگرېز فزیک پوه (E. Ruherford) د تجربو په بنسټ رابرسیره کړه چې دهستوي تعاملاتو په ترڅ کې درې ډوله وړانگې خپريږي. نوموړې کارپوه دغه وړانگې د الفا وړانگې، بېټا وړانگې او گاما وړانگې په نوم يادې کړې. نوموړې وړانگې دځينو راديو اکتیو عناصرو څخه هم خپريږي او په يوه مقناطیسي ساحه کې دخپل سمت او خوا څخه کيږي. په ۱۵- شکل کې دنوموړو هستوي وړانگو دغه ډول خواص ښودل شوي دي.



۱۵- شکل: د یوې راديو اکتیو سرچینې څخه دالفا، بېټا او گاما وړانگې پورته خواته خپريږي او هلته د یوې مقناطیسي ساحې څخه تیريږي. نوموړې وړانگې په مقناطیسي ساحه کې داسې ډول تر اغیزې لاندې راځي چې دالفا او بېټا وړانگې د یوه بل مخالف سمت ته کيږي او د گاما وړانگې خپل سمت ساتي او مخامخ ځي. د بیلگې په ډول په نوموړي شکل کې دالفا وړانگې کين خواته او د بېټا وړانگې ښي خواته خپل سمت کروي (31). څرنگه چې بېټا وړانگې د الکترونو څخه جوړې دي او کتله یې د الفا ذرو په پرتله ډیره کوچنۍ ده نو له دې کبله په مقناطیسي ساحه کې خپل سمت ډیرې کيږي. که د الفا ذرې کتله په m_α بریښنايز چارج په Q ، سرعت یې په $v=15000 \text{ km/s}$ او د مقناطیسي ساحې شدت په B او د سمت کوروالي شعاع په r سره وښوئ نو د الفا وړانگې کتله د لاندني فرمول څخه تر لاسه کولای شو.



$$m_{\alpha} = Q B r / v = 6,644 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

دالفا ذرې کتله لږ څه اوه ضرب دلس په طاقت د منفي اوه ويشت کيلوگرام قيمت لري.

* **بيلگه:** کله چې دالفا وړانگې دکلود چمبر (Cloud chamber) په نامه يوې آلې ته ورننوځي نو دهغوی د خط السیر يانې د پله لاره ديوه مايکروسکوپ په مرسته سره په سترگو ليدل کيږي. دا ځکه چې نوموړې وړانگې د هوا لکه نايټروجن اتومونه ايونايښکوي او دغه ايونونه ديوه څاڅکي په بڼه ليدل کيږي او له دې کبله د شميرلو وړگرځي. څرنگه چې دهوا نايټروجن اتوم ايونايښن انرژي لږ څه شپاړس الکترون ولټ قيمت لري (15,6 eV) نو دڅاڅکو د شمير څخه دالفا وړانگې انرژي په لاندې ډول ترلاسه کولای شو.

* **حل:** که ومنو چې په کلود چمبر کې دالفا وړانگو د واټن پله لاره څلور سانتي متر اندازه شوې وي او په نوموړي واټن کې د څاڅکو شمير شپيته زره وگڼل شي 60 000 drops نو دالفا وړانگو انرژي (E_{α}) مساوي ده له:

$$E_{\alpha} = 4 \text{ cm} \times \frac{60000}{\text{cm}} \times 15,8 \text{ eV} = 3,79 \text{ MeV}$$

* **ځواب:** دالفا يوې ذرې انرژي لږ څه څلورميکا الکترون ولټ قيمت لري


په فزيک کې وړانگې (Radiation) هغې کرنلارې ته ويل کيږي چې ديوې سرچينې څخه انرژي د څپو او يا بڅرکو په بڼه خپريږي. دا په دې مانا چې وړانگې دانرژي يوځانگړی شکل تشکيلوي اودانرژي په تړاو په دوه ډوله ويشل شوې دي. لومړۍ ايونايښکونکې وړانگې او دويم نه ايونايښکونکې وړانگې.

وړانگې (Radiation)

وړانگې د انرژي يوه بڼه ده چې په فضا کې د څپو او يا ذرو په ډول خپريږي. الکترومقناطيسي وړانگې لکه رڼا، راډيوڅپې، مايکروڅپې، ایکس وړانگې، گاما وړانگې، قرمز لاندې وړانگې، ماورای بنفش وړانگې. نوموړې وړانگې دنور په سرعت سره خپريږي.

دپارتيکل يا بڅرکو وړانگې لکه الفا ذره، بيتا ذره، نيوترون، پروتون، نيوترون او درانده ايونونه دي.

وړانگې، اکسريز او يا هستوي ذرې (Particles) لکه گرندي الکترونه، پروتونه، الفا ذره اونور. څرنگه چې د نوموړو وړانگو انرژي لوړه ده نو کله چې ديوې مادې څخه تيريږي نو په دې ترڅ کې ددغې مادې داتومونو سره غبرگون کوي اواتومونه اويا مالېکولونه ايونايښکوي. په پايله کې مثبت اومنفي بريښنايز چارج شوي ايونونه منځ ته راځي.



☢ **نه ایونایزکونکي وړانگې:** څرنګه چې دنوموړو وړانګو انرژي دومره پوره لوړه نه ده چې د یوې مادې اتومونوڅخه الکترونه راوباسي او دایونایزیشن سبب(لامل) وګرزي نو له دې کبله ورته نه ایونایزکونکي وړانګې ویل کیږي. د بېلګه په ډول لکه: رادیو څپې، مایکروڅپې، د تودوڅي وړانګې، دنور وړانګې او ماورای بېنفش وړانګې اوداسې نور.

څر ڼګه چې د یوې مادې داتومونوسره دورانګوغبرګون دهغوي په رادیو فزیکي خواصولکه انځري، بریښنايز چارج، کتله اوداسې نورو پورې اړه لري نو له دې کبله وړانګې په دوه ډوله ویشل کیږي.

لومړۍ: د فوتون وړانګې (Photon radiation)

الکترو مقناطیسي وړانګې دوه ډوله خواص لري چې کله د یوې څپې بڼه اوکله د یوه بڅرکي یانې ذرې بڼه ځانته غوره کوي. د فوتون وړانګې الکترومقناطیسي څپې دي چې دداسو وړو ذرو څخه جوړې دي چې نه بریښنايز چارج لري او نه د سکون کتله لري. د بېلګه په ډول لکه ډاکسریز، ګاما وړانګې، کیهاني وړانګې، ماورای بنفش وړانګې، درنا یانور وړانګې، دتودوڅي وړانګې او درادیو او تلویزیون وړانګې.

دویم: د بڅرکو وړانګې (Particles radiation)

نوموړې وړانګې د کوچنیو ذرو څخه جوړې دي چې د سکون کتله لري خو ځینې یې بریښنايز چارج هم لري. د بېلګه په ډول لکه الکترونه، پروتونه، دویترونونه، الفا ذرې، درانده ایونونه او پيونونه (Pions). دذروهغه وړانګې چې بریښنايز چارج نه لري یانې خنثی دي دنیوترونو او پي میزونو (π - Mesones) په نامه سره یادېږي.



دذرو وړانګې او دفوتون وړانګې د یوې مادې سره دهغوی د غبرګون په تړاو لکه ایونایزیشن یو ځل بیا په دوه برخو یانې سم سیخ او نه سم سیخ ایونایز کونکې وړانګې ویشل کیږي چې په ۱۴ جدول کې بنودل شوي دي.

سم سیخ ایونایز کونکې وړانګې

دهغو وړانګو څخه عبارت دی چې هغوي خپله انرژي دتګ لارې په اوږدو کې سم سیخ د یوې مادې اتومونو ته انتقال کوي. نوموړې وړانګې کولای شي چې د یوې مادې داتوم څخه الکترونه راوباسي او هغه په ایون واړوي (ایونایزیشن). د بېلګه په ډول لکه الکترونه، پروتونه، دویترونونه، الفا وړانګې، درانده ایونونه او پيونونه

نه سم سیخ ایونایز کونکې وړانګې

نوموړې وړانګې پخپله بریښنايز چارج نه لري یانې خنثی ذرې دي خو کله چې د مادې سره ولګیږي او بیا دیوه اتوم څخه جذب شي نو په لومړي پړاو کې یوه چارج شوې ذره منځ ته راځي چې دغه ذره بیا په خپل وارسره کولای شي چې خپله انرژي دمدادې اتومونوته انتقال او دایونایزکولو کړنلاره تر سره کړي. نه سم سیخ ایونایز کونکې وړانګې لکه خنثی ذرې یانې (نیوترون، فوتون، پي میزون)





۱۶- شکل: په پورتنۍ گراف کې د سم سيخ ايوناي زکونکو او نه سم سيخ ايوناي زکونکو وړانگو ویشټوب ښودل شوی ده. (28)

الکترو مقناطیسي وړانگې (Electromagnetic radiation)

الکترو مقناطیسي وړانگې داسې څپې دي چې په خپل سر په فضا کې د نور په سرعت سره خپرېږي. نوموړې وړانگې د یوه بریښنا یزڅپې E او یو مقناطیسي څپې H څخه جوړې دي چې د دواړو څپو د فاز زاویه (Phase angle) سره یوشان ده. د نوموړو څپو بریښنايزه ساحې شدت (E) او مقناطیسي ساحې شدت (H) یو پر بل باندې عمود ولاړ دي او تر یوې قایمې زاوېې لاندې اهتزاز کوي.

په ۱۷ شکل کې د الکترو مقناطیسي څپو د خپریدلو سمت Z ، بریښنايز ساحه E ، مقناطیسي ساحه H او د څپو اوږدوالي λ ښودل شوي دي. د الکترو مقناطیسي وړانگو طیف یوه غوره برخه د گاما وړانگې تشکیلوي. که څه هم نوموړې وړانگې دالفا او الکترون په شان د بڅرکو یانې ذرو څخه جوړې نه دي خو بیا هم فزیکي تجربو وښودله چې د ذرو په ځیر خواص ښيي. دبیلگې په ډول کله چې گاما وړانگې یوې مادې سره غبرگون وکړي نو د هغوی یوه ټاکلې کچه او اندازه انرژي د مادي اتومونو څخه جذب کیږي. د گاما وړانگو نوموړي خواص څخه داسې پریکړه کولای شو چې گاما وړانگې د یو ډول انرژي پاکټونو (Energy packets)، انرژي واحدونو او یا په بل عبارت د انرژي غونډوارو څخه جوړې دي چې د گاما کوانت او یا فوتون $\text{Gamma quant} = \text{photon}$ په نامه سره یادېږي.



۱۷- شکل: د الکترومقناطیسي څپو د حرکت سمت د Z په افقي محور سره بنودل شوی دی چې د څپو اوږدوالی یې لمبدا λ او بریښنا یز ساحه یې E او مقناطیسي ساحه یې H یو پر بل باندې عمود ولاړ دي. (25)

د الکترومقناطیسي وړانگو طیف دلاندو څپو څخه جوړ دی:

➤ اوږدې څپې، منځنۍ څپې، لنډې څپې، دلنډې څپو نه هغه خواته لکه دراديو او تلويزيون څپې، دتودوخي وړانگې، دنور وړانگې، دبنفش نه هغه خواته وړانگې، داکسريز يا رونتگن وړانگې او دگاما وړانگې يا لوړانرژي اکسريز (X-Ray) ، کیهاني وړانگې

الکترومقناطیسي وړانگې په فضا کې د نور په سرعت خپریږي چې درې سوه زره کیلومتر ه په یوه ثانیه کې قیمت لري (300 000 km/s). هغه الکترومقناطیسي وړانگې چې په سترگو لیدل کیدای شي د څپو برخه یې د څلورسوه نانو (400 nm) مترڅخه تر اووه سوه نانو متره (700 nm) پورې رسیږي. دنوموړو څپو سرعت (C) د څپو اهتزاز (v) او د څپو اوږدوالي (λ) د حاصل ضرب سره مساوي دی. دنوموړو فزیکي کمیتونو تر منځ لاندنۍ اړیکې شته دي.

دالکترومقناطیسي وړانگو سرعت = دڅپو اوږدوالی ضرب دڅپو اهتزاز

$$c = \lambda \times v$$

اهتزاز = دنور سرعت تقسیم د څپو په اوږدوالی


$$v = c / \lambda$$

دڅپو اوږدوالی = دنور سرعت تقسیم په اهتزاز

$$\lambda = c / v$$

دنور سرعت دطبیعت یوه ثابته ده او قیمت یې لږڅه درې سوه زره کیلومتره په ثانیه کې دی.

$$c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$$



* **پوښتنه:** د نور شين رنگه څپې اوږدوالی په هوا کې پينځه سوه نانومتر (500 nm) قيمت لري. دنوموړې څپې فريکونس يا اهتزاز معلوم کړی؟

* **حل:** اهتزاز = دنور سرعت تقسيم د څپو په اوږدوالی

$$\nu = \frac{3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}}{500 \text{ nm}} = \frac{3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}}{500 \times 10^{-9} \text{ m}} = 6 \times 10^{14} \text{ s}^{-1} = 6 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

* **ځواب:** شپږ سوه بېليون هرخ

د فوتون يا په بل عبارت د يوه کوانت انرژي E کولای شو چې په لاندې ډول تر لاسه کړو.

د فوتون انرژي = د فوتون اهتزاز ضرب د پلانک ثابت

$$E = \nu \times h$$

د پلانک ثابت مساوي ده له: $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Joule} \cdot \text{Sec}$

* **پوښتنه:** د يوه فوتون انرژي محاسبه کړی کوم چې د يوې اکسريز (X-Ray) آلي څخه خپريږي او د څپو اوږدوالی يې لس پیکو متر ($10 \text{ pm} = 10 \times 10^{-12} \text{ m}$) قيمت لري.


* **حل:** د فوتون انرژي مساوي ده له: $E = \nu \times h$





$$E = h \frac{c}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ Js} \times 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}}{10 \times 10^{-12} \text{ m}} = 1,989 \times 10^{-14} \text{ J}$$

* **ځواب:** د فوتون انرژي لږ څه $2 \times 10^{-14} \text{ J}$ قيمت لري.

که چېرته د فوتون انرژي E په واحد کيلو الکترون ولټ او يا الکترون ولټ او د څپو اوږدوالی λ په خپل وار سره په واحد پیکو متر يانې $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$ او يا نانو متر سره وښیو نو دهغوی تر منځ لاندنی اړیکې لاس ته راځي چې د شمیرني د اسانتیا په اړوند مهم رول لوبوي

$$E = \frac{1240 \text{ keV} \times 10^{-12} \text{ m}}{\lambda} = \frac{1240 \text{ eV} \times \text{nm}}{\lambda}$$



دورانگو ډول	فريکونس (يوپه ثانيه)	دڅپو اوږدوالی	انرژي په واحد د الکترون ولټ اوژول		
Strahlenart	Frequenz in s ⁻¹	Wellenlänge in m	Energie in eV in J		
 Niederfrequenz	3 · 10 ⁰	10 ⁸	1,24 · 10 ⁻¹⁴	1,99 · 10 ⁻³³	دټيټ فريکونس برخه
	3 · 10 ¹	10 ⁷	1,24 · 10 ⁻¹³	1,99 · 10 ⁻³²	
	3 · 10 ²	10 ⁶	1,24 · 10 ⁻¹²	1,99 · 10 ⁻³¹	
	3 · 10 ³	10 ⁵	1,24 · 10 ⁻¹¹	1,99 · 10 ⁻³⁰	
 Hochfrequenz UKW KW MW LW	3 · 10 ⁴	10 ⁴	1,24 · 10 ⁻¹⁰	1,99 · 10 ⁻²⁹	د لوړ فريکونېس برخه
	3 · 10 ⁵	10 ³	1,24 · 10 ⁻⁹	1,99 · 10 ⁻²⁸	
	3 · 10 ⁶	10 ²	1,24 · 10 ⁻⁸	1,99 · 10 ⁻²⁷	
	3 · 10 ⁷	10	1,24 · 10 ⁻⁷	1,99 · 10 ⁻²⁶	
 Radar	3 · 10 ⁸	1	1,24 · 10 ⁻⁶	1,99 · 10 ⁻²⁵	رادار
	3 · 10 ⁹	10 ⁻¹	1,24 · 10 ⁻⁵	1,99 · 10 ⁻²⁴	
 Hochstfrequenz	3 · 10 ¹⁰	10 ⁻²	1,24 · 10 ⁻⁴	1,99 · 10 ⁻²³	د رڼا برخه
	3 · 10 ¹¹	10 ⁻³	1,24 · 10 ⁻³	1,99 · 10 ⁻²²	
	3 · 10 ¹²	10 ⁻⁴	1,24 · 10 ⁻²	1,99 · 10 ⁻²¹	
	3 · 10 ¹³	10 ⁻⁵	1,24 · 10 ⁻¹	1,99 · 10 ⁻²⁰	
 Licht IR UV	3 · 10 ¹⁴	10 ⁻⁶	1,24 · 10 ⁰	1,99 · 10 ⁻¹⁹	اکسريز يا رونتگن وړانگي
	3 · 10 ¹⁵	10 ⁻⁷	1,24 · 10 ¹	1,99 · 10 ⁻¹⁸	
 Röntgenstrahlen γ-Strahlen	3 · 10 ¹⁶	10 ⁻⁸	1,24 · 10 ²	1,99 · 10 ⁻¹⁷	د گاما او کيهاني وړانگي
	3 · 10 ¹⁷	10 ⁻⁹	1,24 · 10 ³	1,99 · 10 ⁻¹⁶	
	3 · 10 ¹⁸	10 ⁻¹⁰	1,24 · 10 ⁴	1,99 · 10 ⁻¹⁵	
	3 · 10 ¹⁹	10 ⁻¹¹	1,24 · 10 ⁵	1,99 · 10 ⁻¹⁴	
 energiereiche Strahlung Quanten der Höhenstrahlung	3 · 10 ²⁰	10 ⁻¹²	1,24 · 10 ⁶	1,99 · 10 ⁻¹³	
	3 · 10 ²¹	10 ⁻¹³	1,24 · 10 ⁷	1,99 · 10 ⁻¹²	
	3 · 10 ²²	10 ⁻¹⁴	1,24 · 10 ⁸	1,99 · 10 ⁻¹¹	
	3 · 10 ²³	10 ⁻¹⁵	1,24 · 10 ⁹	1,99 · 10 ⁻¹⁰	
	3 · 10 ²⁴	10 ⁻¹⁶	1,24 · 10 ¹⁰	1,99 · 10 ⁻⁹	

Quelle:




Informationskreis
KernEnergie

Quelle: Informationskreis KernEnergie


۱۸- شکل: دالکترو مقناطیسي وړانگو دانرژي، څپو او فريکونسي تر منځ اړوونکي اړيکي ښودل شوي دي. (31) ديو مېکا الکترون ولټ ($E = 1 \text{ MeV}$) گاما وړانگي څپو اوږدوالی په لاندي ډول تر لاسه کوو.

$\lambda = 1234 \text{ eV-nm} / E$	$\lambda = 1234 \text{ eV-nm} / 1 \text{ MeV}$
$= 1234 \text{ eV-nm} / 1 \times 10^6 \text{ eV}$	$= 1.23 \times 10^{-15} \text{ m}$
$= 1.23 \times 10^{-6} \text{ nm}$	$= 1.23 \text{ fermi}$




هستوي وړانګې (Nuclear radiation)

هستوي وړانګې هغو وړانګوته ویل کیږي چې د اټوم یوې هستې څخه خپریږي. نوموړې وړانګې د یوه مصنوعي هستوي تعامل د چاودنې په کړنلاره کې منځ ته راځي او یا داچې د طبیعي رادیو اکتیو هستود تجزیې په پایله کې تر لاسه کیږي. نوموړې وړانګې په یوناني تورو لکه الفا α ، بیتا β او ګاما γ سره شول کیږي. په ۱۹- شکل کې دځینو رادیو نوکلیدو لکه کوبالټ Co-60 سیزیم Cs-137 ، فوسفور P-32 او ایوډین I-131 دتجزیې انرژي ترم (Energy therm) او یا په بله مانا انرژي شپېکترم (Energy spectrum) ښودل شوی دی چې هستوي وړانګې خپروي.




۱۹- شکل: په درمل پوهنه کې دځینو مهمو رادیواکتیو ایزوټوپولکه سیزیم (Cs-137) کوبالټ (Co-60) فوسفور (P-32) او ایوډین (I-131) د هستو تجزیې شپېکترم (Decay Shema) ښودل شوی دی. څرنگه چې نوموړې هستې د تحریک (Excitation) په حالت کې شتون (قرار) لري نو د بیتا او ګاما انرژي په خپرولو سره خپله دارتیا نه ډیره (اضا فګي) انرژي په هغه وخت کې دلاسه ورکوي کله چې د هیجاني حالت (Excited state) څخه دانرژي په پرتله ترټولو یوه ټیټ لېول یا بنسټیز حالت ته (Ground state) ته راولوېږي. په دغه تجزیه کې نوموړي عنصرونه په خپل وار سره په نورو ثابتو عنصرونولکه باریم Ba-137 ، نیکل Ni-60 ، سلفر S-32 اونجیبه غاز کسېنون Xe-131 باندې اوړي (15).



دبېلگه په ډول د فوسفور (phosphorus = P-32) عنصر يوداسي راديو اکتیو عنصر دی چې سوچه ياني سل په سل کې د بېتا β وړانگې خپروي او په پايله کې په سلفر S-32 ثابت عنصر باندې تجزيه کيږي ياني نور وړانگې نه خپروي. د فوسفور د نيمايي عمر وخت (Half life) لږ څه څوارلس ورځې (14,3d) او د بېتا وړانگو لوړه (اعظمي) انرژي يې لږ څه يوعشاريه اوه مېگا الکترون ولټه (1,71 MeV) قېمت لري. نوموړې حرکي انرژي د فوسفور د هرې يوې هستې د تجزيې په پايله کې منځ ته راځي چې د بېتا وړانگې او د يوې بلې هستوي ذرې ياني انټي نيوترينو ($\bar{\nu}$) تر منځ ويشل کيږي. نن ورځ د فوسفور راديو اکتیو ايزوټوپ دناروغيو په درملنه او پيژندنه کې په خورا پراخه توگه گټور استعمال پيداکړی دی.



الفا وړانگې (Alpha rays)

دالفا وړانگې (α -rays) داسې هستوي وړانگې دي چې د يوې راديو اکتیو هستې د تجزيې په پايله کې منځ ته راځي. نوموړې وړانگې د دوه نيوترونو او دوه پروتونو څخه جوړې دي اوله دې کبله د هيليم اټوم هستې سره يو شان دي ($\text{He}^4 = \alpha$). دالفا وړانگې د هستې څخه په ډير لوړ سرعت خپريږي چې قيمت يې لږ څه پنځلس زره کيلومتره په ثانيه کې دی (15000 km/s) ياني دنور سرعت شلمه برخه جوړوي. څرنگه چې دالفا وړانگې د هيليم هستې څخه جوړې دي نو دالفا وړانگو په ځای د الفا ذرې په نوم هم يادېږي. دالفا وړانگو **دخپريدلو واک** (Range) په نسجونو کې يوازې څو مايکرو متر ته رسېږي. په ۲۰- شکل کې د الفا وړانگو د دخپريدلو واک اود توليد شوو ايونونو شمير په نسجونو کې بنودل شوی دی. هغه راديو ايزوټوپونه چې دالفا وړانگې خپروي لکه: پولونيم Po-210، يورانيم U-238، رادون Radon-222، امريسيم Amrecium- 241 اونور.



۲۰ - شکل: په نسجونو کې دالفا يوې ذرې د **دخپريدلو واک** (Range) دانرژي سره سم تر څلويښتو مايکرو مترو پورې رسېږي او د لارې په اوږدو کې مثبت او منفي چارجونه (Ion pairs) منځ ته راځي. **يادونه:** مايکرو متر μm = Micrometer دیو متر يو په مليونه برخه ده چې په لاندې ډول هم ليکل کيږي $\mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$

دالفا وړانگو **دخپريدلو واک** (Range) په هوا کې د يوسانتي متر څخه تر لږ څه شپږو سانتي مترو پورې رسېږي. په ۲۰- الف شکل کې د الفا وړانگو د دخپريدلو واک اود توليد شوو ايونونو شمير په هوا کې بنودل شوی دی.




۲۰- الف شکل: په هواکې د الفا وړانگو دخپریدلو واټن (Range) په افقي محور او د تولید شوو ایونونو شمیر په واحد دسانتي متر په عمودي محور کې ښودل شوی دی (31).


نوموړی گراف راښيي چې دالفا وړانگو دخپریدلو واټن د انرژي سره سم تر او لري او تر اوو سانتي متره پورې (7cm) رسېږي او په شپږ سانتي متره واټن کې د ایونایزیشن کړنلاره یو اعظمي قیمت ځانته اخلي. په نوموړي واټن کې د تولید شوو ایونونو شمیر په واحد دسانتي متر لږ څه اوو زرو (7000 ion pairs/cm) ته رسېږي. دېلي خوا دغه گراف په ډاگه کوي چې د ایونایزیشن پروسه د واټن په اوږدو کې یو خطیزي بڼه نه لري بلکه د پیل په برخه کې خطیزي او بیا وروسته د لږ څه اکسپونینسیال تابع په شکل پورته ځي. دگراف دغه ډول کړنلاره د فزیک پوهنې له مخې داسې تعبیر کولای شو چې ګڼه په پیل کې دالفا وړانگو سرعت ډېروي او د مادي داتومونو سره د لږ وخت درلودلو له کبله دومره فزیکي غبرګون نه شي کولای. خو د خپریدلو واټن په اخیره برخه کې چې هلته یې د حرکي انرژي زیاته برخه بایللي ده او سرعت یې را ټیټ شوی دی نو د الفا وړانګې په کافي اندازه وخت لري چې د مادي داتومونو سره ډیر غبرګون وکړي. دالفا وړانګې داسې خواص لري چې د یوې پانې کاغذ او یا د بدن د پوستکي څخه نه شي تیریدلای.

دپام وړ: دالفا وړانګو سرچینو څخه په تکنالوژي او صنعت کې هم ګټه پورته کیږي. دبیلګې په ډول دلوګي اندازه کولو په آلې (Smoke warning device) کې دامریسیم Amrecium- 241 څخه کار اخیستل کیږي. کله چې لوګی نوموړې آلې ته ورننځي نو دامریسیم رادیو ایزوټوپ الفا وړانګې په لوګي ککړه هوا چې ثابت جریان ښيي دپخوا په پرتله لږ ایونایزکوي او په پایله کې دبرېښنا جریان کچه کمېږي. نو کله چې په یوه پیښه کې اوربل شي او بیا نوموړې آلې ته لوګی ورسېږي نو دبرېښنا دده ایت قابلیت کمښت مومي او دخطر زیګنال لا مل ګرځي.

په فزیک کې هغه هستې چې د الفا وړانګې خپروي د الفا تجزيې (α - decay) په نامه سره یادیږي. دالفا په تجزیه کې دتروني Binding energy انرژي دنوروسپکونوکلیدوپه پرتله ډیر لږ قیمت لري او لږ څه اته ویښت میګا الکترون ولټ 28 MeV څخه اوږي. دا په دې مانا چې که وغواړود هستې څخه دالفا یونډره راوباسو نو د یوه نوکلیدون لپاره اووه میګا الکترون ولټ انرژي ($28 \text{ MeV}/4 = 7 \text{ MeV}$) په کار ده. او س به دځینو نامتواتومونو یادونه وکړو چې دالفا وړانګې خپروي لکه پلوتونیم، رادیم او یورانیم او دهغوی په هستوي تعاملونو باندې به رڼا واچوو.



➤ **دالفا تجزیه (α -decay):** که په X سره دیوه رادیو اکتیو اتوم هسته او په A داتوم کتلي نمبر او په Z داتوم نمبرونیسو نودالفا تجزیې عمومي کرنلاره په لاندې ډول سره لیکلای شو:



په دغه هستوي تجزیه کې ${}^A_Z X$ دوالدین یانې دموراو پلار (Parents) هسته ، ${}^{A-4}_{Z-2} Y$ د لور هسته (Daughter nuclid) او ${}^4_2 \text{He}(\alpha)$ دالفا ذرې په نامه سره یادېږي.

د بېلگه په ډول په لاندې تجزیه کې پلوتونیم دوه سوه اته دیرش Pu^{238} هسته د الفا یوه ذره $\alpha(\text{He})$ خپروي او دکتلي نمبر ($A-4$) یې دڅلورو په واحد او داتوم نمبر یې ددو په واحد ($Z-2$) را ښکته کیږي. هغه هسته چې منځ ته راځي دنوموړي عنصر د **لور هستې** په نامه سره یادېږي او عبارت د یورانیم دوه سوه څلور دیرش څخه دی.





په پورتنۍ معادله کې د قوس مانا داده چې ګڼه د الفا ذرې په ځای د هیلیم اتوم هسته هم لیکلای شو. یو بل مهم عنصر چې الفا وړانګې ورڅخه خپرېږي دپلوتونیم (Pu-240) رادیو اکتیو عنصر دی چې په ۲۱- شکل کې ښودل شوی دی. نوموړی عنصر 94 پروتونه او 146 نیوترونه لري. دهغه دهستې چارج نمبر 94 او دکتلي نمبر یې چې دپروتونو او نیوترونو د مجموعې څخه عبارت دی او له 240 سره مساوي دی. دپلوتونیم رادیواکتیو اتوم هسته ثابت حالت نه لري داځکه چې دنیوترونو شمیر یې دپروتونو په پرتله ډیر لوړ دی. دا په دې مانا چې هستوي قواوې (Nuclear forces) نه شي کولای چې د پروتونو تر منځ د دفاع کونکې قوې (Coulomb force) مخه ونیسي او هغوي ټول سره یوځای کلاک وساتي.





دپام وړ: دالفا تجزیه هغه وخت ډیر احتمال لري چې په هسته کې دپروتونو او نیوترونو تناسب کچه لکه په درنوهستو کې ډیره لوړه وي. خو کله چې دالفا ذره دهستې څخه دباندې وشړل شي نو نوموړی تناسب کمېږي او هسته دپخوا په پرتله یو ثابت نوي حالت ته راځي. دبیلګې په ډول پولونیم P^{210} په هسته کې څلور اتیا پروتونه او یوسلو شپږ ویشټ نیوترونه لري چې تناسب یې $Z/N = 84/126 = 0,667$ سره مساوي دی. په نوموړې تجزیه کې دسرپ Pb^{206} هسته منځ ته راځي چې د پروتونو او نیوترونو تناسب یې د پخوا په پرتله لږ دی یانې $Z/N = 82/124 = 0,661$ د نوکلینو همدغه دومره کوچنی توپیر بس دی چې دسرپ هسته یو ثابت یانې نه رادیو اکتیو حالت ځانته غوره کړي.

همدا سبب (لامل) دی چې دالفا په تجزیه کې داتوم هسته هڅه کوي چې اضافي انرژي دورانګو په څیر دلاسه ورکړي تر څو پخپله وکولای شي یو ثابت بنسټیز حالت ځانته غوره کړي. د بېلگه په ډول د پلوتونیم (Pu-240) اتوم د خپلې هستې څخه د الفا یوه ذره دباندې شري چې په پایله کې د نوموړي هستې د چارج نمبر د دوو په کچه او دکتلي نمبر یې د څلورو په کچه ښکته رالویږي. په دغه ډول هستوي تجزیه کې د یورانیم یو بیخي نوی ایزوټوپ (U-236) لا س ته راځي. نوموړې فزیکي کرنلاره دیوې هستوي تعامل معادلې په څیر هم لیکلای شو.




۲۱- شکل: دپلوتونیم رادیواکتیو هسته دالفا یوه ذره خپروي او پخپله یې دیورانیم دوه سوه شپږدیرش U-236 عنصر په هسته بدلیږي(31).

په ۲۲- شکل کې د یوه بل ډیر مهم رادیواکتیو عنصریاني رادیوم Ra-226 د هستې انرژي لیول ښه ښودل شوي ده. د نوموړي عنصر نیمایي عمر یو زرو شپږ سوه شل کاله 1620 y دی او دوه الفا وړانګې اویوه گاما وړانګه خپروي. د رادیوم هستې د تجزیې معا دله په لاندې ډول ده.



۲۲- شکل: د رادیوم رادیواکتیو هستې د انرژي لیول Energy Levels او تجزیې شیمې (Decay scheme) (15)

د رادیوم Ra-226 رادیواکتیو عنصر څلورنوي عشریه پینځه په سل (94,5%) کې درادون عنصر Rn-222 اساسي لیول او پینځه نیم په سل (5,5%) کې درادون عنصریوي هیجاني لیول (Exited) ته تجزیه کیږي. په دې ترڅ کې دهستې څخه دالفا دوه وړانګې خپریږي چې لومړۍ وړانګه یې لږ څه څلور عشریه اته مېگا الکترون ولټه 4,78 MeV اودوهمه وړانګه یې څلور عشریه شپږ مېگا الکترون ولټه 4,6 MeV حرکي انرژي لري. د عمر نیمایي وخت یې یو زرو شپږ سوه شل کاله (1620y) کاله



دی. کله چې د هیجاني حالت څخه د هستې اساسي یانې بنسټیز لېول ته را لویږي نو اضافي انرژي یانې صفر عشریه اته مېگا الکترون ولټه (0,18 MeV) دکاما وړاګي په ډول ورڅخه خپریږي.


طبیعي یورانیم ^{238}U چې نن ورځ د هستوي وسلو برسیره دعادي وسلو په جوړولو کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي رادیواکتیو خاصیت لري اود الفا ، بېتا او گاما وړانګې ورڅخه خپریږي . په لاندې هستوي تجزیه کې طبیعي یورانیم په خپل سر په یوه نوي عنصر توریم ^{234}Th اوږي او په دې ترڅ کې دهستې څخه دالفا وړانګې یانې دهېلیم اتوم یوه هسته خپریږي.



په نوموړې تجزیه کې اوه اويا په سل کې 77 % د الفا یوه وړانګه خپریږي او پخپله یورانیم سم سیخ د توریم په بنسټیز لېول باندې اوږي . د نوموړې الفا زري حرکي انرژي د لږ څه څلور مېگا الکترون ولټه (4 MeV) څخه هم اوږي. خو دیورانیم هستې څخه په سل کې درویش 23% دالفا یوه بله وړانګه هم جوفت خپریږي او دلته یورانیم په لومړي پړاو کې دتوریم په یوه داسې هسته اوږي چې په یوه هیجاني لېول کې پریوځي (قرارلري) او بیا وروسته په دوهم پړاو کې دیوې گاما وړانګې په خپرولو سره چې انرژي یې پنځوس کیلو الکترون ولټه ده خپل بنسټیز یانې اساسي لېول ته را لویږي.


لنډیز:

- دالفا یو بڅرکی ددو پروتونو اودوونیوترونو څخه جوړدی او د هلیم هسته جوړوي.
- دالفا ذره یا بڅرکی دوه غبرګ مثبت بریښنايز چارج لري (Double positive charges).
- دالفا یوه بڅرکي سرعت د پېنځه لسو نه تر دیرشو زرو کیلومتره په یوه ثانيه او یا د نور سرعت یو په لسمه برخه پورې رسیږي.
- دالفا ذره په یو سانتي متر هوا کې دشیرو زرونه تر لسوزروپورې ایونونه تولیدوي
- دالفا وړانګې دکاغذیو پانې څخه هم نه شي تیریدلای اوله دې کبله دبهرنۍ سرچینې څخه که خپري شي نو د روغتیا په تړاوداند پېښي ورنه دي.
- که دخوراک، تماس اویاد تنفس له لارې بدن ته ننوځي نوخطر یې دروغتیا په تړاو بیخي زیات دی
- دالفا ذره په یوه هستوي چاودنه کې منځ ته راځي او کتله یې مساوي ده له:
- $m_\alpha = 6,644 \times 10^{-27} \text{ kg}$



- د پلوتونیم هستې په چاودنه کې د الفا یوه ذره یانې د هلیم He هسته ازاده کیږي..








بېتا وړانګې (Beta - rays)

په طبیعت کې ځینې رادیواکتیو عنصرونه شته دي چې داتوم هستې څخه بېتا وړانګې (β -rays) خپروي. نوموړې هستوي وړانګې ګرندې الکترونه دي چې سرعت یې دصفر نه تر نږدې نور سرعت پورې رسېږي او په هوا کې دهغوی د خپریدلو واټن تر لسو مترو پورې رسېږي. کله چې په یوه هسته کې د نیوترونو شمیر دپروتونوپه پرتله زیات وي نو د منفي بېتا تجزیه تر سره کیږي.


بېتا منفي تجزیه (β^- decay): په دغه هستوي تجزیه کې دبېتا وړانګې هغه وخت منځ ته راځي کله چې دهستې یونیوترون n^0 په پروتون p^+ ، یو الکترون e^- (بېتا وړانګه) او یوه بله ذره چې د ضد نیوترینو ($\bar{\nu}$) په نامه سره یادېږي واوړي. دغه ډول تجزي ته بېتا منفي تجزیه ویل کیږي چې عمومي معادله یې په لاندې ډول سره ده.



د بیلګې په ډول دکوبالټ شپيته Co^{60} هسته د بېتا منفي تجزیه تشکیلوي اوپه پایله کې د لوریوه هسته یانې نیکل Ni اودالکترون وړانګې اود نیوترینو یوه ضد ذره منځ ته راځي.





په ۲۴- شکل کې درادیم ($Ra-228$) رادیو اکتیو هستې تجزیه بنودل شوې چې په پایله کې یوه بېتا منفي ذره (β^-) یا نې یوالکترون، داکتینیم عنصر ($Ac-228$) یوه نوې هسته اود نیوترینو ($\bar{\nu}$) یوه ذره منځ ته راځي. د یادولور خبره داده چې په هره یوه هستوي تجزیه کې دچارجونواو دانرژي د ساتلوقانون اعتبارلري. د بېتا هستوي تجزي په معادله کې **د ضد نیوترینو ذره (بخرکی)** خپرېږي تر څودیوي خوا دانرژي د ساتلو قانون او د بلې خوا دلبیتونو شمیر (Leptons) دساتلوقانون پر ځای شي. دبېتا منفي تجزي معادله په لاندې ډول سره لیکلای شو.



رادیم ⇌ اکتینیم + انتي نیوترینو + بېتا ذره

په بېتا تجزیه کې دهستې مثبت چارج د پخوا په پرتله د یوه واحد په کچه ډیرېږي ($Z+1$) او یا کمیږي ($Z-1$) خو د کتلې شمیره یې په خپل حال پاتې کیږي .




۲۴- شکل: د منفي بېتا ذری تجزیه : کله چې درادیم (Ra-228) اتوم هسته تجزیه شي نو د بېتا یوه ذره او په څنګ کې ورسره د ضد نیوترینو یوه ذره خپریږي او پخپله یې د اکتینیم (Actinium) په یوه نوې هسته بدلیږي (31).

په دغه هستوي تجزیه کې د پروتونو شمیر $Z = 88$ د یوه واحد په کچه لوړیږي $Z = 89$ خو د نوکلینو شمیر یانې په هسته کې د پروتونو او نیوترونو مجموعه یا نې دکتلي شمیره یې $A = 228$ په خپل حال پاتې کیږي


بېتا مثبت تجزیه (β^+ decay) : ځینې عنصرونه هم شته دي چې دهغوی په هسته کې د نیوترونو شمیر د پروتونو په پرتله لږدی. په دغه ډول هستوکې یو پروتون په یونیوترون، یو پوزیتون (Positron) او یو نیوترینو ($\text{Neutrino} = \nu_e$) بدلیږي.

➤ پوزیترون د الکترون یوه ضد ذره ده داځکه چې د منفي چارج پر ځای مثبت بریښنايز چارج لري خو کتله یې د الکترون سره برابر قیمت لري. نوموړې ذره د بېتا مثبت وړانګې یا (β^+) په نامه سره هم یادېږي.



د بېتا مثبت تجزي عمومي معادله په لاندې ډول لیکلای شو:




➤ د بېتا مثبت په هستوي تجزیه کې یو پروتون په یونیوترون ، یو پوزیترون ($\text{Positron} = e^+$) او یو نیوترینو ν_e اوړي.



د بېلګه په ډول کله چې د رادیواکتیو نایتروجن هسته تجزیه شي نو په پایله کې د کاربون یوه هسته او یو پوزیترون (β^+) او یونیوترینو لاس ته راځي.



۲۵- شکل: دېټا مثبت (β^+) په تجزيه کې د سوډيم هستې يو پروتون په نيوترون بدليږي او يو پوزيټرون (Positron) د هستې څخه راوړي چې مثبت چارج لري او کتله يې د الکترون کتله سره يو برابر ده. (31).



رادیو اکتیونایتروجن ← کاربون ایزوټوپ + پوزيټرون + نیوترینو



د پام وړ: په بېټا تجزيه کې دهستې څخه يو الکترون (β^-) او يا پوزيټرون (β^+) خپريږي او په لومړي حالت کې (β^-) د پيدا شوي هستې د اتومي نمبرد يوه واحد په اندازه پورته ځي او په دوهم حالت کې β^+ د يوه واحد په اندازه ښکته راځي خو د کتلې نمبر په خپل حال پاتې کيږي.

گاما تجزيه (Gamma decay) :

کله چې يوه هسته دالفا او يا بېټا وړانګې خپرې کړي نو بيا وروسته کله داسې هم پېښيږي چې دتحرېک په حالت کې پاتې شي. ددې لپاره چې دغه هسته دلوړ انرژي حالت څخه يوه ټيټ انرژي حالت ته راولويږي نو دهستې دارونده مدارونودانرژي توپيرد گاماوړانګويانې فوتون وړانګو په څير خپروي. داځکه چې ديوه راديواکټيو اټوم هسته هڅه کوي چې دلوړ انرژي مدارڅخه دانرژي يوه ټيټ مدارته راولويږي او په دې ډول سره خپله اضافګي انرژي ديوه ثابت حالت دغوره کولو په موخه دلاسه ورکړي. په نوموړي تجزيه کې د تجزيه کيدونکې هستې د پروتونواو نيوترونو شمير تغير نه کوي او د کتلې شميره يې ثابت پاتې کيږي. يوازې د والدين هستې کتله د خپور شوي فوتون کتلې معادل انرژي په کچه سره کمښت مومي. په ۲۶- شکل کې ښودل شوي ده چې د پلوتونيم يوه **تحرېک شوي** (را پارولي) هسته دگاما وړانګې خپروي.


گاما وړانګې (Gamma - rays)

گاما وړانګې (γ -rays) دنور (light) په شان الکترومقناطيسي څپي دي خوانرژي يې دنورڅپو په پرتله ډيره لوړه ده چې دفوتون وړانګو او يا فوتون کوانت هم ورته ويل کيږي.




۲۶- شکل: دپلوتونیم یوه رادیو اکتیو تحریک شوی هسته خپله اضافي انرژي دگاما وړانگوپه څیردلاسه ورکوي خو دهستي دپروتونو او نیوترونو شمیر په خپل حال پاتې کیږي (34).

په لاندنۍ معادله کې دباریم رادیو اکتیو هسته په یوه هیجاني حالت کې قرار لري (پریوخي) چې د دغې انرژي لیول دژوند موده لږ څه اوږده ده او له دې کبله د سمبول د پاسه د ام (Metastabile = m) په توري سره ښودل شوی او دگاما وړانگوپه خپرولو سره خپله اضافي انرژي دلاسه ورکوي.




☞ کله چې یو اتوم $^A_Z X$ د تحریک په حالت کې وي نو د پاس په سر یې یوه نښه لکه ستوری * کښل کیږي. دگاما تجزيې عمومي معادله په لاندې ډول لیکلای شو:



دگاما تجزيې یو وتلی بېلگه د کوبالت شپيته رادیو اکتیو Co-60 هسته جوړوي چې دوه گاما وړانگې ورڅخه خپریږي او په اخیر کې دنیکل (Ni-60) په یوه ثابت عنصر اوږي. دغه هستوي تعامل په لاندې ډول سره لیکلای شو.



په نوموړې تجزیه کې لومړۍ کوبا لټ شپيته په تحریک شوي نیکل Ni او بیا وروسته نیکل دگاما دوه وړانگې خپروي چې انرژي په خپل وار سره لږ څه یو عشریه دوه مېگا الکترون ولټه او یو عشریه درئ مېگا الکترون ولټه قیمت لري. دیادولو وړده چې د کوبالت نوموړې وړانگې د سرطان ناروغۍ په درملنه کې یو ډیر اړین او مهم رول لوبوي.



دهستي ترون انرژي (Nuclear binding energy = $B = \Delta m \times c^2$)

په داسې حال کې چې د یوه اټوم په مدارونو کې د الکترونونو او په هسته کې د پروتونونو تر منځ بریښنايي الکترو ستاتيک قوه (Electrostatic force) اغیزمنه ده او الکترونه په هسته باندې یو ځای کلک ساتي خوداټوم په هسته کې نیوترونه او پروتونه د یوې ډیرې زورورې هستوي قوې (Nuclear force) په واسطه د یوه بل سره کلک تړلي دي. که وغواړو چې د اټوم هستې څخه یونیوترون او یا یو پروتون (نوکلېون) دهستوي قوې دجاذبې څخه بیخي ازادکړونوددې اړتیا شته ده چې دنوموړې قوې په مقابل کې کار تر سره شي. دهستي څخه د یونوکلېون د بیلولوپه موخه په منځني ډول سره لږ څه اته میگا الکترون ولټ (8MeV/Nucleon) انرژي په کار ده. په داسې حال کې چې داتوم د k مدار څخه د بیلگي په ډول د یوه الکترون د رایستلولپاره لږ څه سل کیلو الکترون ولټ (100 keV) انرژي په کار ده.

توله هغه انرژي چې دیوه اټوم هستې دتوتوتې کولو او د هغې څخه دیو نوکلېون لکه پروتون او یا نیوترون دبیلولولپاره په کار ده دهستي ترون انرژي په نامه سره یادېږي.

دکټلي تنقیص یا د کټلي نیمگرتیا (Mass defect= ΔM)

نن ورځ ډیرو هستوي څیړنو او دقیقو تجربو په ډاگه کړې ده چې د هر یوه اټوم ځانگړې کټله ددغه اټوم دنوکلېونو د مجموعي کټلي په پرتله کوچنې ده. د بیلگي په ډول د هیلیم هسته ددوه پروتونو او دوه نیوترونو څخه جوړه ده. نوکله چې دنوموړو څلورو ذرو کټله سره جمع کړو او بیا یې دهیلیم اټوم هستې کټلي څخه منفي کړو نو د کټلي توپیر یې د $\Delta M = 0,030376 \text{ u}$ سره برابر کیږي. د کټلي نوموړې توپیر ته د کټلي تنقیص او یا دکټلي کمښت ویل کیږي. کله چې د کټلي دغه کمښت Δm دنور سرعت c د مربع سره ضرب کړو نو نوددغې هستې لپاره د ترون انرژي ($B = \Delta m \times c^2$) قیمت تر لاسه کیږي. په یوه هستوي چاودنه کې د ترون انرژي د تولید شوو هستو او ذرو تر منځ د حرکي انرژي په ډول ویشل کیږي.


پوښتنه: په لاندنۍ هستوي چاودنه کې دیورانیم دوه سوه اته دیرش ایزوتوپ په توریم اویوه الفا ذره تجزیه کیږي. کله چې ددغو دواړو پیداشو ذرو کټلي سره جمع کړو نو د یورانیم کټلي څخه ډیره ده. دالبرت اینشتاین دانرژي او کټلي د معادل اړیکو په پام کې نیولو سره د نیمگړې کټلي انرژي محاسبه کړی؟

حل: دیورانیم کټله مساوي ده له $m = 238,0508 \text{ u}$ او دتوریم کټله مساوي ده له:

$$m_{\text{Th}} = 234,0436 \text{ u} \text{ او د الفا ذرې کټله مساوي ده له } m_{\alpha} = 4,0026 \text{ u}$$

کله چې دالفا اوتوریم ذرو کټلي سره جمع اوبیا یې د یورانیم کټلي څخه منفي کړو نو لروچې:


$$(234,0436 \text{ u} + 4,0026 \text{ u}) - 238,0508 \text{ u} = \Delta m = 0,0046 \text{ u}$$



کله چې دکتلي نوموړی توپیر نور سرعت په مربع سره ضرب کړو او په یاد ولرو چې داتوم کتلي واحد $u = 931 \text{ MeV}/c^2$ سره برابر دی نود انرژي E لپاره لیکلای شوچې:

$$E = (0,0046 \text{ u}) \times (931 \text{ MeV/u}) = 4,3 \text{ MeV}$$


ځواب: په نوموړي هستوي چاودنه کې لږ څه څلور میگالکترون ولټ انرژي ازاده کيږي چې دکتلي د کمښت (Mass defect) سره معادل قیمت لري.




په پوستکي کې دالفا ، بيتا او گاما وړانگو د ننوتلو کچه

په ۲۷- شکل کې ښودل شوي ده چې د بدن پوستکي ته دالفا (α)، گاما (γ) او بيتا (β) وړانگي ننوځي او هلته بيا لوژيکي او کيمياوي اغيزي تر سره کوي. د بېلگه په ډول د الفا وړانگي د بدن په پوستکي کې ترصفر عشرار په يو ملي متره ژورې ننوتلای شي او بيا هلته خښې پاتې کيږي. نوموړي وړانگي خپله ټوله انرژي د څو حجرو د غبرگون څخه وروسته دلاسه ورکوي.

په پوستکي کې دنوموړو وړانگو د ننوتلو کچه په ۲۷- شکل کې ښودل شوي ده.



۲۷- شکل: د بدن په پوستکي کې دالفا (α)، بيتا (β) او گاما (γ) وړانگو د ننوتلو کچه د ویکتورونو په اوږدوالي او ناوړه اغيزي يې د ویکتورونو په پنډوالي ښودل شوي ده. دالفا وړانگي د پوستکي په



پاسنی پټ يانې اېپي درمېس Epidermis اودری مېگا الکترون ولټ بېټا وړانګې لږڅه یو نیم سانتي متره په پوستکي کې ژور تر کوتیس (Cotis) پټ پورې رسیږي. دګاما وړانګې دومره زورورې دي چې یوه برخه یې دټول بدن څخه هم تیریدلای شي.


لنډیز: تجربو ښودلې ده چې په حجرو کې دالفا وړانګو دزیان کچه د بیتا او ګاما وړانګو په پرتله شل وارو زیاته ده. د بیتا وړانګې له ګرندیو الکترونو څخه جوړې دي چې د بدن په نسجونو کې څو سانتي متره ژور ننوتلای شي. ګاما وړانګې الکترو مقناطیسي وړانګې دي چې په هره ماده کې ډیر ژور ننوتلای شي. د بېلګه په ډول د ګاما وړانګو یوه برخه د کنکریټ مادې څخه چې پنډوالی یې لږ څه یومتر وي هم تیریدلای شي نو له دې کبله دنوموړو وړانګو دخطرڅخه ځان ژغورل او خوندي ساتل ډیر ګران او حتی ناشونی (ناممکن) کار ګنل کیږي.

دهستوي ذرو انرژي	په هوا کې دخپریدني واټن Range in air (mm)			په اوبو کې دخپریدني واټن Range in water (mm)		
	الکترون	پروتون	الفا ذره	الکترون	پروتون	الفا ذره
0,1 MeV	12	0,13	0,12	0,14	0,0016	0,0014
0,2 MeV	33	0,25	0,18	0,40	0,0030	0,0022
0,5 MeV	140	0,80	0,32	1,7	0,0098	0,0039
1,0 MeV	330	2,3	0,50	4,0	0,028	0,0061
2,0 MeV	790	7,0	1,0	9,5	0,086	0,012
5,0 MeV	2100	33,0	3,2	25,0	0,40	0,039
10,0 MeV	4150	120,0	9,5	50,0	1,47	0,12
20,0 MeV	8300	400,0	32,0	100,0	4,9	0,39
50,0 MeV		2000,0	160,0	250,0	24,0	1,9
100,0 MeV		6500,0	550,0	400,0	78,0	6,6


۱۵- جدول: په اوبو او هوا کې دالفا، بېټا، پروتون او الکترون د خپریدني واټن په واحد د ملي متر (mm) ښودل شوی دی.

دپام وړ: کله چې الکترومقناطیسي وړانګې او هستوي ذرې لکه الفا، نیوترون، پروتون او پوزیټرون اوداسې نور په یوه ماده ولګیږي نو هلته یو لړنستیز فزیکي، کیمیاوي او بیالوژیکي عملي (پروسې) تر سره کیږي چې په پایله کې خپله ټوله اویا یوه برخه انرژي دلاسه ورکوي اودمادې اتومونه، مالیکولونه په چارج شوو منفي او مثبت ایونو او رادیکالو بدلولي. له دې کبله نوموړې وړانګې د ایونایزکونکو وړانګو په نوم سره یادېږي چې دکتاب په پاتې برخه کې به د لنډیز په موخه د ایونایزکونکو وړانګو پر ځای دورانګو نوم ورکړو.

که چیرته یوه هسته په کافي اندازه دهیجان په حالت قراروه نه لري نو ددې احتمال شته دی چې خپله د تحریک اضافګي انرژي دډفوتون دخپړولو له لارې نه بلکه سم سیخ د کې K او ایل L مدار الکترونو ته انتقال کړي. نوموړې پېښه د نني بدلون یا انټرنال کونورزیون (Internal conversion = IC)



نوموړې کړنلاره په هغو هستوکې ډیره پېښیږي چې دپروتونو شمیر یې لوړوي. داځکه چې په نوموړو هستو کې دالکترونو او پروتونونو ترمنځ دکولمب غبرگون ډیر زوروروي او له دې کبله دالکترونو مدارونه هستې خواته ورځکول کیږي.



۲۸- شکل: د الفا بڅرکي (Alpha particle)، دویټرون (Deuteron)، پروتون (Proton)، او الکترونو د خپریدلو واین (Range) په عمودي محور (واحد یې گرام پر سانتي متر مربع) او د نوموړو ذرو انرژي په افقي محور (واحد یې الکترون ولټ) سره ښودل شوی ده. غزېدلي لیکي د نوموړو ذرو د خپرېدلو واین په اوبو او پرې شوي لیکي په سړپو (Lead) کې ښیي (50).



اکسریز یا رونتگن وړانګې (X-Rays or Roentgen Rays)

په ۱۸۹۵ م کال کې اکسریز (X-Ray) دیوه جرمني فزیک پوه کونراد رونتگن (Conrad Roentgen) له خوا رابرسیره (کشف) شوی چې دهغه له خوا لومړی د اکس یانې ناڅرګنده وړانګو په نوم سره یادشوي. په ۲۹- شکل کې د نوموړو وړانګو د منځ ته راتلو ټکنالوژي او آله ښودل شوي ده. د یوې کتود (Cathode = K) د سرچینې څخه الکترونه راوړي او د سل کیلو ولټه 100 kV په مرسته سره د هوا نه تش شوي شیشه یي لو ښي کې سم سیخ دانود وخوا ته تعجیل ورکول کیږي ترڅو په اخیر کې په یوه فلزي انود (Anode = A) ولګیږي. کله چې نوموړي ګړندي الکترونه د انود اتومونو د هستې په نږدې واټن کې تیریږي نو دهستې د کولمب قوې تر اغیزې لاندې راځي او داتوم هستې ته راڅکول کیږي. څرنګه چې نوموړي ګړندي الکترونه د خپل سم سیخ سمت څخه د کولمب قوې په واسطه راکاږه کیږي او هم دریدلو ته اړکیږي نو په دې ترڅ کې د ایکس برېمز وړانګې (X - Bremsstrahlen) او یا په بل عبارت دبریک وړانګې (X-Break rays) منځ ته راځي.

☑ داکسریز څخه دناروغیو په تشخیص کې ګټه پورته کیږي او انرژي یې (10-150 keV) ده

☑ داکسریز څخه د ناروغیو په درملنه کې ګټه پورته کیږي او انرژي یې (1-50 MeV) ده

☑ هغه آلي چې دناروغیو درملنې لپاره استعمالیږي لکه کوبالټ شپېته Co-60، بیتاترون Betatron، سم سیخ تعجیل کوونکی Linear Accelerator په نامه سره یادیږي.




۲۹- شکل: داکسریز (X-Ray unit) د تولید کولوآله بنودل شوي ده. کله چې گر ندي الکترونه e^- د کتود Cathode څخه راووزي نودتعجیل څخه وروسته په انود Anode باندې لگيري او هلته د اتوم هستي مثبت چارج په ساحه کې د خپل سم سیخ سمت څخه کاږه کيري او په پایله کې د رونتگن وړانگې یا اکسریز (X-Ray) منځ ته راځي. نوموړې وړانگې بیا د یوې کرکې څخه د باندې راووزي primary beam چې د ویکتوریاني غشي په څوکه بنودل شوي دي (Cunningham-15).

کله چې داکسریز گټور استعمال په درملنه او دناروغیو په پیژندنه کې په ثبوت ورسیده نو بیا وروسته دنوموړي فزیک پوه په ویاړ سره درونتگن نوم ورکړ شو او برسیره پر دې یو رونتگن $R = \text{Roentgen}$ دورانگو د واحد په صفت هم وټاکل شو.

پخوانی تعریف: یو رونتگن دورانگو هغه انداز ده چې په یوه سانتي متر مکعب وچه هوا کې دالکتروستاتیک واحد چارج $(3,3362 \times 10^{-10} \text{ C})$ په اندازه یوډول یاني مثبت او یا منفي بریښنايز چارجونه تولید کړي. نوموړې قیمت په یوه سانتي متر مکعب وچه هوا کې د لږ څه دوه ملیارده جوړه ایونو $(2,082 \times 10^9 \text{ ion pairs/cm}^3)$ سره سمون لري.

درونتگن وړانگو اوسنی اوداعتبار وړ تعریف په لاندې ډول دی (SI):

* یو رونتگن په یو کیلو گرام وچه هوا کې دایونایز کونکو وړانگو په وا سطره پیداشوي بریښنايز چارجونه دي چې قیمت یې لږ څه دوه نیم په لس زرمه برخه د کولومب $(1R = 2,58 \times 10^{-4} \text{ C/Kg})$ سره سمون خوري او په هوا کې دیو رونتگن وړانگو جذب شوي انرژي اندازه یې لږ څه یو سانتي گری سره مساوي ده.




په ۱۹۰۱ م کال کې رونتگن ته ددغه بې ساري او ارزښتناکه کشف له کبله دنوبل جایزه (Nobel Prize) ورکړل شوه. اکسریز یا د رونتگن وړانګې الکترومقناطیسي وړانګې دي چې دناروغيو په پیداکولو او پیژندلو کې یې انرژي تر سلو کیلو الکترون ولټه ۱۰۰ KeV اود پوستکي د درملنې لپاره یې انرژي تر دوه سوه کیلو الکترون ولټه ۲۰۰ keV او د بدن ژوري برخود درملنې لپاره ترڅو مېګا الکترون ولټه MeV پورې رسیږي. درونتگن یا اکسریز (X-Ray) ایونایز کوونکې وړانګو په دوه ځایونو کې منځ ته راتلای شي .

➤ **لومړۍ:** هغه وړانګې دي چې داتوم په مدارونو کې منځ ته راځي



➤ **دویم:** هغه وړانګې دي چې داتوم هستی د کولومب په بریښنايز ساحه کې منځ ته راځي.

په ۳۰- شکل کې داکسریز هغه وړانګې ښودل شوي دي چې داتوم په مدارونو کې منځ ته راځي او د کرتریسټیک یا مشخصه (ټاکلې) اکسریز (Characteristic X-Ray Radiation) په نامه سره یاد یږي.



۳۰- شکل: د مشخصه (ټاکلې) اکسریز (Characteristic X-Ray) د منځ ته راتلو کړنلاره ښودل شوې ده. په نوموړي شکل کې داتوم هستی ته د ننوتونکي یا لومړي الکترون انرژي په $E = E_0$ او دغبرگون څخه وروسته پاتې انرژي په $E = E_0 - \Delta E$ سره ښودل شوې ده. هغه الکترون چې د کي مدار څخه ایستل شوی دی د Ejected k Electron په نامه سره یادېږي او انرژي یې مساوي ده له: $E = \Delta E - E_k$ (25). په دغه غبرگون کې د k مدار مشخصه اکسریز لیدل کېږي (k Characteristic Radiation).

دټاکلو اکسریز دانرژي شپېکترم دهر عنصر لپاره ځانګړی او خطي یانې دکرښې په شان شکل لري. په ۳۱- شکل کې داکسریز دویم ډول وړانګې ښودل شوي دي چې داتوم په مدارونو کې نه بلکه دهستې په نږدې ساحه کې پیدا کېږي. دغه ډول وړانګو ته دبریمز وړانګو (Bremsstrahlung) چې د بریک break مانا ورکوي نوم ورکړ شوی دی. نوموړې وړانګې خطي طیف نه بلکه یو پراخ پلن طیف لري. کله چې ګړندي الکترونه د اتوم هستې ته ورنږدې شي نو هلته دپروتونو د مثبت چارج له خوا را ځکول کېږي چې په پایله کې درونتگن بریمز وړانګې منځ ته راځي. نوموړې فزیکي کړنلاره په ۳۱ شکل کې ښودل شوې ده.




۳۱- شکل: کله چې یو الکترون د هستې په نږدې ساحه کې تیرېږي نو د کولمب قوې داغیزې او غبرگون په پایله کې اکسریز نه کرکترېستیک یا بریمز (Bremsstrahlung) وړانګې منځ ته راځي (9)



Figure 1.1. The first radiograph of a living object, taken in January 1896, just a few months after the discovery of x-rays. (Courtesy of Röntgen Museum, Würzburg, Germany)

۳۲- شکل: د فزیک پوه رونتګن میرمنې دلاس اکسریز عکس لیدل کیږي چې درونتګن وړانګوپه مرسته اخیستل شوی دی. داکسریز نوموړی عکس د انسان لومړۍ عکس دی چې په ۱۸۹۶ م کال جنوري میاشت کې دنوموړو وړانګو د رابر سیره کیدلوڅه څو میاشوروسته اخیستل شوی دی .

په ۱۹۰۳ م کال کې د لومړي ځل لپاره د پوستکي سرطان ناروغۍ ددرملنې لپاره د اکسریز څخه ګټه واخیستل شوه. څرنګه چې په لومړۍ موده کې دورانګو اندازه کولولپاره د فزیک کمیت یا واحد نه ووتاکل شوی نود دورانګو اندازه کول یوازې د بیالوژیکي اوکلینیکي اغیزوپه اساس تر سره کیدلې. د بېلګه په ډول هغه کچه وړانګې چې د پوستکي د سوروالي (Erythem) سبب (لامل) ګرځي د بیالوژیکي ډوزیمترې تر ټولولوړې کچې واحد په صفت وپیژندل شوی او په هغه وخت کې پریکړه وشوه چې باید ناروغ ته تر دې قیمت نه پورته په یوه وار ور نه کړې شي.



د اکسريز د کشف څخه څو کاله وروسته په ډاگه شوه چې که څه هم دروغتيا په تر او داکسريز په کارول يوه ډيره گتوره طبي کړنلاره ده خو دېلي خوا اکسريزدگتيا په څنگ کې د انسانانوبدن ته زيان هم رسولای شي او د سرطان ناروغۍ سبب(لامل) گرځيدلای شي. د بېلگه په ډول په ۱۹۳۴ م کال کې ميرمن کيوري (Curie) يوه فرانسوئ فزيک پوهه د وينې سرطان په ناروغۍ مړه شوه. دا ځکه چې مادام کيوري دتجربو په موده کې د ډير وخت لپاره دراديم عنصر سره نږدې تماس درلود او داکسريز خطر يې د پام څخه غورځولی وه.

بېلگه:

ديوي څلويښت کيلو ولټ 40 keV اکسريزدستگا ه څخه وړانگې راوړي او دناروغۍ د پيژندنې په موخه د بدن هډوکو سره غبرگون کوي. په نوموړې کړنلاره کې د کاربن اتوم ايونايږ کيړی چې د باندني مدار O-shell لپاره يی د تړون انرژي قيمت لس الکترون ولټ (0,01KeV) دی. دنوموړي مدارڅخه يو الکترون راوځي چې حركي انرژي يې شل کيلو الکترون ولټه 20 keV سره برابره ده. دکمپتون خپريدونکي فوتون حركي انرژي څومره ده؟

حل:

$$40 = X + (0,01 + 20)$$


$$40 = X + 20,01$$

کله چې د پورتنۍ معادلې شى او کين اړخ څخه 20,01 منفي کړو نو د X نا ملومه قيمت ترلاسه کيږي چې د کمپتون فوتون انرژي سره برابردی


$$X = 19,99 \text{ keV}$$

نوکلید چارټ (Nuclide chart)


په ۳۲- الف شکل کې دیوسلو پينځه لسو عنصر و لپاره د (Segre nuclide chart) زيگري نوکلید چارټ ښودل شوی دی. ديوي هستي ډيپژندلوپه موخه په دغه کړنلاره کې دپروتونو شمير او نيوترونو شمير څخه کار اخيستل کيږي. په يوه نوکلید چارټ کې داتومونوپه هسته کې دنيوترونو شمير N او پروتونو شمير Z تر منځ اړيکې ديوه گراف په شکل سره ترتيب شوې دي. ديوي هستوي چاودنې په کړنلاره کې يونوکلید چې په لومړي پړاو کې دمورپلارنوکلید (parents nuclide) ورته ويل کيږي اوپه نوکلید چارټ کې ددغه نوکلید دواړومحورونو موقعيت په Z او N با ندې ټاکل شوی وي نودتجزیې څخه وروسته په يوه اویا ډيرونورو نوکلید وتجزیه کيږي چې د لور (Daughter) نوکلید په نوم ياديږي اوپه خپل وار سره په محورونو کې دهغوی موقعيت په (Z1,N1) او (Z2,N2) سره ښودل کيږي. د بېلگې په ډول که چيرته مور يو نوکلید په نوموړي گراف کې تر کتنې لاندې ونيسو چې موقعيت يې په افقي محور کې په Z او عمودي محور کې په N سره ښودل شوی اود نوکلید چارټ په تور بخونه خړه برخه کې موقعيت ولري نو کله چې په يوه داسی مور پلار عنصر کې هستوي تجزيه



تر سره شي او دالفا وړانګې ، بیتا وړانګې، نیوټرون ذرې او پروتون ذرې ورڅخه خپرې شي نو په پایله کې په یوه او یا ډیرو لوړګانونو کېدو واورې. څرنگه چې دالفا په تجزیه کې د مور پلارنوکلید (Z,N) څخه دوه پروتونه او دوه نیوټرونه خپریږي او په پایله کې د لورنوکلید د خپل پخواني موقعیت په پرتله ددوه واحدونو په کچه کینې خواته او ددوه واحدونو په کچه بنکې خواته را ټیټیږي نو له دې کبله د رادیو نوکلید په چارټ کې په $(Z-2; N-2)$ سره ښودل کیږي.




۳۲- الف شکل: دپورتنی شکل په کین اړخ او په عمودي محور کې د نیوټرونو شمیر N او په افقي محور کې د پروتونو شمیر Z ښودل شوی دی. په یوه نوکلید چارټ کې د والدین نوکلید یانې مور پلار نوکلید (Parent nuclide) یوه هسته (Z,N) تجزیه کیږي او په لور نوکلید (Daughter nuclide) اوږي. د بیلګې په ډول په پورتنی ښي اړخ ګراف کې د یوې هستوي تجزیې د ډول سره سم یونوی نوکلید منځ ته راځي چې دپروتونو $(Z+1; Z-1)$ او نیوټرونو $(N+1; N-1)$ شمیره یې د والدین نوکلید سره توپیر لري. د نوکلید چارټ په افقي قطار یالیکه کې دیوه همغه نوکلید نور ایزوټوپونه پراته دي چې د پروتونو شمیر یې ثابت دی $Z = \text{constant}$ خود نیوټرونو شمیر یې دیوه بل نه توپیر لري. په پورتنی ګراف کې هغه نوکلید چې رادیواکتیو خاصیت نه لري په تورو ټکوسره ښول شوي دي. هغه هستې چې د پروتونو شمیر یې د نیوټرونو شمیر سره یوشان وي $(Z=N)$ په سم سیخ کرښه ښودل شوي ده.




پوښتنې (Questions):

(ځوابونه يې په نونسم څپرکي کې ورکړ شوي دي)

- ۱-۵ ايونايزکونکې وړانگې په څو ډولونو ویشل شوې او په ماده کې څه غبرگون ښيي؟
- ۲-۵ په فزيک کې وړانگې څه ډول تعريف شوې دي او څه مانا لري؟
- ۳-۵ هستوي وړانگې کومو وړانگوته ويل کيږي او څو ډوله دي نومونه يې واخلئ؟
- ۴-۵ دالفا يودره چې انرژي يې څلورميگا الکترون ولټ قيمت لري په هوا کې څومره شمير ايونونه په يوه سانتي متر او دلاري په اخيرنۍ برخه کې توليدوي؟
- ۵-۵ دالفا تجزيه څه شي ته وايي؟
- ۶-۵ ايونايزکونکې وړانگې کومو وړانگوته ويل کيږي؟
- ۷-۵ په لاندني شکل کې دراديم هسته تجزيه کيږي. دغه ډول تجزيه څه نومېږي او د نوکلید په چارټ کې د پيداشوې لور نوکلید موقعيت چيرې دی؟






(Binding energy of helium) د هيليم اتوم ترون انرژي

$$\Delta m = 4.0330 - 4.0026 = 0.0304 \text{ u}$$

$$E = (931 \text{ MeV/u}) 0.0304 \text{ u} = 28.3 \text{ MeV}$$

څرنگه چې د هيليم اتوم په هسته کې څلور نوکلېونه دي نو د ترون انرژي په يو نوکلېون مساوي ده له اوه ميگا الکترون ولټه




شپږم څپرکی

د مادې سره د ايونايژکونکو وړانگو غبرگون

(Interaction of ionizing radiation with matter)


د فوتو اغيزه (Photo Effect)

د فوتو اغيزه هغه وخت منځ ته راځي چې يو فوتون $h\nu$ د لسوڅخه تر دوه سوه كيلو الکترون ولټه پورې (10 - 200 keV) انرژي ولري او داتوم په نني مدارکي د يوه کلک تړل شوي الکترون سره ولگيري او خپله ټوله حرکي انرژي د بېلگه په ډول د K مدار يو الکترون ته انتقال کړي. په پايله کې دغه الکترون داتوم د مدار څخه راوځي.



۳۳- شکل: د فوتو په اغيزه کې د اتوم په يوه مدارکي د يوه کلک تړلي الکترون سره يو رالويدونکی فوتون غبرگون کوي چې خپله ټوله انرژي دلاسه ورکوي. نوموړې الکترون داتوم مدار څخه په يوه ټاکلي حرکي انرژي راوځي او د فوتو الکترون په نامه سره يادېږي (25). د پورتنۍ شکل په بني اړخ کې د مادې سره د فوتون وړانگو هراړخيز غبرگون لکه د فوتو اغيزه، کمپتون اغيزه اود جوړه درود پيدايښت اغيزه ښودل شوي ده. په عمودي محورکي ددغې مادې داتوم عدد (شميره) يانې د پروتون شمير Z د فوتون انرژي (MeV) په تابع سره راښيي.

که چېرته په اتوم باندې د رالويدونکي فوتون (Incident photon) انرژي په $(h\nu)$ سره وښو او د بېلگه په ډول د K يوه مدارکي د يوه الکترون تړون انرژي (Binding energy) په E_B سره وښو نوکله چې



نوموړی فوتون په یوه الکترون ولگيري نود K مدار څخه یې راوباسي. دنوموړي مدار د الکترون حرکي انرژي ($Kinetic\ energy = E_k$) چې د اتوم څخه راوځي په لاندې ډول لاس ته راځي.


$$E_k = h\nu - E_B$$

دغه ډول فزیکي کرنلاره دایونایزیشن (Ionization) په نامه سره یادېږي. ازادشوی الکترون یا په بل عبارت د فوتوالکترون (Photoelectron) په لاره کې بیا دنورو اتومونو سره داسې غبرگون کوي چې په خپل وار سره اخیستل شوي انرژي دلایسه ورکوي. په دې کرنلاره کې د اتومونو څخه د لید لوړو وړانګې (Visible light) اود بېنفش نه هغه خواته وړانګې پیدا کېږي. څرنگه چې دفوتواغیزې په کرنلاره کې داکسیریز آلي الکترومقناطیسي وړانګې په یوه ماده کې داسې جذب کېږي، چې دنسجونو دکنثافت (ρ) سره سم سیخ او داتوم نمبر (Z^4) سره په طاقت د څلورارېکي لري، نو له دې کبله په هډوکو کې چې کنثافت یې ($\rho=1,7g/cm^3$) دی ترټولو ډیراوپه غوښه اوواژه کې چې کنثافت یې ($\rho=1,0\ g/cm^3$) دی، په توپیر سره خپله انرژي دلایسه ورکوي. دفوتو اغیزې نوموړي خواص څخه په درملنه کې دناروغیوپه پیژندلو (تشخیص) کې ګټه اخیستل کېږي. د بېلګه په ډول څرنگه چې د هډوکو کنثافت اندازه د سرو کنثافت ($\rho_{Lung}=0,3g/cm^3$) په پرتله لږ څه پینځه واره لوړه ده، نو له دې کبله په هډوکو کې وړانګې د سرو په پرتله په همغه کچه ډیرې جذب کېږي او په پایله کې د اکسیریز په فلم کې دنوموړو نسجونو تر منځ بڼکاره توپیر لیدل کېدای شي.


دکمپټون اغیزه (Compton Effect)

کله چې دفوتون انرژي د دوه سوه زره الکترون ولټه څخه واورې ($> 200\ 000\ eV$) او تر دوه ملیونه الکترون ولټه پورې ورسېږي نود کمپټون پېښه منځ ته راځي. په ۳۴ - شکل کې دکمپټون اغیزه ښودل شوېده. دکمپټون اغیزه داتوم دمداربهرنیو مدارونو کې چې هلته الکترونه دومره کلک نه وي ترلي منځ ته راځي(25)

Chapter




۳۴- شکل: دکمپټون اغیزه (Compton effect)



دکمپتون په اغیزه کې په اتوم باندې د فوټون وړانګې لګېږي او خپله ټوله انرژي نه بلکې یوازې یوه برخه حرکتی انرژي مادي ته انتقال کوي او په پایله کې د اتوم د مدار څخه یو الکترون راوباسي. دغه الکترون د کمپتون الکترون په نامه سره یادېږي او په لاره کې د نورو اتومونو سره غبرګون کوي چې دهغوی دایونایزیشن سبب (لامل) ګرځي. د کمپټن الکترون (compton electron) او رالویدونکی فوټون (Incident photon) دواړه د غبرګون څخه وروسته په خپل وار سره د Φ او θ زاویې لاندې د اتوم څخه راوځي. په دې کړنلاره کې لګېدلی فوټون (Scattered photon) خپله لاره کږه کوي او اود ګاونډیو نورو اتومونو سره لګېږي. په پایله کې د پخوا په شان په خپل وار سره ثاني کمپتون الکترونه د اتوم مدار څخه ازادېږي (25).

د جوړه ذرو پیدایښت (Pair Production)


کله چې د فوټون وړانګو حرکتی انرژي د یو میلیون الکترون ولټه څخه تر شل میلیون الکترون ولټه پورې (20 MeV) ورسېږي نو پنځوس په سل کې کمپتون اغیزه (50%)، نه څلویښت په سل کې د جوړې پیدایښت (49%) اغیزه او یو په سل کې (1%) دهستي چاودنې اغیزه منځ ته راځي.



۳۵- شکل: دپوزیترون Positron او الکترون جوړه ذرو پیدایښت (Pair Production) ښودل شوی دی. نېګاترون Negatron یوې منفي چارج شوې ذرې ته ویل کېږي. دپوزیترون مثبت ذره په لاره کې د یوه ازاد الکترون سره یوځای کېږي چې د منځه وړونکي تعامل Annihilation reaction په نامه سره یادېږي. په پایله کې د ګاما دوه وړانګې پیداکېږي چې د یوه بل څخه په ۱۸۰ درجې زاویه خپرېږي.

دجوړه ذرو پیدایښت په اغیزه کې د فوټون وړانګې د اتوم هستې ته ور ننوځي Incident photon او هلته خپله ټوله حرکتی انرژي دلاسه ورکوي او په کتله اوږي. په پایله کې یو الکترون او یو پوزیترون (Positron) ورڅخه پیداکېږي. دپوزیترون او الکترون په ګډه سره حرکتی انرژي مساوي ده له:

$$(h\nu - 2m_e C^2)$$



پایله:

دجوړه ذره پیدایښت په ډاګه کوي چې د وړانګوانرژي په ماده او برعکس ماده د وړانګوپه انرژي اووېستلای شي. په دې هکله د کتلې M او انرژي E معادل فرمول داسې لیکو:


$$E = M \times c^2$$

$$M = \frac{m}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

نوموړې فزیکي کرنلاره دالبرت اینشتاین (A.Einstein) د کتلې او انرژي معادل فرمول یو وتلی ثبوت په ډاګه کوي

پوزیټرون Positron یوه داسې ذره ده چې کتله یې د الکترون کتلې سره یوشان خو دمنفي چارج په ځای مثبت چارج لري. له دې کبله نوموړې ذره د مادې ضد ذره (Antimatter) او دواړو ته په ګډه سره جوړه ذرې ویل کیږي. که چېرته د رالویدونکي فوتون انرژي (Incident photon) د یومېکا الکترون ولته ($2m_e c^2 > 1.02 \text{ MeV}$) څخه لوړ قیمت ولري، نو دغه اضافي انرژي د پیدا شوو زرویاني الکترون او پوزیټرون تر منځ دحرکي انرژي په ډول ویشل کیږي او پاتې انرژي یانې 1.02 MeV دهغوي دکتلې د پیدایښت په لاره کې د منځه ځي. هرکله چې نوموړی پوزیټرون په لاره کې د اتومونوسره غبرګون تر سره کړي، نوخپله حرکي انرژي دلایسه ورکوي او بیا دلارې په اخیرکي دریږي. نوکه په دې ترڅ کې د بېلګه په ډول دنسجونودیوه اټوم سره غبرګون وکړي نو دهغه دباندنیو مدارونود لږ کلک تړلي او یا په بل عبارت د یوه آزا د الکترون سره بیرته یو ځای کیږي (Recombination). په پایله کې د پوزیټرون اوددغه ازاد الکترون د سکون کتله په دوه ګاما وړانګو اوږي. ددغو دوه وړانګوحرکي انرژي په ځانګړي توګه سره (0.51 MeV) قیمت لري اونوموړې ذرې د یو بل په پرتله په 180° زاو یه سره داتوم څخه راوځي. نوموړې تعامل د منځه وړونکي تعامل (Annihilation reaction) په نامه سره یادېږي. څرنگه چې دګاما دواړه وړانګې په پوره کچه حرکي انرژي لري، چې قیمت یې لږ څه پینځه سوه کیلوالکترون ولټ دی (0.51 MeV) نو له دې کبله دناروغ د بدن څخه راوتلای شي او د بهر له خواد یوه دېټیکټور (Detector) په مرسته سره اندازه کیدای شي

👉 نن ورځ په هستوي طب (Nuclear medicine) کې دنوموړې فزیکي کرنلارې په بنسټ دسرطان ناروغۍ د تشخیص (بیژندنې) په موخه په پراخه کچه دداسورادیو ایزوتوپوڅخه ګټه اخیستل کیږي، چې د پوزیټرون ذرې خپروي. د بېلګه په ډول لکه کاربون ^{11}C ، اکسیجن ^{15}O ، فلور ^{18}F اوداسې نور. نوموړي رادیوایزوتوپونه په مصنوعي توګه په یوه سیکلوترون Cyclotron کې تولید کیږي او نیمایي فزیکي وخت یې په خپل وار سره شل



دقیقی ، دوه دقیقې او یو سلولس دقیقې سره مساوي دي . دبیلگي په ډول کله چې د فلور¹⁸F ایزوټوپ څلور سوه میگا بیکاریل (400 MBq) اکتیویټي یوه ناروغ ته د پیچکاری په ورکولوسره او یا د گولی په بڼه ورکړ شي، نود بدن په ټولو هغوحجرو کې چې د میتابولیزم په کړنلاره کې ډیر زیات گلوکوز Glucose ته اړتیا لري نوموړی ایزوټوپ د بدن نورو حجرو په پرتله په لوړه کچه جذب کوي.

په ماده کې د الکترون غبرگون (Electron interaction with matter)

که چېرته یو لوړ انرژي الکترون اویا د بیتا ذره د مادې اتومونو سره ولگيږي نو د یوې خوا د اتوم په مدار کې د الکترونوسره او د بلې خوا د اتوم هستې پروتونو سره د کولومب بریښنايزقواو په بنسټ غبرگون کولای شي. په ۳۶- شکل کې د مادې سره د الکترون غبرگون فزیکي کړنلاره ښودل شوې ده.

“a” : یو الکترون مادې ته ورننوځي اودهغو الکترونو سره چې د اتوم په بهرنیو مدارونو کې پراته او دومره کلک تړلي نه دي غبرگون کوي. په دې کړنلاره کې هر وار لږ څه انرژي د لاسه ورکوي او په پایله کې د خپل پخواني سمت څخه کېږي. ترڅو چې دغه الکترون خپله ټوله انرژي د لاسه ورکوي، لږ څه یو زرتکرونه ورته په کار دي.

“b” یو الکترون مادې ته ورننوځي او د اتوم نني مدارونولکه د K مدار کلک تړلي الکترون سره غبرگون کوي او دومره انرژي ورته انتقال کوي چې د K الکترون د اتوم څخه بیخي راووځي (K electron ejected). په دې ترڅ کې د K مدار ځانگړې وړانگې د اتوم څخه خپريږي (K characteristic Radiation).


د ۳۶ شکل د “C” په برخه کې کله چې یو الکترون د هستې (Nuclueus = N) په نږدې واټن کې تیريږي او انرژي یې د بیلگي په ډول په E سره وښیو، نود کولومب مثبت بریښنايز قواو داغیزې له کبله راڅکول کیږي او په پایله کې د خپل سم سیخ سمت نه کېږي. نوموړی الکترون اوس د پخوا په پرتله په لږ حركي انرژي E-hv سره مخ په وړاندې خو ځیږي. په دې ترڅ کې د اکسیریزو ډول وړانگې لا س ته راځي چې د بریمزورانگو (bremsstrahlung) په نامه سره یادېږي او انرژي یې په hv سره ښودل شوې ده. نوموړې وړانگې د سرطان ناروغۍ په تشخیص (پیژندنه) او تېراپي (درملنه) کې مهم رول لوبوي (15).

۳۶ شکل “d” که چېرته یو الکترون دومره ډیره انرژي ولري چې د هستې منځ ته ورننوځي او هلته د یو پروتون سره د غبرگون په پایله کې خپله ټوله حركي انرژي E د لاسه ورکوي نو په دې صورت کې هم د بریمزورانگې (bremsstrahlung) منځ ته راځي او انرژي یې مساوي ده له:


$$(E = hv)$$

په دغه معادله کې اچ h د یوه جرمني فزیک پوه ماکس پلانک (Max Planck) په ویاړیو ثابت عدد (شمیره) دی چې د پلانک اغیزمن کوانتوم په نامه سره یادېږي او قیمت یې مساوي دی له:

$$h = 6,26 \times 10^{-34} J.s$$



Interactions of Electrons




2654F





۳۶- شکل: (Interaction of electrons) د یوې مادې داتومونو سره دالکترون وړانگو هراړخیز فزیکي غبرگون ښودل شوی دی. a: ارتجاعي ضربه (Elastic impact): الکترون داتوم په څنګ کې تیریدي او یوازې خپل سمت ته تغیر ورکوي. خو کله چې اټوم ته ډیر ورنږدې شي نو داتوم الکترونو سره غبرګون کوي او یو الکترون چې ددلتا الکترون $\delta = \text{delta rays}$ او یا دلتا وړانګو په نامه سره یادېږي د مدار څخه راوباسي. نوموړی الکترون دګڼ شمیر ټکرونو څخه وروسته انرژي د لاسه ورکوي او ځای په ځای درېږي ، b: غیر ارتجاعي ضربه (Inelastic impact) او د اکسیریمنځ ته راتلل: C; دبریک وړانګو یا نې دبریمز وړانګو (Bremsstrahlung) پیدایښت. (15)

په ماده کې دورانګو دکمزورتیا قانون (Radiation Attenuation law in Matter)

کله چې وړانګې د یوې مادې سره غبرګون وکړي نو یوه برخه یې هلته جذب کیږي او بله برخه یې د مادې څخه تیرېږي. په ۳۷- شکل کې پنډ وېکتورونه دا مانا لري چې ډیرې وړانګې او نري وېکتورونه دامانا ورکوي چې د مادې څخه لږ وړانګې تیرېږي. په یوه ماده کې دورانګو جذب کیدل د مادې په پندوالي، کثافت، اټوم نمبر او دورانګو په انرژي پورې اړه لري.

یادونه: په هسته کې پروتونونه او نیوترونونه دهستوي قوې په واسطه (Strong force) یوځای ساتل کېږي. همدارنګه د پروتون او نیوترون تر منځ هم دغه هستوي قوه اغیزه لري او یو بل سره ځکوي.





د مادې پندوالی	د مادې کثافت	د اټوم نمبر	دورانګودڅپو اوږدوالی
			
دورانګوجذب کیدل د مادې پندوالي سره لکه اکسپونینسیال تابع کمښت مومي	دورانګوجذب کیدل د مادې کثافت سره سم سیخ تړاو لري	دورانګوجذب کیدل د اټوم نمبر په څلورم طاقت تابع ده.	دورانګوجذب کیدل دڅپو اوږدوالي په دریم طاقت سره متناسب ده.

۳۷ - شکل: په یوه ماده کې دورانګودغبرګون په پایله کې هر اړخیز جذبیدل ښودل شوي دي (51)

په ۳۸ شکل کې ښودل شوی ده چې که الکترومقناطیسي وړانګې د یوې مادې څخه تیریري نو دهغې لومړنۍ شدت I_0 د پندوالي S په هره کوچنۍ تفاضلي برخه dx کې ددریو فزیکي کړنلارو په بنسټ لکه د کمپتون اغیزه، د فوتو اغیزه او الاستیکي غبرګون په بنسټ کمښت مومي او یا په بل عبارت شدت یې کمزوری کیږي. په نوموړې فزیکي کړنلاره کې د مادې د اټومونو سره الکترو مقناطیسي وړانګې غبرګون کوي او په پایله کې دیوه اکسپونینسیال تابع (Exponential function) په بڼه د پندوالي په تړاو کمښت مومي.

- ✓ دورانګولومړني شدت I_0 یوه برخه (I_x) په ماده کې جذب کیږي
- ✓ دورانګولومړني شدت یوه برخه وړانګې خپل سمت ته تغیر ورکوي او د مادې څخه وځي
- ✓ دورانګولومړني شدت پاتې بله برخه (I) بې له غبرګون څخه دما دې نه سم سیخ تیریري.
- ✓ په ماده کې نورې نورې ذرې د غبرګون په پایله کې منځ ته راځي
- ✓ د مادې په یوه تفاضلي پنډه برخه او د لارې په اوږدو کې دمنځ خواته انعکاس کوي او موازي نه ځي نو له دې کبله یې شمیر ډیریري.



۳۸- شکل: دورانگولومرنی شدت I_0 دمادی په هریوه کوچني تفاضلي پنډوالي dx کې د تفاضلي شدت dI په اندازه کمښت مومي. کله چې دغه ټول کمښت سره **جمعه کرويانې انتگرال** يې ونيسو نوډېنډوالي په اوږدو کې S دلومرنی شدت ټول کمښت لاس ته راځي.

د یوې مادې په یوه برخه کې چې د اکس x په توري سره یې ښیو دالکترومقناطیسي وړانگو د شدت I_x تفاضلي معادله ډېنډوالي کوچنۍ برخې dx په تابع سره په لاندې ډول لیکلای شو:

$$dI_x = -\mu I_x dx$$


د ریاضي په پورتنۍ تفاضلي معادله کې د منفي علامه دا سې ما نا ورکوي چې دالکترو مقناطیسي وړانگو تفاضلي شدت dI_x کمښت مومي کله چې دیوې مادې ترټولو کوچني پنډوالي dx څخه تیريږي. په نوموړې تفاضلي معادله کې میو μ د یوناني ژبې یو ټکی دی او د کمښت یا کمزورتیا خطي ضریب او یا د کمزورتیا فکتور (Attenuation coefficient) په نامه سره یادېږي چې واحد یې یو تقسیم په سانتي متر cm^{-1} یانې د اوږدوالي معکوس (Reciprocal value) کمیت ټاکل شوی دی. په بل عبارت سره میو μ د فوټون ذروهغه برخه ده چې د یوې مادې د پنډوالي په واحد کې غبرگون کوي. دبیلګې په ډول $\mu = 0,01 \text{ cm}^{-1}$ دا مانا لري چې د فوټون وړانگو د سلو څخه یوازې یو فوټون دمادې په هریوه سانتي متر پنډوالي یا پټ (Layer) کې غبرگون کوي.

نوموړی ضریب د مادې د کثافت ρ او دورانگو دانرژي E تابع ده او په ریاضي کې نوموړې مطلب داسې لیکل کیږي: $\mu = \mu(E\rho)$

$$\frac{dI_x}{I_x} = -\mu dx$$

پورتنۍ معادل په بله بڼه اړوو:

کله چې ډېپورتنتی معادلې ښي اړخ او کین اړخ یانې دورانگو شدت او پنډوالي انتگرال ونیسو نو لرو:



$$\int_{I_x=I_0}^I \frac{dI_x}{I_x} = -\mu \int_{x=0}^x dx$$

د طبیعي لوگاریتم $\ln$ په کارولوسره چې قاعد ه یې 2,718 e عدد(شمیره) ټا کل شوي ده پا سنی معادله لاندنی شکل ځانته غوره کوي $(X=S)$.

$$\ln \frac{I}{I_0} = -\mu X$$

کله چې دقاعدي عدد(شمیره) لپاره د اویلرریاضي پوه دنوم لنډیزپه موخه لومړی ټکي یا نی $(e = 2,718)$ وکاروو نود پورتنی معادلي دحل تابع لاندنی بڼه لري:

$$I = I_0 \times e^{-\mu X} = I_0 \times 2,718^{-\mu X}$$

په پورتنی معادله کې لاندني فزیکي کمیتونه تعریف شوي دي:

I_0 دورانگو لومړنی لویدونکی شدت، I دورانگو هغه شدت ته وايي چې په ماده کې د پنډوالي X د تیریدلو څخه وروسته لا پاتې دی.

د شدت I او I_0 حاصل تقسیم ته ترانسمیسیون وايي او مساوي ده: $I/I_0 = \text{Transmission}$
د شدت جذب کیدل یا نسبي کمښت مساوي دې له: $\text{rel. Attenuation} = 1 - I/I_0$

څرنگه چې دالکترو مقناطیسي وړانگو لکه د فوتونو وړانگو شدت د فوتونو شمیر سره سم سیخ متنا سب دې نو که چیرته په یوه ماده باندې د رالوېدونکو (Incident) فوتونو شمیر په N_0 او د کمزورونکي مادي پنډوالی په ایکس x سره وښیو نو دهغو فوتونو شمیر N چې دنوموړي پنډوالي څخه تیر شوي دي په لاندې ډول تر لاسه کولای شو.


$$N = N_0 \times e^{-\mu x}$$

*** پوښتنه:** دیوي رادیواکتیوسرچیني څخه زر فوتونه $I_0 = 1000$ خپریږي اودلرگي په یوه شپارس سانتي متره $x = 16 \text{ cm}$ پنډه ډره (تخته) باندې لگیږي. که دلرگي د کمزورتیا خطي فکتوريي صفر عشریه یوپه سانتي متر $(\mu = 0,1 \text{ cm}^{-1})$ قیمت ولري نودهغو فوتونو شمیر مالوم کړئ چې دنوموړي ډرې څخه تیرښوي دي .

$$\mu x = 0,10 \text{ cm}^{-1} \times 16 \text{ cm} = 1,6$$

حل:

$$N = N_0 e^{-\mu x} = 10^3 \times e^{-1,6} = 202$$




* **ځواب:** د زرو فوتونو څخه یوازې دوه سوه دوه فوتونه د لرګي څخه تیرېږي.

څرنگه چې دکمزورتیا فکتور μ د یوې جذب کېدونکې مادې د کثافت ρ سره سم سیخ متنا سب دی نو په یوه ماده کې دالکترو مقناطیسي وړانګو دکمزورتیا قانون په لاندې ډول هم لیکلای شو.


$$I = I_0 \times e^{-\frac{\mu}{\rho} \times \rho}$$

په پاسنۍ معادله کې دکمزورتیا فکتور μ او کثافت ρ حاصل تقسم ته μ/ρ دکتلي کمزورتیا ضریب (Mass attenuation coefficient) ویل کیږي. دنوموړي ضریب وړتیا په دې کې لیدل کیږي چې د یوې مادې په کثافت پورې اړه نه لري. همدارنګه د کثافت ρ او د جذب کونکې مادې د پندوالي حاصل ضرب ته $(\mu \times x)$ دکتلي سطحی ضریب ویل کیږي. په ۳۹ - شکل کې د اوبو، نسجونو، هوا او نورو موادو کې دورانګو دکتلي کمزورتیا ضریب μ/ρ په واحد د سانتي متر مربع پر ګرام $(\text{cm}^2 \text{g}^{-1})$ بنودل شوی دی.



۳۹ - شکل: په نسجونو، هوا، اوبو، کانکریت او نورو موادو کې د ګاما وړانګو دکتلي کمزورتیا ضریب (μ/ρ) په تابع د مېګا الکترون ولټ انرژي بنودل شوی دی (15).

* **پوښتنه:** د یوه راډیو اکتیو عنصر څخه د فوټون وړانګې خپرېږي چې انرژي یې یو مګا الکترون ولټ قیمت لري. نوموړې وړانګې په لاره کې د کاربون په یوه توتې چې پندوالی یې پنځوس کیلو ګرامه په یوه متر مربع کې دی لګیږي. د فوټونو هغه برخه مالومه کړئ چې د کاربون توتې څخه تیره شوېده؟



* **حل:** دنوموري عنصر دکتلي کمزورتيا فکتور د ۳۹ شکل څخه رااڅلوچي قيمت يې $\mu/\rho = 0,00636 \text{ m}^2/\text{Kg}$ سره مساوي دی. دکتلي دکمزورتيا نومورئ فکتور μ/ρ د کاربون دپندوالي x سره ضرب کوو نو لرو:

$$(\mu/\rho) \times x = 50 \text{ Kg/m}^2 \times 6,36 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{Kg} = 0,318$$

دفتونو هغه برخه چې دکاربون توتي څخه تيريري مساوي دی له: $e^{-0,318} = 0,728$

* **ځواب:** دورانگو لږ څه دري او يا په سل 73% دکاربون توتي څخه تيريري.

* **پوښتنه:** داکسريزيوه سل کيلوالکټرون ولټه آلي څخه د سري عکس داخيستلو په موخه يوه ناروغ ته اکسريز ورکول کيږي. دناروغ بدن پاتې برخې د سريو Pb په بالاپوښ سره پټي کيږي تر څو دورانگو دزرر څخه خوندي وساتلي شي. دنومورو وړانگو د کمزورتيا کچه معلومه کړی که چيرته په لاره کې د سريو د بالا پوښ څخه چې پندوالی يې يو ملي مترقيمت ولري (0,1cm) تيري شي؟

* **حل:** دسل کيلو الکترون ولټه انرژي لپاره د کتلي کمزورتيا فکتور قيمت مساوي دی له: $\mu/\rho = 5,55 \text{ cm}^2/\text{g}$ او د سريو کثافت مساوي ده له $\rho(\text{Pb}) = 11,35 \text{ g/cm}^3$ نو دورانگو کمزورتيا قانون لپاره ليکو چې:

$$\frac{I}{I_0} = e^{-\frac{\mu}{\rho} \times \rho} = e^{-5,55 \times 0,1 \text{ g/cm}^2 \times 11,35 \text{ g/cm}^3} = 0,0018$$


* **ځواب:** دفتون وړانگو لږ څه دوه په زرمه برخه دسرب بالا پوښ څخه د ناروغ بدن ته ننوځي.

د نيمايي ارزښت پندوالی (Half-value layer = HVL)

نيمايي ارزښت پند والی د يوې مادې هغه پندوالي ته وايي چې دورانگو شدت I د هغې دتيريدلو څخه وروسته د وړانگو لومړني شدت I_0 په پرتله د جذب کولو اوانعکاس په پايله کې نيمايي ته را ټيټ شي.

$$\frac{I_{1/2}}{I_0} = \frac{1}{2} = e^{-\mu s^{1/2}} = \exp(-\mu S \frac{1}{2})$$

درياضي معادله يې داده:



او کله چې دمعادلې دواړو خواو طبيعي لوگاريتم ونيسو او په ياد ولورو چې

$$\ln \frac{1}{2} = -\ln 2 = -\mu S \frac{1}{2} \quad \text{نو لرو: } (\ln e = \ln 2,718 = 1) \quad \text{او يا دخطي جذب کونکي}$$

$$\mu = \frac{\ln 2}{S_{1/2}} = \frac{0,693}{HVL} \quad \text{ضريب } \mu \text{ لپاره داسې لیکو:}$$

او د نيمايي پنډوالي اندازې لپاره ($HVL = S_{1/2}$) لیکو:

$$HVL = S \frac{1}{2} = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{0,693}{\mu}$$

دورانگودشدت کمښت I د مادې دنيمايي پنډوالي HVL په تابع سره اوس لاندنۍ بڼه ځانته اخلي:

$$I = I_0 e^{-\mu S} = I_0 e^{-\frac{0,693 S}{HVL}}$$



که چيرته په يوه ماده باندې د رالويدونکو فوتونو لومړۍ شمير په N_0 او دهغو فوتونو شمير چې دپنډوالي x څخه تيريري په N سره وښوونو دالکترو مقناطيسي وړانگو دکمزورتيا قانون دنيمايي پنډوالي په وراچولو سره په لاندې ډول هم ليکلای شو.

$$N = N_0 \times e^{-\mu x} = N_0 e^{-0,693 X / HVL} = N_0 \times 2^{-X / HVL}$$

څرنگه په يوه ماده کې د جذب شوو فوتونو شمير N د انرژي ډوز D سره سم سيخ متناسب دی نو پورتنۍ معادله په لاندې ډول هم ليکلای شو:

$$D = D_0 \times e^{-\mu x} = D_0 e^{-0,693 X / HVL} = D_0 \times 2^{-X / HVL}$$

په ٤٠ شکل کې دپورتنۍ معادلې گراف رسم شوی دی. په نوموړي گراف کې د نيمايي پنډوالي HVL په ځای د جذب کونکې مادې نيمايي پنډوالی په (Thickness = $t_{1/2}$) او بيا په خپل وار سره دوه نيمايي پنډوالی (2 $t_{1/2}$) درې نيمايي پنډوالی (3 $t_{1/2}$) او څلورنيمايي پنډوالي (4 $t_{1/2}$) سره ښودل شوی دی.




۴۰- شکل: په عمودي محورکي د گاما وړانگو د دوز قدرت D_t او په افقي محورکي د جذب کوونکي مادي پنډوالی په واحد د نیمایي پنډ والي ($\text{Thickness} = t_{1/2} = \text{HVL}$) سره شول شوی دی. دپورتنی گراف څخه ښکاري چې دیونیمایي پنډوالی $t_{1/2}$ څخه وروسته د تیري شوو وړانگو انرژي دوز قدرت د گاما وړانگو لومړني دوز D_0 په پرتله نیمایي $\frac{1}{2} D_0$ او د دوو نیمایي پنډوالی څخه وروسته $2 t_{1/2}$ یو په څلورمې برخي $\frac{1}{4} D_0$ او د دریو نیمایي پنډوالی $3 t_{1/2}$ څخه وروسته یو په اتمه $\frac{1}{8} D_0$ برخه کمښت مومي.

* **پوښتنه:** دکوبالت شپيته Co-60 یوه طبي آله په یوه متر واټن او یوه دقیقه کې اتیا سانتي گري (80cGy/min) دانرژي دوز قدرت لري. د وړانگو دزرڅخه دځان ساتلو په خاطر نړیوال کمیسیونون ICRP دا سپارښتنه کوي چې په یوه متر واټن کې دنوموړې آلې د دوز قدرت ددوه ملي سانتي گري څخه په یوه ساعت کې وانه وړي. په کومه کچه د سرپوفلز یوه پنډ دیوال ته اړتیا لیدل کیږي تر څو دنوموړو وړانگو شدت دومره کمزوری کړي چې طبي کارکوونکو پرسونل ته زیان وه نه رسیږي.


* **حل:** دسرپو فلز د کمزورتیا خطي فکتور مساوي ده: 66 m^{-1} دنیمایي ارزښت پنډوالی لپاره لیکو چې: $\text{HVL} = 0,693/66 \text{ m}^{-1} = 0,0105 \text{ m}$ د وړانگو کمزورولو اندازه یا کچه مساوي ده له:

$$\frac{80 \times 60 \text{ cGy} / \text{h}}{2 \times 10^{-3} \text{ cGy} / \text{h}} = 2400000 = 2,4 \times 10^3 \times 10^3$$

* **ځواب:** په هغه ځای کې چې طبي پرسونل کارکوي دنوموړې آلې دانرژي قدرت باید چې لږڅه دوه نیم ملیونه واره کم شي ترڅو د هغوي روغتیا ته کوم زیان وه نه رسیږي. لاندنۍ شمیرنه رابښي چې دنوموړی کمښت لپاره لږ څه دروشت سانتي متره (23,1 cm) دسرپوفلز په کارده.




د وړانگو زرځله کمښت ته دسرپوفلز لږ څه لس ټوټې نيمایي ارزښت پندوالی په کار دی. داځکه چې که دوه په طاقت دلسوونیسونو قیمت یې لږڅه زرکیري ($2^{10} = 1024$) کله چې نيمایي پندوالی په لسو کې ضرب کړونولرو: ($0,0105 \text{ m} \times 10 = 0,105 \text{ m}$). د وړانگوبیا زرځله کمښت ته د سرپ فلز لس ټوټې نيمایي ارزښت پندوالی په کار دی چې د $0,105 \text{ m}$ متره سره مساوي دی. ددوه عشریه څلورځله کمښت لپاره لږڅه اضافه له یو نيمایي ارزښت پندوالی یانې لکه دوه په کار دي چې د $0,021 \text{ m}$ متره سرپ فلز سره مساوي دی. کله چې د نوموړو ټولونيمایي پندوالو شمیر اواندازه سره جمع کړو ($0,105 \text{ m} + 0,105 \text{ m} + 0,021 \text{ m} = 0,231 \text{ m}$) نو لږڅه درویشټ سانتي متره اويا په بل عبارت دسرپ فلز صفر عشریه درویشټ متره کچه په کار ده.



۴۰- الف شکل: په پا سني شکل کې يوه ماده په لسو سانتي مترو ويشل شوي ده او ددغي مادې په هر يوه سانتي متر پندوالي کې د فوتونو وړانگو غبرگون ښودل شوي دي. د بېلگه په ډول د چپ اړخ نه زر فوتونونه په ماده لگيري او دهغوي څخه يوازې سل فوتونونه په يوسانتي متر پندوالي کې جذب کيږي او پاتې نوي په سل کې ور څخه تيريري. په لاندني شکل کې د هريوه سانتي متر څخه د تيرو شوو فوتونو شمير (Transmitted Photons) د مادې د پندوالي په تابع سره راښيي. دماډي دنيمایي پندوالي څخه وروسته (HVL) چې دلته لږڅه شپږ نيم سانتي متره دي د تيرو شوو فوتونو شمير پنځوس په سل يانې پينځه سوه دی.

د لسم ارزښت پندوالي (Tenth-value layer = TVL)

همدارنگه لسم ارزښت پندوالي (Tenth-value layer = TVL) ديوې مادې هغه پندوالي ته وايي چې د وړانگو لومړني شدت I_0 لسمه برخه ور څخه تيريري. د لسم ارزښت پندوالي TVL او د کمزورتيا خطي فکتور μ تر منځ لاندنی اړیکې اعتبار لري.




$$TVL = S_{1/10} = \frac{\ln 10}{\mu} = \frac{2,30}{\mu}$$

د لسم ارزښت پنډ والي ($TVL = S_{1/10} = X_{1/10}$) او د نیمایي ارزښت پنډوالي ($HVL = S_{1/2}$) تر منځ لاندنی اړیکې شته دي.


$$X_{1/10} = X_{1/2} \times \ln 10 / \ln 2 = 2,3 / 0,693 \times X_{1/2} = 3,3 \times X_{1/2}$$

$$TVL = 3,3 HVL$$

ښايي لسم ارزښت پنډوالی د نیمایي ارزښت پنډوالي په پرتله لږ څه درې نیم ځله لوړدی.



۴۱- شکل: کله چې الکترو مقناطیسي وړانګې په یوه ماده ولګیږي نو دهغې داتومونو سره دغبرګون په پایله کې د بېلګه په ډول لکه **جذب کیدل او انعکاس کیدل** خپل لومړنی شدت دلاسه ورکوي. په نوموړي شکل کې د ګاما وړانګې دڅلورو برخو او یو برابر پنډې مادې څخه تیرېږي. په هره یوه برخه کې دورانګو نسبي تیریدنه یا ترا نسېسیون ($Transmission = 7/10$) اوه پر لس 7/10 قیمت لري. دپام وړخو داده چې دورانګود لوموړني شدت څخه یوازې پینځه ویښت په سلوکې 25% پاتې کیږي او پینځه او یا په سلو کې 75% دماډې څخه پخپله جذب او یا انعکاس کیږي.



انرژي په کیلوولت یا میگا ولت	اوبه کثافت یې $1,0 \text{ g/cm}^2$	پخي خښتې کثافت یې $1,6 \text{ g/cm}^2$	کانکرېټ کثافت یې $2,4 \text{ g/cm}^2$	اوسپنه کثافت یې $7,8 \text{ g/cm}^2$	سرب کثافت یې $11,3 \text{ g/cm}^2$
50 kV	9	5	4	1	
100kV	17	12	11	3	
200kV	24	20	19	10	1
300kV	28	24	23	17	4
Ir-192	35	36	35	35	15
I-131	36	37	36	36	16
Cs-137	39	40	40	42	23
Co-60	50	51	51	54	44
Ra-226	57	58	58	60	53
10 MeV	90	90	85	75	67
20MeV	105	105	100	84	68

۱۶- جدول: د ځینوموادو لپاره د لسم ارزښت پندوالی ($Z = \text{TVL} \times \rho$) اندازه په واحد گرام پرسانتی متر مربع g/cm^2 د اکسریز او رادیو اکتیو عنصر ودانرژي په تابع سره ښودل شوي ده.


د لسم ارزښت شمیرنه:

د بیلګې په ډول که وغواړو چې د سل کیلو ولته 100 kV اکسریز یوې طبی آلې وړانګې د پخو خښتو دیوه دیوال په جوړولو سره دومره کمزورې شي چې دنوموړې آلې یوازې لسمه برخه وړانګې ورڅخه تیرې شي نو ددې موخې لپاره د پخو خښتو دیوال پندوالی په لاندې ډول سره محاسبه کولای شو.

لسم ارزښت پندوالی په واحد د سانتی متر یا $\text{TVL}(\text{cm})$
 لسم ارزښت پندوالی په واحد د گرام په سانتی متر مربع یا $Z (\text{g/cm}^2)$
 د مادي کثافت په واحد گرام پر متر مکعب یا $\rho (\text{g/cm}^3)$
 لسم ارزښت پندوالی په واحد سانتی متر = لسم ارزښت پندوالی په واحد د گرام پر سانتی متر مربع
 تقسیم په کثافت دهمغې مادي په واحد گرام پر سانتی متر مکعب $\text{TVL} (\text{cm}) = Z(\text{g/cm}^2) / \rho(\text{g/cm}^3)$
 دپورتنی جدول له مخې د سل کیلو ولته انرژي لپاره د پخي خښتې کثافت $\rho = 1,6 \text{ g/cm}^2$ او $Z = 12 \text{ g/cm}^2$ دی نو د پخي خښتو لسم ارزښت پندوالی اندازه مساوي ده له:

$$\text{TVL} = \frac{12 \text{ g/cm}^2}{1,6 \text{ g/cm}^3} = 7,5 \text{ cm}$$


* **ځواب:** اوه نیم سانتی متره پخي خښتې او یا څلورنیم سانتی متره دکانکرېټ پند دیوال ته اړتیا ده تر څو د نوموړې آلې یوازې لسمه برخه وړانګې ورڅخه تیرې شي.



دپام وړ : مايکروڅپې (Microwave) دالکترومقناطیسي وړانگو یوه برخه تشکیلوي اوفریکونسي يې د یو گیگا حرخ 1 GHz څخه تر دری سوه گیگا حرخ 300 GHz پورې رسیږي. دمایکروڅپوڅخه په ورځني ژوند کې ګټه پورته کیږي لکه مايکروڅپو بخاری Microwave oven . کله چې مايکروڅپې ديوې مادې لکه دودۍ، غوښه، اوبوانورو خوراکي شيانو څخه تیريږي نو د نوموړو موادو ماليکولونه انرژي ترلاسه کوي او په پایله کې تو دیږي. څرنګه چې ډیرمواد شته دي چې ماليکولونه يې بریښنايز دوه قطبه لري د بیلګې په ډول لکه داوبوماليکولونه چې ماليکول يې یو مثبت اویو منفي بریښنايز قطب لري نوله دې کبله د مايکروڅپو په متناوب الکترومقناطیسي ساحه کې په څرخیدلو Rotation پیل کوي او دګاونډيو ماليکولوسره میخانیکي ټکر کوي او هغوی هم په حرکت راولي. په پایله کې میخانیکي انرژي په حرارتي انرژي اوړي. د روغتیا په تړاو دمایکروڅپوناورو اغیزوو په اړوند دمسلكي پوهانوترمنځ توپیر لرونکي نظرونه شته دي. ځینې څیړنې په ډاګه کوي چې دموبایل تلیفون هم ناوړه اغیزې لري. خو څرنګه چې مايکروڅپو انرژي دومره لوړه نه ده چې په یوه حجره (ژونکه) کې داتومونو او یا ماليکولونوڅخه الکترونه راوباسي نوداسې اټکل کیږي چې په دې اړه کې کوم بدلون نه شي راوستلای او له دې کبله د سرطان ناروغۍ سبب(لامل) کیدلای نه شي. که ومنو چې دتیت فريکونسي په ساحه کې لکه موبایل تلیفون فريکونسي ډیرش هرخ 3×10^1 قیمت ولري نود څپو اوږدوالی يې 10^7 m متره کیږي او انرژي يې مساوي ده له: $1,24 \times 10^{-13}$ eV

پوښتنې (Questions):

- ۱-۶ ديوې مادې سره دورانګوهغه غبرګونونه په ګوته کړی چې دماډې سره دلګیدوپه پایله کې دانرژي جذب کیدلو سبب(لامل) ګرځي.
- ۲-۶ کله چې وړانګې دلسم ارزښت پندوالی څه تیرې شي نوڅومره برخه يې تیريږي او څومره برخه يې په ماده کې پاتې کیږي؟
- ۳-۶ جدول له مخې د کوبالټ تیراپې دستگاه لپاره په خپل وار سره لسم ارزښت پندوالی د اوبو، پخې خښتې اوکنکریټ لپاره تر لاسه کړی.
- ۴-۶ په یوه ماده کې دورانګو جذب کیدلو فزیکي کړنلارې ددغې مادې دکوموخواصو سره تړاوتلري؟
- ۵-۶ دفتو اغیزه دناروغیو په تشخیص کې چې داکسریزآلي په مرسته سره ترسره کیږي څومره اوولي اړین رول لري؟



اووم څپرکی

کلینیکي ډوزیمټري (Clinical Dosimetry)

ډوز (Dose)

ډېوز کلمه د لومړي ځل لپاره د څوارلسمې پېړۍ په اخیره لسیزه کې د د واګا نوډیوې ټا کلي اندازې یانې کچې د خوړلو په موخه د پاراسېلزیوس (Paracelsius) یو جرمنی بیوکیمیاپوه له خوا په کار و اچول شوه. نن ورځ په فارماسي کې ډېوز کمیت د دواګانو اندازه په ګرام سره راښيي. نوموړي کارپوه په بدن کې د عنصر واهمیت د میتابولیزم اود روغتیا په تړاو د هغوی ټاکلې اهمیت وڅیړلو او په اخیر کې یې یوه نامتو پوهنیزه جمله ولیکله چې نن ورځ هم د عام وګړو په خبرو کې کارول کېږي:


➤ (هر یو شی چې دخپلې اندازې نه زیات شي بدن لپاره ډېر دی) دغه مفهوم د لاتین په ژبه په هغه وخت کې داسې لیکل شوی وو.

(Fazit Dosis Venenum)

د پاراسېلزیوس علمي څیړنې څو کاله وروسته د تجربو په اساس په ثبوت ورسیدلې او له دې کبله تر نن ورځې پورې په نړیواله کچه د پوهانو تر منځ منل شوې دي. داپه دې مانا چې که هر څوک دخپل بدن د اړتیا نه ډیر خوراک، څښاک وکړي او یا دواګانې راو نیسي نو د ناروغیو د پیدا کیدلو امکانات ورسره سم سیخ زیاتېږي. د بېلګه په ډول که څه هم د روغتیا لپاره د ویتامینو (Vitamines) خوړل ګټور ګڼل کېږي خو که دورځنې اړتیا ورسره د کچې څخه واورې نو بیا بدن لپاره د ګټې پر ځای زیان رسوي. همدې ته ورته بېلګه دایونایز کوونکو وړانګو د اندازې خطر ډېوز سره سم سیخ د یادونې وړ دی. هر څومره چې دورانګو اندازه په چاپېریال کې په طبیعي وړانګو برسيره نوره هم ډیرېږي او که په ډیره لږ اندازه هم وي په هماغه کچه د انسان روغتیا ته د زیان پېښیدلو احتمال هم زیات اټکل کېږي.

ایون ډوز (Exposure = Ion dose = I)

ایون ډوز د ساینس پوهنې په څانګه او په تیره بیا په رادیوفزیک کې د الکترومقناطیسي وړانګو هغې اندازې او یا شدت ته وايي چې د هوا د مالیکولوسره د غبرګون په پایله کې یو ډول یانې منفي او یا مثبت بریښنا یز چارجونه منځ ته راولي.



ددې لپاره چې دروغتیا په تراو دایونایز کوونکو وړانگو ناوړه اغیزې وڅیړو نو د نوموړې موخې لپاره دایون دوز فزیکي کمیت تعریف ته اړتیا پیدا شوه.

دایون دوز تعریف :

ایون دوز I = په یوه کیلوگرام Δm هوا کې دیوډول یانې مثبت تولواو یامنفې تولو پیداشووايونو بریښنايز چارج ΔQ اندازې ته ویل کیږی

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta m}$$

I = ایون دوز یا دایونو اندازه

ΔQ = د بریښنايز چارج توپیر یا تفاضل

Δm = د کتلې یوه کوچنۍ برخه یا تفاضل (توپیر)

دایون دوز واحد:

کولومب تقسیم په یو کیلوگرام هوا

$$\text{Coulomb/Kilogramm} = 1\text{C/Kg}$$


دکتلې په ځای کولای شو چې د هوا کثافت ρ او حجم ΔV هم ولیکو نو دایون دوز لپاره لیکلای شو چې:

$$\frac{\Delta Q}{\Delta m} = \frac{\Delta Q}{\rho \Delta V} = I$$

درونټګن واحد (Roentgen unit = R)

دایون دوز پخوانۍ واحد رونتګن نومیده. یو رونتګن ډاکسریز آلې هغه کچه ایون دوز ته وايي چې په یوه سانتي متر مکعب وچه هوا ($\rho=1,293\text{mg/cm}^3$) اوتر عادي شرطونو یانې دسا نتي ګراد صفر درجه (0°) اودیوتخنيکي اتموسفیر فشار (1013 mbar) لاندې ټاکلي شمیر جوړه مثبت ایونواوالکترونو (Ionpairs) یوالکتروستاتیک چارج واحد (electrostatic units= esu) منځ ته راوړي. یو الکترو ستاتیک واحد دې څه دوه ملیارده مثبت او منفي جوړه ایونو ($2,082 \times 10^9$ Ionpairs) سره مساوي دي. درونتګن او دنریوال واحد SI تر منځ اړیکې په لاندې ډول لاس ته راوړلای شو. دنوموړې موخې لپاره یو الکترو ستاتیک چارج واحد د یوګرام هوا په وزن باندې ویشو.

☑ په بیالوژیکي دوزیمتری کې پخوا درونتګن واحد څخه کار اخیستلو. د بیلګې په ډول که ډډن پوستکي ته په یوه وار څلورسوه شل رونتګن (Erythem dose = 420 roentgen) ورسیري نو پوستکۍ سور کیږي. دورانګو دغه ډول کلینیکي اغیزه د انرژي دوز واحد په توګه ټاکل شوېوه.




$$1 R = \frac{1 \text{ esE}}{0,001293 \text{ g (Luft)}} = \frac{2,082 \cdot 10^9 \text{ (Ionenpaare)}}{0,001293 \text{ g (Luft)}} \cdot \frac{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}}{\text{(Ionenpaar)}} = 2,58 \cdot 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{kg}}$$

$$R = 2,58 \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{Kg}}$$

کله چې دپا سنی معادلي څخه یو کولومب په رونتگن وړوونو یو کولومب پر کیلوگرام له 3876 R رونتگن سره مساوي ده.

$$1 \text{ C/Kg} = 3876 \text{ R}$$

کله چې د $6,24 \times 10^{18}$ ایونو بریښنا یز چارج سره جمع کړو نو یو کولومب C ورڅخه لاس ته راځي.




۴۲- شکل: کله چې یو رونتگن وړانگې په یو سانتي متر مکعب وچه هوا کې ورننځي چې کثافت یې په عادي فشار او تودوخې کې (0,001293 gram standard temperature and pressure)، نو هلته لږڅه دوه ملیارده ($2,08 \times 10^9$ ionpairs) جوړه ایونونه منځ ته راولي (37).

په یوه کیلوگرام وچه هوا کې د پیداشو وچار جونوتوله اندازه مساوي ده له: $2,58 \times 10^{-4} \text{ C/Kg}$

دبریښنا جریان قدرت

کله چې په هوا کې دبریښنا جریان I د هوا په کتله m_{air} او وخت t سره ویشو نو د بریښنا جریان قدرت J لاس ته راځي چې واحد یې کولومب C تقسیم په کیلو گرام kg او ثانیه (second = s) ټاکل شوی دی.




$$J = \frac{dI}{m_{air} \times dt} = \left[\frac{C}{Kg \times s} \right]$$

دایون دوز اندازه کول:

په ۴۳ شکل کې ښودل شوی ده چې د یوې ایونایزیشن چمبر (Ionization chamber) په مرسته سره چې یوه فزیکي آله ده د نوموړو الکترونو بریښنایز چارجونه یا بریښنایز جریان اندازه کولای شو.


ایونایزیشن چمبر د یوه لوبښي څخه جوړه ده چې دوه الکتروده لري اود خاڅن په نامه سره یادېږي. د خاڅن یوه الکتروده بټرۍ مثبت او بله یې دمنفي قطب سره تړلې ده. کله چې داکسیریز آلې څخه وړانګې راوړي او بیا چمبر ته ور ننوځي او هلته هوا یا یو بل غازي نو دغه وړانګې په دې هوا یا غاز کې ایونایزیشن کړنلاره تر سره کوي. په پایله کې الکترونه مثبت قطب ته او مثبت ایونونه دمنفي قطب خواته خوځيږي. په دې چمبر کې دبريښنا جریان د یوه امپیر مېټر په مرسته سره اندازه کېږي. هر څومره چې د ایونایزیشن درجه یا د بریښنا شدت زیات وي په هماغه کچه د وړانګو غبرګون د هوا یاد نسجونو داتومونو سره هم ډیروي .

۴۳- شکل: دایونایزیشن چمبر (Ionization Chamber) جوړښت چې د یوې رادیو اکتیوسر چینی، یو خاڅن، یوې بټرۍ او یو امپیر متر نه جوړه ده راښيي. د هوا نایتروجن یو مالیکول N_2 د وړانګوسره غبرګون کوي او په پایله کې یو الکترون e^- او د نایتروجن یو مثبت ایون N^+ منځ ته راځي چې د چارج یوې جوړې (Ion pairs) په نامه سره یادېږي (35).



Quelle: Informationskreis KernEnergie

په ۴۳-شکل کې دایون دوزبريښنایز چارجونو اندازه کولولوبښي یاآله (Ionization Chamber) سرکېټ (Circuit) ښودل شوی دی (34). د یوې رادیو اکتیو سرچینې څخه وړانګې خپریږي او د هوا نایتروجن مالیکول N_2 په یوه مثبت ایون N_2^+ او الکترون e^- ایونایز کوي. نوموړي چارجونه د جوړه چارجونو (Ionpairs) په نامه سره یادېږي.




په ۴۴- شکل کې دایون ډوز داندازه کولوکړنلاره بنودل شوې ده چې په روغتون کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. د اکسریز آلې (X-ray tube)، یو امپیرمتر Ampermeter اود ناروغ د بدن په ساره پرې شوې سطحه (cross section) را ښيي.

کله چې داکسریز آلې څخه وړانګې راوځي نو په لاره کې لومړۍ دهوا داتومونو سره لګیږي او بیا د ناروغ بدن ته ور ننوځي. نوموړې وړانګې په هوا او هم په نسجونو کې یوه برخه انرژي دلایسه ورکوي چې په پایله کې دهغوی اتومونه ایونایزکوي یانې الکترونه ورڅخه راوباسي.

	داکسریز آلې (X-ray tube) څخه وړانګې راوځي او سم سیخ د ناروغ بدن په رڼا کیږي.
	Ampermeter امپیرمتر دایون ډوز اندازه کوي. د بېلګه په ډول په یوه کیلوګرام هوا کې دټول مثبت او یا منفي چارجونو اندازه په واحد د یو کولومب پر کیلوګرام C/kg
	Patient دناروغ په بدن کې جذب شوې انرژي لکه یوارد rd یا نی یو سانتي ګري د امپیرمتر په مرسته سره اندازه کیږي.

۴۴- شکل: په نوموړي شکل کې د ایون ډوز تعریف د یوې تجربې په بنسټ بنودل شوی دی. د شکل پورتنۍ برخه د اکسریز سرچینه او په منځ کې امپیرمتر او په لاندې برخه کې دناروغ د بدن په ساره (cross section) پرې شوې سطحه راښيي (9).

په هوا کې یو رونتګن اکسریز ډلر څه یو سانتي ګري انرژي سره برابره ده ($1 R = 0,89 \text{ cGy}$)



انرژي ډوز (Energy Dose = D)

ايون ډوزيو داسې فزیکي کمیت دی چې دورانگو بیالوژیکي اوفزیکي ناوړه اغیزو او غبرگون په اړوند مالومات نه شي تر لاسه کیدای. نوله دې کبله ددې اړتیا پیدا شوه چې یو نوی فزیکي کمیت یا نې انرژي ډوز تعریف تر سره شي ترڅو دورانگونوموړي اغیزې هم په پام کې ونیول شي.

دانرژي ډوز تعریف:

کله چې ایونایز کوونکي وړانګې د یوې مادې سره غبرګون وکړي نو په پایله کې خپله ټوله او یا یوه برخه انرژي دغې مادې ته انتقال کوي (لیردوي) چې بیا هلته په ماده کې جذب کیږي. دنوموړو وړانګو هغه برخه انرژي چې په واحد دکتله کې جذب شوې وي د انرژي ډوز (Absorbed Dose) په نامه سره یادېږي.

که د رڼا شوي مادې کتله په m او حجم یې په V او کثافت یې په ρ سره وښیو نو د انرژي ډوز D تعریف په لاندې ډول سره کولای شو.

د انرژي ډوز D مساوي ده له : انرژي تفاضل (توپیر) dE تقسیم د کتلې په تفاضل (توپیر) dm .

$$D = \frac{dE}{dm} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{dE}{dV}$$

D = انرژي ډوز یا اندازه

dE = یوې مادې ته انتقال شوي یا جذب شوي انرژي برخه یا تفاضل (توپیر)


ρ = د همغې مادې کثافت

dV = د مادې حجم توپیر یا تفاضل (توپیر) یا د حجم یوه کوچنۍ برخه

dm = د کتلې توپیر (تفاضل) یا د کتلې یوه کوچنۍ برخه

*

پوښتنه : څرنگه چې تجربو ښودلې ده چې په هوا کې د یوه ایون دلا س ته راوړلو لپاره لږ څه څلوردیرش ولټه انرژي 34 eV او په یوه بیالوژیکي ماده لکه دنسجونو په یوه حجره (ژونکه) کې دیو مالېکول د ایونایزیشن لپاره لږ څه شپېته الکترون ولټ انرژي (60 eV) په کار ده. نو که چیرته یو سړی چې وزن یې اویا کیلو گرامه 70 Kg وي او ټول جسم ته یې په متجانس ډول دطبیعي وړانګو په کچه یانې لږ څه دوه نیم ملي گري انرژي ډوز $2,5 \text{ mGy}$ ورسیري نو د تولید شوو ایو نو شمیر یې په هوا او په نسجونو کې مالوم کړی؟.



* **حل:** څرنگه چې د بریښنا یز انرژي او د میخانیکي انرژي تر منځ لاندنۍ اړیکې شته دي

$$1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{J}$$

نود هواد یوه ایون د تولید لپاره بریښنا یز انرژي په میخانیکي انرژي اړوو.

$$34 \text{ eV} = 34 \times 1,6 \times 10^{-19} \text{J} = 54,4 \times 10^{-19} \text{J}$$

د تعریف سره سم یو گري Gray عبارت دی له: یو جول تقسیم په یو کیلو گرام کتله تجربو بنودلې ده چې په یوه کیلو گرام نسجونو کې دوه نیم ملي گري په واسطه د پیدا شوو ایون شمیر مساوي ده له:

$$2,5 \text{ mGy} = \frac{2,5 \times 10^{-3} \text{ J}}{\text{Kg}} = \frac{2,5 \times 10^{-3} \text{ J}}{54,4 \times 10^{-19} \text{ J}} = 4,5 \times 10^{14} \text{ ions / Kg}$$

* **ځواب:** په یوه کیلو گرام هوا کې د ایونو شمیر لږ څه څلور نیم سوه بلیار دو ته رسیږي. او په یوه کیلو گرام نسجونو کې د ایونو شمیر مساوي دی له:

$$2,5 \text{ mGy} = \frac{2,5 \times 10^{-3} \text{ J}}{\text{Kg}} = \frac{2,5 \times 10^{-3} \text{ J}}{60 \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}} = 2,6 \times 10^{14} \text{ ions / Kg}$$


* **ځواب:** لږ څه دوه نیم سوه بلیار ده ایونونه په یوه کیلو گرام نسجونو کې منځ ته راځي.

څرنگه چې یو نورمال سړي لږ څه اویا 70 kg کیلو گرام وزن لري نو په یوه کال کې د طبیعي وړانگو د غبرگون په پایله کې چې قیمت یې دوه نیم ملي گري 2,5 mGy دی لږ څه یو سلو اتیا ملیارده یانې $70 \times 2,6 \times 10^{14} = 182 \times 10^{14} \text{ ions}$ ایونونه تولید کیږي.


د انرژي ډوز واحد:

که چیرته د ایونایز کونکو وړانگو یو جولول (Joule = J) انرژي په یوه کیلو گرام (Kg) نسجونو او یا بله ماده کې جذب شي نو دغه فزیکي کمیت او یا جذب شوې انرژي ته د انرژي ډوز هم او یا د انرژي اندازه ویل کیږي (absorbed Dose). د تعریف سره سم یو جول تقسیم په یو کیلو گرام دیو گري Gray (= Gy) سره مساوي ده. یو گري د انرژي واحد دی چې دیو سویډني رادیولوژ پوه په ویاړ سره چې گري Gray نو میډه ټاکل شوی دی.

د انرژي ډوز پخوانی واحد راد (radiation absorbed dose = rad) نومېږي او یو راد د گري سلمه برخه ده یانې (100 rd = 1Gy).



د یو گري Gray فزیکي کمیت تعریف :

 * دیوې رادیو اکتیو سرچینې څخه وړانګې خپرېږي او په یوه کیلو ګرام کتله کې یوژول انرژي جذب کیږي.	* په هوا کې دیوه جوړه چارج د پیدا کولو لپاره څلور دیرش الکترون ولټ 34 eV انرژي په کار ده. * څرنګه چې د کولومب او کیلو ګرام حاصل تقسیم 1C/kg دا مانا ورکوي چې څومره جوړه چارجونه په یوه کیلو ګرام هوا کې پیدا شوي نو نوموړي قیمت څخه په هوا کې دانرژي ډوز لاس ته راتلای شي یو گري : یوژول انرژي تقسیم پر یو کیلو ګرام کتلي سره مساوي ده


یو گري = یو جول تقسیم په یو کیلو ګرام کتله
یو گري = سل راد = سل سانتي گري = زر ملي گري

اویا :

$$\begin{aligned}
 1\text{Gy} &= 1\text{Joule}/1\text{ Kilogramm} = 1\text{J}/1\text{Kg} = 1\text{As}/\text{Kg} = 100\text{ rad} \\
 1\text{Gy} &= 100\text{ cGy} = 1000\text{ mGy} \\
 1\text{ rad} &= 0,01\text{ J/Kg} = 0,01\text{ Gy} = 10\text{ mGy} \\
 1\text{rad} &= 1\text{ cGy}
 \end{aligned}$$

د گري کوچني واحدونه د نړیوال واحد سیستم SI په بنسټ عبارت دي له: سانتي گري cGy، ملي گري mGy، میکرو گري μGy او نانو گري nGy. سل سانتي گري 1Gy = 100cGy دیو گري او زر ملي گري 1Gy = 100mGy دیو گري سره مساوي دي او داسې نور.

- ☑ که څوک یو کیلو ګرام کتله لس سانتي متره دځمکې مخ نه پورته کړي نو یوژول انرژي تر سره کوي.
- ☑ یوژول هغومره کار دی چې دیونیوټن قوې په واسطه سرته رسېږي او یو شي تر یو مترواټن پورې خوځوي
- ☑ یوژول هغومره کار دی چې دیوه واټ په اندازه قدرت تولید کړي او یوه ثانیه پایښت ولري.



ایون دوزیه انرژي دوزاپول:

څرنگه چې انرژي دوز سم سیخ نه شي اندازه کېدلای او دتجربو له مخې یوازې ایون دوز اندازه کیدای شي خو د یوه بدلونکي فکتور ($f = \text{conversion factor}$) په مرسته سره موږ کولای شو چې انرژي دوز او ایون دوز یو پر بل واړوو. د نوموړي فکتور قیمت دوزانگو په ډول، دوزانگو په انرژي اود مادي په جوړښت پورې اړه لري نوله دې کبله د نسجونو، هډوکو او عضلاتو لپاره ځانگړی قیمت لري. د بدلونکي فکتور f واحد سانتي گري په رونتگن دی (cGy/R). د بېلگه په ډول دهوا لپاره دغه ضریب $f = 0,87 \text{ cGy/R}$ قیمت لري.

انرژي دوز = بدلونکي ضریب $\times$ ایون دوز

$$D(\text{cGy}) = f(\text{cGy} / R) \times I(R)$$


په هوا کې دانرژي دوز مساوي ده له:

$$D_{\text{air}} = 0,87 \times I$$

دلته انرژي دوز D په واحد د سانتي گري او ایون دوز I په واحد د رونتگن R ټاکل شونده.


هډوکي	د بدن غړي	اوبه	هوا	دوزانگو انرژي په واحد keV
4,2	0,93	0,88	0,87	50 KeV
3,6	0,92	0,89	0,87	100 KeV
2,3	0,94	0,92	0,87	150 KeV
1,0	0,96	0,96	0,87	Co-60
0,9	0,96	0,96	0,87	Cs-137

۱۷- جدول کې د اړوونکي فکتور f (cGy/R) قیمتونه چې واحد یې سانتي گري په رونتگن ټاکل شوی دی د هوا، اوبو، د بدن غړو او هډوکو لپاره شودل شويدي. دپورتنی جدول او د ۴۵ شکل څخه څرگندیږي چې دټیټې انرژي په ساحه اوبه هډوکو کې لکه پښخوس کیلو الکترون ولته (50 keV) دجذب شوې انرژي دوز قیمت دکوبالټ (Co-60) په پرتله لږڅه څلورواړه ډیردی. همدا لامل دی چې دناروغیوپه تشخیص کې هډوکي ډیره انرژي جذب کوي اودلیللو وړگرځي. ددوه سوه کیلو الکترون ولته څخه پورته دجذب شوې انرژي کچه د اوبو(نسجونو) او عضلاتولپاره لږڅه یوشان ده، خو په هډوکو کې ډیره لږجذب کیږي. داپه دې مانا چې دناروغیودتشخیص لپاره لوړ انرژي اکسریزگټه نه لري.



Conversion from Exposure to Absorbed Dose

257



۴۵- شکل: دکتلي انرژي جذب ضريب (μ_{en}/ρ = Mass energy absorption coefficient) د هوا، هډوکو (Bone) او وازدي (Fat) لپاره د اکسريز انرژي په تابع سره بنودل شوی دی (15).

پوښتنه: کله چې د سل کيلو الکترون ولټه (100 keV) اکسريز آلې څخه وړانګې خپرې شي او په هوا او هډوکو کې يو رونتګن جذب شي نود نوموړي جدول له مخې ديو رونتګن انرژي کچه مالومه کړی؟



حل: دانرژي پوز د لاس ته راوړلو لپاره دلاندني فرمول څخه کار اخلو. *

اړوونکی فکتور f (cGy/R) $\times$ دايون پوز په واحد رونتګن $R =$ انرژي پوز D په واحد سانتي ګري

په يوه ګرام هوا کې د يورونتګن انرژي کچه: $D = 0,87 \text{ cGy/R} \times 1R \approx 0,87 \text{ cGy}$

په يوه ګرام هډوکو کې د يو رونتګن انرژي کچه: $D = 3,6 \text{ cGy/R} \times 1R \approx 3,6 \text{ cGy}$

دپورتني جدول له مخې په هډوکو کې ديو رونتګن وړانګو انرژي د هوا په پرتله لږ څه د ری نیم سانتي ګري لوړ قيمت لري. همدا لامل دی چې داکسريز په عکسونو کې د هډوکو اناتومي بڼه سپينه او جوته ليدل کيږي داځکه چې په هډوکو کې دفوټواغيزه دهوا په پرتله لږ څه درى ځله ډيره پيښيږي. نو له دې کبله د هوا برخه توررنگ لري. داپه دې مانا چې دهوا ماليکولوسره داکسريز وړانګې ډير لږ غبرګون کوي او مخامخ تيريږي.



۴۶ - شکل: یورونتگن ایون دوز د یوه فکتور په مرسته سره په انرژي دوز او معادل دوز سره اړولای شو. د بېلگه په ډول په نسجونو کې د یو رونتگن بیالوژیکي اغیزې په پایله کې لږڅه لس ملي سیورت انرژي او همدارنګه لس ملي سیورت معادل دوز جذب کیږي (37).

د انرژي دوز قدرت (Absorbed dose rate = $\dot{D}$)

تعریف:

دورانګودانرژي دوز قدرت = د انرژي دوزتفاضل (توپیر) dD تقسیم په تفاضل (توپیر) دوخت dt

$$\dot{D} = \frac{dD}{dt}$$

Dose rate = absorbed Dose/ radiation time

$\dot{D}$ = دورانګو دانرژي دوز قدرت

dt = دوخت تفاضل (توپیر) یا توپیر

dD = دانرژي دوزتفاضل (توپیر) یا توپیر


د پورتنۍ معادلې څخه دورانګودانرژي دوز اود وړانګو دخپريدلوموده یا وخت په لاندې ډول تر لاسه کولای شو:

absorbed Dose = (Dose rate) $\times$ (radiation time)

د انرژي دوز = دانرژي دوز قدرت $\times$ وخت

Radiation time = absorbed Dose/ Dose rate

دورانګودخپريدلوموده = دانرژي دوز تقسیم په انرژي دوز قدرت



* **پوښتنه:** ديوې هستوي بټۍ په چاپيريال کې تل راديواکتيو مواد ازادکيږي اودشاوخوا اوسيدونکو لپاره دخطر احتمال شته دی. دچاپيريال هغه اعظمي (تر ټولو لوړ) ډوز قدرت کچه معلومه کړئ ترڅو دعام وگړو لپاره دراديوکټيف وړانگوډوز نور داندېښني وړنه وي اوپه کال کې ديوملی سيورت نه وانه وږي؟

* **حل:** د انرژي ډوز قدرت = کلنی لوړ ډوز تقسيم په وخت

دعام وگړو لپاره دوخت موده چې پرلپسې وړانگې ورته رسيږي د نړيوال کميسيون (ICRP) ريفرينس يانې د سپارښتنې وړ (Reference) قيمت يوسلوا ته شپيته ساعته په يوه اونۍ کې (168 h/week) او د اغيزمن ډوز لور لېميت په يوه کال کې يو ملي سيورت 1mSv ټاکل شوی دی. داسانتيا لپاره دلته يوکال په پنځوس اونۍ باندې شميرل کيږي.

$$\frac{1\text{mSv}}{168\text{ h} \times 50\text{weeks}} = 0,12\mu\text{ Sv / h} = \text{دډوز قدرت}$$


* **ځواب:** دهستوي بټۍ دراديواکتيو غاز ډوز قدرت د صفرعشاريه دولس ما يکروسیورت په ساعت کې وانه وږي.

که چيرته د گاما وانگو يوه سرچينه تر نظر لاندې ونيسو نو دورانگودانرژي ډوزقدرت يې دراديواکتيويتي A سره سم سيخ او دواتن r د مربع سره معکوسا اړيکې لري چې په لاندې ډول يې ليکلای شو.

$$D \cdot = \frac{dD}{dt} = \Gamma \times \frac{A}{r^2}$$


- ☑ $A =$ دراديو اکتیو سر چينې راديو اکتیوي (واحدې: بيکارېل Bq).
- ☑ $D \cdot = \frac{dD}{dt}$ = دورانگو دانرژي ډوزقدرت فزيکي تعريف دی چې واحد يې :
گرې په دقيقه Gy/min يا گرې په ساعت Gy/h ټاکل شوی.
- ☑ $\Gamma =$ د گاما توري دی چې د فوتون وړانگو او دهر يوه راديواکتيو عنصر لپاره ځانگړی د تناسب ثابت ضريب دی (واحدې: گرې ضرب مترمربع تقسيم په بيکارېل ضرب ساعت Hour
h = او يا په بل عبارت (Gy. m²/ h.Bq)
- ☑ $r =$ هغه واتن دی چې دورانگو سرچينې څخه تريوه ټاکلي ټکي اويا مطلوب ځای پورې اوږدوالي لري (واحد يې مترټاکل شوی).

په ۱۸- جدول کې دځينو راديو اکتيو عنصر و لپاره دگاما ثابت Γ قيمتونه ليکل شوي دي.




رادیو اکتیو منبع نوم	دگاما ثابت Γ in $\frac{\text{Gy} \cdot \text{m}^2}{\text{h} \cdot \text{Bq}}$	دگاما ثابت په واحد دملي سیورت Γ_H $\text{mSv} \cdot \text{m}^2/\text{GBq} \cdot \text{h}$
Co-60	$3,5 \cdot 10^{-13}$	0,35
I-131	$5,9 \cdot 10^{-14}$	0,059
Cs-137	$8,4 \cdot 10^{-14}$	0,088


۱۸- جدول: په یوه متر واټن او یوه ساعت کې د یوگیا بېکارېل اکتیویتی ځینو رادیو اکتیو سرچینو د گاما ثابت قیمت Γ_H په واحد دملي سیورت او یا د گاما ثابت قیمت Γ په واحد دگری



د یوې رادیو اکتیو سرچینې څخه چې اکتیویتی یې یو ملیون بېکارېل دی وړانګې خپریږي او په لاس کې جذب کیږي. دنوموړې سرچینې ددوز قدرت په یوه ساعت کې لږ څه یو مایکروسیورت نه اوږي (34)




۴۷- شکل: دورانګود دوز قدرت د واټن د مربع سره معکوس متناسب دی. د بېلګه په ډول که درادیو اکتیو سرچینې څخه په پنځوس سانتي متر واټن کې ددوز قدرت څلور سانتي گري وي نو په سل سانتي مترواټن کې یو سانتي گري ته کمښت مومي. دواټن په تابع سره د ددوز کمښت د هندسي سطحې په توګه هم ښودل شوی دی (51).



دېوز سطحې حاصل ضرب (Dose area product)

په ۴۷ شکل کې بنودل شوي ده چې د سطحې او د انرژي ډوز حاصل ضرب ثابت پاتې کېږي. دا ځکه چې دواړه د اوږدېدلو سره سم د سطحې قیمت ډېرېږي او دهغې سره سم (جوخت) دېوز قیمت کمېږي. نوموړي فزیکي کمیت ته دېوز سطحې حاصل ضرب وايي



۴۷ الف شکل: دېوز انګود دېوز شدت $I = \text{Intensity}$ دواړه د مربع سره معکوس متناسب دي

د انرژي ډوز قدرت واحد:

د انرژي ډوز قدرت واحد یوګري پر ثانیه 1Gy/s او یا یوګري په دقیقه 1Gy/min دی.


* **پوښتنه:** په یوه روغتون کې د کوبالت یو رادیو تیراپي سرچینې اکتیویټي $3.7 \cdot 10^{15} \text{ Bq}$ سره مساوی ده. د نوموړې سرچینې دېوز انګود د قدرت په پینځه متره واټن کې څومره قیمت لري.

* **حل:** کله چې د ۱۸- جدول څخه د کوبالت سرچینې لپاره د ګاما ثابت قیمت Γ راو اخلو نو د ډوز قدرت لپاره لیکلای شو چې:

$$\dot{D} = \frac{3.5 \cdot 10^{-13} \cdot 3.7 \cdot 10^{15} \text{ Gy}}{5^2 \text{ h}} = 51.8 \frac{\text{Gy}}{\text{h}}$$

* **ځواب:** د کوبالت طبي د ستګاه قدرت لږ څه دوه پنځوس ګري په ساعت کې دی.

دپام وړ: نن ورځ د سرطان ناروغیو د درملنې په موخه د کوبالت وړانګو څخه کار نه اخیستل کېږي. دا ځکه چې دیوې خوا یې انرژي لږ ده (1,2MeV) او د بلې خوا یې اکتیویټي د هرو پینځو کالونو څخه نیمایي ته رالویږي. د کوبالت په ځای د خطي تعجیل کوونکي څخه کار اخیستل کېږي چې انرژي یې تر شلومیګا ترون ولټ پورې رسېږي.



👉 **د پام وړ:** دورانگو نه د ځان ساتنې او دخطر داتکلوپه موخه د نوموړې گاما Γ په ځای یوه بل گاما ثابت ضریب یانې Γ_H څخه کار اخیستل کیږي چې واحد یې ملي سیورت ضرب متر مربع تقسیم په گیگا بیکارېل په ساعت $mSv \cdot m^2/GBq \cdot h$ سره اټکل شوی دی.

* **پوښتنه:** دکوبالت یوې سرچینې د اکتیویټي قیمت یو مېگا بیکارېل $1MBq$ او دگاما قیمت یې مساوي ده له $\Gamma_H = 0,35mSv/GBq \cdot h$

په یوه مترواټن کې دنوموړې سرچینې دانرژي قدر ت څومره دی؟

$$\frac{dD}{dt} = \frac{\Gamma_H \times A}{r^2} = \frac{0,35mSv \times 0,001GBq}{1m^2 \times GBq \times h} = 0,35 \times 10^{-6} Sv = 0,35 \mu Sv / h$$

یانې لږڅه صفرعشاریه درې میکرو سیورت ډوز په یوه ساعت او په یوه مترواټن کې دیومیکا کوبالت منبع څخه خپریږي. په همدې ډول سره د ایوډین رادیو اکتیو منبع J-131 لپا ره چې دگاما قیمت یې دکوبالت په پر تله لږڅه کم خو اکتیویټي یې سره یوشان دی انرژي ډوز $D = 0,06 \mu Sv$ په یوه ساعت کې لا س ته راځي. خو که چیرته دتایراید Thyrid ددرملنې په موخه یوه ناروغ ته یو گیگا بیکارېل GBq رادیواکتیو فارماکا یانې دوايي ورکړو نو پخپله ناروغ دیوې رادیو اکتیو منبع حیثیت پیداکوي اودگاما رادیو اکتیو وړانگې دځانه څخه خپروي. نو که فرضاً کوم طبي پرسونل نوموړي ناروغ ته په یوه متر واټن کې ور نږدې شي نوبه هغه ته د پورتنۍ محاسبې په کر نلاره سره شپېته میکروسیورت $60 \mu Sv$ او که نیم متر ورنږدې شي نو به هغه ته دوه سوه څلوېښت میکرو سیورت $240 \mu Sv$ په یوه ساعت کې انرژي ډوز ورسیري. دا ځکه چې دانرژي ډوز د واټن مربع سره معکوساً متناسب ده.

د وړانگو ډوز او دواټن مربع قانون

دورانگو انرژي ډوز D دواټن r د مربع سره معکوساً متناسب ده. که چیرته په ټاکلي واټن r_1 کې د وړانگو انرژي ډوز D_1 او په بل واټن r_2 کې دانرژي ډوز په D_2 سره وېښو نودواټن مربع قانون په لاندې ډول سره لیکلای شو:



دانرژي ډوز D_1 په واټن r_1 تقسیم په انرژي ډوز D_2 په واټن r_2 مساوي ده له واټن r_2 په مربع تقسیم په واټن r_1 په مربع

$$D_1 = D_2 \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2$$

$$r_1 = \sqrt{\frac{D_2 \times r_2^2}{D_1}}$$

$$D_1 \times r_1^2 = D_2 \times r_2^2$$

$$D_1/D_2 = (r_2^2/r_1^2)$$



٤٧ ب شکل: د وړانگو ډوز او دواتن مربع قانون

پوښتنه: د گاما وړانگې یوې رادیواکتیو سرچینې ډوز قدرت په دوه متره واټن او یوه ساعت کې پینځه سوه ملي سیورټ اندازه شوېدی. په کوم واټن کې ددغې سرچینې قدرت پینځه پنځوس ملي سیورټ په ساعت کې کمښت مومي؟

حل: که چیرته دنوموړې سرچینې دډوز قدرت په r_1 واټن کې په D_1 او په r_2 واټن کې په D_2 وښیو نولاندنۍ اړیکې دهغوې ترمنځ موجودې دي.


$$D_1 \times r_1^2 = D_2 \times r_2^2$$

$D_1 = 500 \text{ mSv/h}$; $D_2 = 55 \text{ mSv/h}$; $r_1 = 2 \text{ m}$ نو د واټن r_2 لپاره لرو چې:

$$r_2 = \sqrt{\frac{500}{55} (4)} = 6,0 \text{ m}$$

ځواب: دنوموړې رادیواکتیو سرچینې قدرت په شپږمتر واټن کې پینځه پنځوس ملي سیورټ ته راوړي.


پوښتنه: دپوستکې سرطان یوه ناروغ ته ددرملنې په موخه ورځنۍ انرژي ډوزاندازه دډاکتر له خوا پنځوس گری 50 Gy ټاکل شوې ده. نوموړې ډوزناروغ ته داسې ورکول کیږي چې په یوه ورځ کې دوه سوه سانتي گری 200 cGy قیمت ولري. دناروغ ددرملنې



په موخه د یوې څلورسوه کیلو ولته تېراپي آلې (400 KV) څخه کار اخیستل کیږي چې دانرژي ډوز قدرت یې په یو متر واین او په یوه دقیقه کې یو ګری 1 Gy/min قیمت لري. که چیرته ناروغ د یو متر په ځای په یونیم مترو واین کې ډاکس آلې څخه لیرې د میز پر مخ پروت وي نو مالوم کړئ چې.

۱- څومره وخت په کار دی چې د ناروغ پوستکي ته د درملنې په موخه دوه سوه سانتي ګری په یوه ورځ کې ورکړشي اود درملنې ټوله موده څو ورځې پایښت کوي؟

۲- په یونیم متر واین کې ډاکسریز آلې د انرژي ډوز قدرت څومره کمښت مومي؟



۸- شکل: ډاکسریز آلې په مرسته سره ناروغ ته درونتګن وړانګې ورکول کیږي. نوموړې وړانګې د یوې سرچینې څخه چې د R په توري شول شوي ده راوځي او بیا سم سیخ د ناروغ په بدن باندې لګیږي.

* **حل:** ناروغ ته دورانګو ورکول موده چې د درملنې په موخه دوه سوه سانتي ګری (دوه ګری) په یوه ورځ کې ټاکل شوي ده دلاندني فرمول څخه تر لاسه کوو.

دورانګو ورکول موده t مساوي ده د درملنې ورځنۍ ډوز اندازه تقسیم د ډوز په قدرت

$$\text{time} = \text{applied dose} / \text{dose rate}$$

د وړانګو د ډوز او د واین مربع قانون په اساس لیکلای شو چې:


$$1\text{Gy/min} \times 1\text{m}^2 = D_{1,5\text{m}} \times (1,5\text{ m})^2$$

په یونیم متر کې دانرژي ډوز قدرت $D_{1,5\text{m}}$ مساوي دی له:

$$D_{1,5\text{m}} = 1\text{Gy/min} \times 1\text{m}^2 \times 0,444\text{ m}^{-2} = 0,444\text{ Gy/min}$$

څرنگه چې $200\text{ cGy} = 2\text{ Gy}$ دی نو د وړانګو ورکولو وخت t لپاره لیکلای شو چې:

$$t = 2\text{ Gy} \div 0,444\text{Gy/min} = 4,5\text{ min}$$



* **ځواب :** څلورنيمې دقيقې په کاردي چې دوه گري په يوه ورځ کې نا روغ ته په يونيم متر واټن کې ورکړ شي. څرنگه چې ناروغ ته په يوه ورځ کې دوه گري ټاکل شوي دي نو پينځه ويشت ورځې په کاردي ترڅو هغه ته ددرملنې په موخه بشپړ پنځوس گري ورکړ شي.

معادل ډوز (Equivalent dose = H)

معادل ډوز يو داسې فزيکي کميت دی چې په نسجونو کې د هر ډول ايوناييز کونکو وړانگو بياالوژيکي اغېزې په پام کې نيسي. دا ځکه چې تجربو جوته کړې ده چې په بدن باندې دايوناييز کونکو وړانگو ناوړه اغېزې د نوموړو وړانگو په ډول او هم انرژي پورې اړه لري او سره يوشان نه دي.

د بېلگه په ډول که په بدن کې دنيوترونو، پروتونو، الفا، بېټا او گاما ايوناييز کونکو وړانگو جذب شوي انرژي اندازه سره يوشان هم وټاکل شي خودهغوی بياالوژيکي زيان کچه ديوه بل څخه توپير لري. ددې لپاره چې په نسجونو کې د هر ډول وړانگو او دهغې سره جوخت د انرژي زيان هم په نظر کې ونيول شي نو يو بل فکتور ته اړتيا پيدا شوه چې د کوالټي فکتور يا دورانگو دوزن فکتور يې بولي او په (Quality Factor = Q_R) سره بنوول کيږي. نوموړی فکتور واحد نه لري او داپه پام کې نيسي چې که يوه ناروغ ته د گاما وړانگو په ځای بل ډول وړانگې د بېلگه په ډول لکه الفا وړانگې ورکړ شي نو دمعادل ډوز په مرسته يې د خطر کچه اټکل کولای شو. دمعادل ډوز تعريف په لاندې ډول سره دی.

معادل ډوز (H = Human equivalent dose) په نسجونو کې د انرژي ډوز D_T او د کوالټي فکتور Q_R د حاصل ضرب سره مساوي دی. په دې ځای کې R يوه علامه ده چې دورانگو Radiation = T او Tissue = T لپاره ليکل شوی دی. نو دمعادل ډوز لپاره لکلا شو چې:


$$H_T = Q_R \times D_T$$

دمعادل ډوز واحد:

په داسې حال کې چې د انرژي ډوز واحد په گري Gy سره بنوول کيږي خو دمعادل ډوز واحد د سيورت (Sievert) په نامه سره يادېږي. د نوموړي واحد گټه په دې کې ده چې دورانگو په مقابل کې دلوپانواو کوچنيانو درنا شوو غړو هراړخيز حساسيت ديوې خوا او دهرډول وړانگو توپير لرونکي بياالوژيکي اغېزې دبلې خوا په پام کې نيسي. همدا سبب (لامل) دې چې په ټولو بياالوژيکي موادو او نسجونو کې د وړانگو جذب شوي انرژي د گري واحد Gy په ځای د سيورت په واحد Sv = Sievert سره په کار اچول کيږي.

دمعادل انرژي ډوز يو بل پخوانی واحد هم شته دی چې د ريم (rem) په نامه سره يادېږي او لنډيز يې په لاندې ډول سره دی: (Roentgen equivalent man = rem) اوسل ريم له يو گري سره مساوي دی ($100 \text{ rem} = 1 \text{ Gy}$).


دپام وړ: که يوچاته ډاکسريزدوه سوه سانتي گري (200 cGy) انرژي ډوز ورسپړي، نو بياالوژيکي او کلينيکي اغېزه يې دنيوترون وړانگولس سانتي گري (10 cGy) انرژي ډوز سره يوشان ده.



په ۴۹- شکل کی ښودل شوی ده چې دالفا وړانګې په لږ واټن یانې څو میکرومټرو (μm) کې خپله ټوله انرژي د لاسه ورکوي او له دې کبله یې بیالوژیکي زیان هم زیات دی په داسې حال کې چې دبېتا او ګاما وړانګې همدارنګه په اوږد واټن کې تر سره کوي. دا په دې مانا چې هر څومره زیات ایونونه دورانګود اغیزې په اساس دواټن په واحد کې تولید شي په همغه اندازه یې ددې احتمال هم زیات دی چې د سرطان او یا بله ناروغي منځ ته راشي. ایونایز کوونکې وړانګې هغه وخت ناوړه اغیزې لري چې په رڼا شوي جسم کې یې انرژي جذب شي اوبیا ګڼ شمیر ایونونه اوزاد رادیکال منځ ته راشي.

دالفا ذرو د تګ کرښې Alpha particle tracks	دبېتا ذرو د تګ کرښې Beta particle tracks	دګاما وړانګود تګ کرښې Gamma rays

۴۹- شکل رابښيي چې دالفا (Alpha) دوه ذرې دڅو میکرومټرونو په واټن کې یا په بل عبارت دلږ څه لسو حجرو د لګیدلو څخه وروسته، خپله ټوله انرژي دلاسه ورکوي، او ګڼ شمیر ایونونه تولیدوي، چې د نوموړي شکل په کین اړخ کې په تورو ټکو باندې ښودل شوي دي. دنوموړي شکل په منځنۍ برخه کې دبېتا (Beta) شپږو ذرو څخه یواځې څلور ذرې دنسجونو اتومونو سره غبرګون ښودلئ او څلور ایونونه یې تولید کړيدي. په ښي اړخ کې دګاما وړانګو اغیزه ښودل شوې ده چې یوازې درې ایونونه تولیدوي. دا په دې مانا چې په نسجونو کې دالفا، بېتا او ګاما وړانګو بیالوژیکي او فزیکي اغیزې د یوه بل سره توپیر لري. د بېلګه په ډول دالفا وړانګو د ایونایزیشن او د زیان کچه دګاما اوبېتا وړانګو د زیان په پرتله ډېره ځلي زیاته ده. داځکه چې دیوې خوا دالفا وړانګې دبېتا وړانګو په پرتله دوه مثبت غبرګ بریښنايز چارجونه لري او دبلې خوا لږ څه دوه زره ځله درندې دي. نو له دې کبله په کافي اندازه وخت لري چې د اتوم الکترونوسره غبرګون وکړي. په داسې حال کې چې دګاما وړانګې بریښنايز چارج نه لري اوله دې کبله دیوې مادې داتومونوسره دکولمب غبرګون هم نه کوي.




په يوه سانتي مترمکعب هواکي دجوړه ايونو شمير		دورانگو انرژي په واحد دميگا الکترون ولټ
دبېټا وړانگوپه واسطه	دالفا وړانگوپه واسطه	
50	60 000	1 MeV
45	16000	10 MeV

۱۹- جدول: دالفا او بېټا وړانگو په واسطه په يوه سانتي مترمکعب هواکي دپيداشووجوړه ايونو د شميرکچه ديوميگا الکترون ولټ او لس ميگا الکترون ولټ لپاره بنودل شوي ده.

	په دې اېن اې DNA کې ديو کيلو الکترون ولټ 1KeV الکترونوبيلوژيکي اوفزيکي اغيزې لکه موتيشن او ايوناييزيشن دپام وړ نه دي
	په دې اېن اې DNA کې ديو ميگا الکترون ولټ 1MeV الکترونواغيزې لکه ايوناييزيشن او موتيشن دپام وړ دي خوبيرته جوړيدلای شي
	په دې اېن اې DNA کې ددری نيم ميگا الکترون ولټ 3,5 MeV الفا وړانگوناوره اغيزې لکه ايوناييزيشن او موتيشن دومره ډيرې دي چې د بيرته جوړيدلو امکانات يې ډير کم دي او له دې کبله دنوموړو وړانگودزيان خطر لکه دسرطان ناروغي احتمال هم ډيرلوړاتکل کيږي . دايوناييزيشن غبرگون د شکل په لاندې برخه کې په توروټکو بنودل شوي ده.

د دې اېن اې DNA غبرگ تاو شوي ماليکول بڼه بنودل شوی ده چې په توپير لرونکو وړانگو رڼاشوی دی.

۵۰- شکل : دپاس نه بنکته خواته: په دې اېن اې DNA او نوکليوزومو (Ncleosome) کې ديو کيلو الکترون ولټ، ديو ميگا الکترون ولټ الکترونو (1 MeV) پينځه کيلو الکترون ولټ الکترونو (5 KeV) او د شکل په لاندې برخه کې ددری نيم ميگا الکترون ولټ الفا وړانگو (3,5MeV) غبرگون شودل شوي دي. دالفا وړانگي دالکترونو په پرتله گڼ شمير چارج شوي ايونونه منځ ته راوړي چې په تورو ټکو سره بنودل شوي دي. په پورتنۍ شکل کې دواټن واحد په نانومتر ۱nm سره بنودل شوی دی. دبيلگي په ډول شل نانو متر 20 nm واټن په يوه سم سيخ ليکه سره کښل شوی دی.



په ۲۰- جدول کې دمختلفو وړانگو او زرو لکه د پروتونو، الکترونو، نیوترونو، فوتونو او الفا وړانگو د کوالیټي فکتور قیمتونه بنودل شوي دي.

د وړانگو ډول	انرژي برخه	کوالیټي فکتور Q_R
فوتون او بېتا وړانگې	د ټولې انرژي لپاره	1
الکترون او میون	د ټولې انرژي لپاره	1
نیوترونه	د لسونه تر سلو کیلو الکترون ولټ	10
نیوترونه	د سلو کیلو څخه تر دوه میگا الکترون ولټ	20
نیوترونه	شل میگا الکترون ولټ څخه پورته	5
پروتونونه	دوه میگا الکترون ولټ څخه پورته	5
د الفا ذره	د ټولې انرژي لپاره	20

۲۰- جدول: دنړیوال کمیسیون (ICRP) دخپروني سره سم دهر ډول وړانگو او انرژي لپاره دکوالیټي فکتور قیمتونه بنودل شوي دي.

د بېلگه په ډول کله چې دیوه ناروغ د سږي اکسریز عکس واخیستل شي نو تجربو بنودلې ده چې لږ څه پینځه دیرش ملي گري 35 mGy وړانگې ورته رسیږي. د پاس جدول له مخې نوموړی قیمت د پینځه دیرش ملي سیورت معادل ډوز 35 mSv سره سمون خوري داځکه چې داکسریز کوالیټي فکتور یو دی. خو که چیرته داکسریز په ځای د الفا وړانگې په نوموړي کچه یانې 35 mSv ډوز تنفس شي نو په سږو کې د دنوموړو وړانگو معادل ډوز قیمت د پینځه دیرش په ځای اوه سوه ملي سیورت یانې صفر عشاریه اوه سیورت ته پورته ځي. داځکه چې د معادل ډوز قیمت د پاس جدول سره سم د الفا وړانگو دکوالیټي فکتور دیوه پر ځای شل قیمت لري. دالفانکو وړانگو معادل ډوز په لاندې ډول لاس ته راځي.

$$H = Q_R \times D = 20 \times 35 \text{ mSv} = 700 \text{ mS}$$

معادل ډوز د الفا وړانگو لپاره


$$H = Q_R \times D = 1 \times 35 \text{ mSv} = 35 \text{ mS}$$

معادل ډوز داکسریز لپاره

✓ دپورتنۍ شمیرنې څخه څرگندیږي چې د الفا وړانگو دزیان کچه داکسریز په پرتله شل ځله لوړه ده. داځکه چې دکوالیټي فکتور یې داکسریز په پرتله شل واره لوړ دی.

✓ دسلو کیلو الکترون ولټ انرژي نیوترونو دزیان کچه د فوټونو او الکترونو په پرتله لس ځله ډیره ده

✓ ددوه میگا الکترون ولټ انرژي پروتونو دزیان کچه د فوټونو او الکترون په پرتله پینځه ځله ډیره ده



څرنگه چې دالفا وړانگو د څپریدلو فاصله (Range) د هغوي د انرژي سره سم دڅو مایکرومتره $\mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$ څخه نه اوږي نو خپله ټوله انرژي د څو حجرو په قطر کې دلاسه ورکوي. همدا سبب (لامل) دې چې دسېري سرطان ناروغۍ د پیدا کیدلو یو وتلی اساسي علت (لامل) دالفا وړانگې گڼل کیږي کوم چې د طبیعي سرچینو څخه لکه د ځمکې لاندې معدني ډبرې او یا د رادون غاز څخه خپریږي. درادون رادیو اکتیو غاز دکورونو په تګلویکې راتولیدي او بیا د تنفس له لارې داوسېدونکوسېري ته ورننځي.

په ۲۱- جدول کې ښودل شوي ده چې دالفا وړانگو معادل ډوز د نورو وړانگو په پرتله څومره لوړ قیمت لري. د بېلګه په ډول کله چې د بدن یوې برخې ته لس ګري انرژي ډوز (10 Gy) ورکړ شي نو دغه کچه د څومره معادل انرژي ډوز سره سمون لري؟

په نسجونو کې دالفا وړانگو معادل ډوز	په نسجونو کې د انرژي ډوز
د فوتون وړانگو لس سیورټ	د فوتون وړانگو لس ګري
د الکترونو وړانگو لس سیورټ	د الکترونو وړانگو لس ګري
د نیوترون وړانگو لس سیورټ	د نیوترونو وړانگو لس ګري
دالفا وړانگو دوه سوه سیورټ	دالفا وړانگو لس ګري

۲۱- جدول: د پورتنی جدول څخه دا پایله لاس ته راځي چې که د بدن یوه غړي ته دالفا وړانگې ورسېږي چې انرژي ډوز یې لس ګري وي نومعادل ډوز یې لږ څه دوه سوه سیورټ یا په بل عبارت شل ځله دالکترون اوفوتون وړانگو په پرتله لوړ قیمت لري. داځکه چې معادل ډوز د وړانگو ډبل یوه فزیکي کمیت یانې انرژي ډوز په پرتله د فزیکي غبرګون برسیره دوړانگو بیالوژیکي او کیمیاوي زیان هم په پام کې نیسي.


👉 د پام وړ: د یو ګري او دسیورټ واحد ونو تر منځ لاندنۍ اړیکې شته دی.

$$1\text{Sv} = Q_R \times 1\text{Gy}$$

د غړي ډوز (Organ Dose)

د بدن دیوه غړي ډوز H_T هغه انرژي ده چې د بدن په یوه ټاکلي غړي کې جذب شوي وي او بیا ددغه غړي په کتله ویشل شي. دا په دې مانا چې د یوه غړي ډوز H_T تر لاسه کولای شو کله چې دورانګوپه ورکولو سره دهمغه غړي په نسجونو کې جذب شوی انرژي ډوز $D_{T,R}$ د غړي د کوالیټي فکتور ($Q_R = \text{Quality Factor}$) سره ضرب کړو.

$$H_{T,R} = Q_R \times D_{T,R}$$



په پور تنی معادله کې دورانگو ډول په $R = \text{Radiation}$ اودیوه غړي دنسجونو ډول په $(T = \text{Tissue})$ سره بنودل شوی دی.


که په چاپریال کې داسې رادیو اکتیو مواد خواره واره شوي وي چې نه یوازې یوډول بلکه څو ډوله وړانګې د بېلګه په ډول الفا، بېتا، گاما اونیوترون وړانګې خپروي نود نوموړو وړانګوهر اړخیزې فزیکې او بیالوژیکي اغیزې دمعادل ډوزپه څیر سره جمع کیږي. که چیرته دورانګودول په اند پکس i او د نسجونو ډول په T وښیو نو د توپیر لرونکو وړانګو لپاره چې شمیر یې تر k پورې رسیږي د ټولو وړانګو معادل ډوز H_T دلاس ته راوستلو لپاره لاندنۍ معادله لیکلای شو.

$$H_T = \sum_i^k Q_{i,T} \times D_{i,T}$$

په پورتنۍ معادله کې $Q_{i,T}$ د یوې ټاکلې ډول وړانګې کوالیټي ضریب او $D_{i,T}$ ددغې وړانګې جذب شوي انرژي په یوه غړي کې را ښیي چې په T سره بنودل شوی دی.

Äquivalentdosis Alpha-strahlen $H = \frac{10^{-5} \text{ J}}{\text{g}} \cdot 20 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ J/g} = 2 \cdot 10^{-1} \text{ Sv}$	دیوې رادیو اکتیو سرچینې څخه دالفا وړانګې خپریږي اومخامخ په یوه ژوندۍ ماده چې وزن یې یو ګرام دی لګیږي. څرنګه چې دالفا وړانګو لپاره د کوالیټي فکتورشل دی نودنوموړې سرچینې جذب شوې انرژي په یوه ګرام کې لس مایکرو ژول او معادل ډوز دوه سوه ملی سیورت قیمت 200 mSv ($2 \times 10^{-1} \text{ Sv}$) لري.
Äquivalentdosis γ-Strahlen, Elektronenstrahlen $H = \frac{10^{-5} \text{ J}}{\text{g}} \cdot 1 = 10^{-5} \text{ J/g} = 10^{-2} \text{ Sv}$	که چیرته دالفا وړانګو په ځای دګاما وړانګې او یا الکترون وړانګې په یوه ګرام ماده کې جذب شي نو معادل ډوزي یوازې لس ملی سیورت 10 mSv (10^{-2} Sv) قیمت لري.

۵۱- شکل: په یوه ژوندۍ ماده کې دالفا وړانګو ناوړه بیالوژیکي اغیزې دالکترون او ګاما وړانګو په پرتله شل ځله لوړ اټکل کیږي (34).



اغیزمن معادل ډوز (Effective Equivalent Dose)

دورانگو دخطر احتمال په دې پورې هم اړه لري چې د بدن کومه برخه او کوم غړی رڼا شوي ده. تجربو وښودله چې د بدن هر یو غړی د وړانگو پمقابل کې په توپیر سره حساسیت او غبرگون ښيي. ددې لپاره چې نوموړې بیالوژیکي اغیزه مو هم په پام کې نیولې وي نو د بدن هریوه غړي لپاره ډوزن فکتور (Tissue weighting factor = ω_T) وټاکل شو.

بر سیره پردې داغیزمن معادل ډوز په مرسته سره دورانگو دخطر کچه دټول بدن او د بدن یوې برخې تر منځ هم پرتله کولای شو.

تعریف:

اغیزمن معادل ډوز (H_{eff}) عبارت دې له مجموعه دحاصل ضرب دټولو غړو معادل ډوز (H_T) او د هغوي د نسجونو د وزن فکتور (ω_T).


داغیزمن معادل ډوز H_{eff} معادله په لاندې ډول ده چې دلته د T ټکی یا انډکس د نسجونو (tissue) او R دورانگو Radiation د ډول لپاره لیکل شوی دی.

$$H_{eff} = \sum_T \omega_T \times H_T = \sum_T \omega_T \sum_R \omega_R \times D_{T,R}$$

$D_{T,R}$ = د ټاکلي وړانگې (Radiation = R) او ټاکلي نسج (Tissue = T) لپاره دانرژي ډوزده چې واحد یې سیورټ Sv ټاکل شوی.

$Q_R = \omega_R$ دورانگو وزن فکتور (Radiation Weighting factor = ω_R) دې چې د ټاکلي وړانگې لپاره ځانگړی قیمت لري اود کوالیټي فکتور سره یوشان دی (واحد نه لري)
 ω_T = دټاکلي نسج لپاره ډوزن فکتور
 Σ = درياضي یوه علامه ده چې د جمعې فرمول لپاره په کارېږي

که فرض کړو چې د بدن هریوه غړي ته په متجانس ډول دطبیعي وړانگو په کچه یانې لږ څه دوه ملي سیورټ (2,13 mSv) معادل ډوز ورسیږي نو د هریوه غړي اغیزمن ډوز H_{eff} د نسجونو ډوزن فکتور ω_T اودغړي ډوز د حاصل ضرب څخه ($H_{eff} = H_T \times \omega_T$) لاس ته راځي. په ۲۲ - جدول کې دغه شمیرنه د هر یوه غړي لپاره تر سره شوې ده. همدارنگه په نوموړي جدول کې دټول بدن لپاره د طبیعي وړانگو اغیزمن ډوز هم محاسبه شوی دی. د بېلگه په ډول که چیرته وغواړو چې د طبیعي وړانگو اغیزمن ډوز تر نظر لاندې ونیسو چې بدن ته د تنفس، خوراک د پوستکي او نورو لارو له خوا په توپیر سره ننوځي اوله دې کبله هر یوه غړي ته یو شان انرژي ډوزنه رسیږي نو د پورتنی فرمول سره سم په پایله کې دطبیعي وړانگو کلنی اغیزمن ډوز په نړیواله کچه لږ څه دوه ملي سیورټ 2,13 (mSv) اټکل کیږي.



د نسجونو دوزن فکتور ω_T یو عدد (شمیره) دی چې وا حد نه لري او دځینو غړو لپاره په ۲۲ جدول کې بنودل شوی دی.

د طبیعي وړانگو څخه ټول بدن ته کلنی اغیزمن دوز لږ څه دوه ملي سیورټ دی $H_T = 2,13 \text{ mSv}$ اود لاندې فرمول په مرسته تر لاسه کيږي.



$$H_{\text{eff}} = \sum H_T \times \omega_T = 2,13 \text{ mSv}$$

د غړي نوم		د نسجونو وزن فکتور ω_T	یوه غړي ته د طبیعي وړانگو اغیزمن دوز $H_T \times \omega_T = 2,123 \times \omega_T$	
gonads	جنسي غدې	0,20	2,123	0,4
Bone marrow	د هډوکو ماغزه	0,12	2,123	0,25
colon	غټې کلمې	0,12	2,123	0,25
lung	سږي	0,12	2,123	0,25
stomach	معهه	0,12	2,123	0,25
bladder	د مساني کڅوړه	0,05	2,123	0,1065
breast	سینه	0,05	2,123	0,1065
liver	ینه	0,05	2,123	0,1065
oesophagus	مرئ	0,05	2,123	0,1065
thyroid	تایرایډ	0,05	2,123	0,1065
skin	پوستکې	0,01	2,123	0,02
Bone surface	دهډوکو سطحه	0,01	2,123	0,02
Rest tissues	پاتې نسجونه	0,05	2,123	0,1065
د ټولو غړو مجموعي اغیزمن دوز		$\sum \omega_T = 1$	$H_{\text{eff}} = \sum H_T \times \omega_T = 2,13 \text{ mSv}$	

۲۲- جدول: دا اغیزمن معادل دوز H_{eff} د لاس ته راوستلو لپاره د نسجونو دوزن فکتور ونه ω_T بنودل شوي دي. په نوموړي جدول کې د طبیعي وړانگو په کچه د بیلگي په ډول لکه $2,13 \text{ mSv}$ وړانگو لپاره د ټول بدن اغیزمن معادل انرژي دوز محاسبه شوی دی.

د بېلگه په ډول که ټول بدن په یوگرې رڼا شي او وخواړوچې یوازې د سږي لپاره اغیزمن دوز معلوم کړونود پورتنی جدول په کارولو سره د سږي لپاره د نسجونو دوزن فکتور مساوي له ($\omega_T = 0,12$) سره دی. نو د سږي اغیزمن دوز د نسجونو دوزن فکتور اود یو گرې د حاصل ضرب څخه تر لاسه کيږي او له دوولس ملي سیورټ سره مساوي ده :

$$(H_{\text{eff}} = 0,12 \times 100 \text{ cGy}) = 12 \text{ mSv}$$



۵۳- شکل: په عمودي محور کې د نسجونو وزن فکتور (w_T = tissue weighting factor) د بدن دغروپه تابع سره بنودل شوی دی. نوموړی فکتور د جنسي غدو لپاره تر ټولو لږ قیمت لري (27).

د نسجونو وزن فکتور (w_T = tissue weighting factor) د بدن هر غړي په تړاو دورانګود خطر احتمال کچه او حساسیت په پام کې نیسي. دنوموړي فکتور اړخونه د هیروشیما او ناګازاګي داتوم بمونو وړانګو څخه ژوندي را پاتې شوئو او دسرطان په ناروغۍ اخته کسانو داپیدیمولوژي شمیرنو په بنسټ ترلاسه شوي ده. دغه وګړي بیا څو کاله وروسته دورانګو دناوړه اغیزو په اساس مړه شول.

داغیزمن معادل دوز واحد یو سیورت ټا کل شوی چې کوچنی واحد یې سانتي سیورت یاڼي دسیورت سلمه او یوملي سیورت د سیورت زرمه برخه ده. لاندنۍ بیلګي داغیزمن معادل دوز د لاس ته راوستلوپه تړاو رڼا اچوي.


*** پوښتنه:** دچرنوبیل هستوي بټۍ په پېښه کې کوم چې په ۱۹۸۶ م کال کې داوکراین Ukraine په هیواد کې دیوه کارپوه دناسمي کرنلاري په پایله کې منځ ته راغله دشاوخوا او سیدونکو سرو، تایراید، هډوکو، او نس ته په خپل وار سره صفرعشاریه بنېر، یو عشریه دوه، صفرعشاریه صفر نهه اویوعشاریه اته ګري فوتون وړانګي رسیدلي دي. ددغو اوسیدونکو لپاره دورانګو اغیزمن انرژي دوز قیمت به څومره وي؟

*** حل:** د ۲۲- جدول څخه د نسجونو دوزن فکتور په نظر کې نیولو سره لرو چې:

$$H_{eff} = \sum H_T \times w_T$$

$$H_{eff} = 0,12 \times 0,6 \text{ Sv} + 0,05 \times 1,2 \text{ Sv} + 0,01 \times 0,09 \text{ Sv} + 0,12 \times 1,8 \text{ Sv} = 0,35 \text{ Sv}$$

*** ځواب:** صفر عشریه پینځه دیرش سیورت یاڼي (0,35 Sv)



*** پوښتنه:** يو مسلكي کارگر په يوه چاپيريال کې چې په راډيواکتيو موادو کې شوي دي په څېر نه بوخت دی. نوموړي د کار کولو په ترڅ کې يو راډيواکتيو غاز تنفس کوي چې اکتیوېټي يې سري، تايرايډ او ټول بدن ته انتقال او هلته جذب کېږي. د يوه کال په موده کې دهغه ټول بدن ته لس ملي سيورټ 10 mSv او سږو ته يې پنځوس ملي سيورټ 50 mSv معادل ډوز رسېږي. په نوموړې موده کې د تايرايډ لپاره دنړيوال کميسيون د سپارښتنې لور لېميټ په پام کې نيولو سره د معادل ډوز تر ټولو لوړه کچه محاسبه کړی.

*** حل:** څرنگه چې د مسلكي کارگر لپاره دوړانگو نه د ځان ساتنې نړيوال کميسيون له خوا ICRP داغېزمن ډوز قيمت د يوه کال او د ټول بدن لپاره شل ملي سيورټ ټاکل شوی دی نو لروچي:

د ټول بدن معادل ډوز × وزن فکتور + د سږي معادل ډوز × وزن فکتور +
د تايرايډ معادل ډوز × ډوز فکتور = شل ملي سيورټ اغېزمن ډوز

$$1.0 \times 10 \text{ mSv} + 0.12 \times 50 \text{ mSv} + 0.05 \times H_T (\text{Thyroid}) = 20 \text{ mSv}$$


$$10 \text{ mSv} + 6 \text{ mSv} + 0.05 H_T (\text{Thyroid}) = 20 \text{ mSv}$$

$$H_T (\text{Thyroid}) = \frac{20 \text{ mSv} - 16 \text{ mSv}}{0.05} = 80 \text{ mSv}$$

*** ځواب:** نوموړي کارگر ته د دې اجازه شته چې په همدغه کال کې تر اتيا ملي سيورته (80 mSv) پورې اضافه معادل ډوز هم ورسېږي بې له دې چې دنړيوال کميسيون د ټاکلي لېميټ څخه يې قيمت واورې.

دانرژي خطي انتقال (Linear Energy Transfer = LET)

کله چې سم سيخ ايونايډ کونکي وړانگې لکه الکترونه، پروټونه، ايونونه او الفا وړانگې په يوه بيالوژيکي ماده ولگېږي نو يوه برخه يې بې له دې چې د مادې سره کوم فزيکي غبرگون وکړي تېرېږي او بله برخه يې د دغه جسم د اټومونو او ماليکولوسره لگېږي او خپله انرژي ورته انتقال کوي. دنوموړو وړانگو بيالوژيکي اغېزه داده چې په حجرو کې ماليکولونه ايونايډ کېږي او دهغو ی کيمياوي مرکبونو اړيکې بيخي ديو بل نه پری کېږي. خو کله چې نه سم سيخ ايونايډ کونکي وړانگې لکه د فوټون او اکسريز وړانگې په يوه بيا لوژيکي ماده ولگېږي نو هغوی پخپله سم سيخ ماليکولونه نه ايونايډ کوي بلکې دهغوی د فزيکي غبرگون په پايله کې پيدا شوي ثانوي چارج شوي ذرې (secondary particle) د بيالوژيکي ماليکولونو د ايونايډ کولو سبب (لامل) گرځي. دهستوي ذرو دانرژي خطي انتقال هغه شمير ايونايډېشن ته ويل کېږي چې دنسجونو څخه د دغو ذرو د تيريدلو او د لارې په اوږدو او واحد دواټن کې منځ ته راځي. د چارج شوو هستوي ذرو انرژي خطي انتقال د تجربو له مخې تر سره کېږي او د دايونايډ کونکو وړانگو بيالوژيکي اغېزې په ژوندی او نه ژوندی ماده کې لکه الکترونیک سرکټونه پر تله کوي. په نيم هادي سرکټونو کې دنوموړي کميت واحد په $\text{MeV} \times \text{cm}^2 / \text{mg}$ بنودل کېږي.




د بېلگه په ډول د سوډيم کلورايد NaCl د انفکاک يانې دنوموړي ماليکول د کيمياوي اړيکوپرې کيدلو او په ايونوتجزيه کيدلو (Dissociation) لپاره لکه Na^+ او Cl^- لږ څه څلور الکترون ولټ انرژي (4,2 eV) په کار ده.


د انرژي خطيز انتقال (LET) يو فزيکي کميت دی چې چارج لرونکي هستوي ذرې خپله حرکي انرژي د يوې بيالوژيکي مادې سره دغبرگون په ترڅ کې د لاسه ورکوي او په پايله کې داتومونود ايونايژيشن او تحريک سبب گرځي. د انرژي خطيز انتقال په نسجونو کې د خطيز (کرنيز) طي شوې لارې (ΔS) په اوږدوکې د چارج لرونکوبخړکومنځنئ جذب شوې انرژي (ΔE) د حاصل تقسيم سره مساوي ده .

$$\text{Linearer-Energie-Transfer: } \text{LET} \left[\frac{\text{keV}}{\mu\text{m}} \right] = \frac{\Delta E}{\Delta s}$$

د نوموړي فزيکي کميت واحد په کيلو الکترون ولټ تقسيم په يوه مايکرومتر ($\text{KeV}/\mu\text{m}$) ټاکل شوی دی. په ۲۳ جدول کې د نوموړي کميت قيمتونه د وړانگودانرژي اوچارچ شوو ذرو لپاره بنودل شويدي. د بېلگه په ډول دالفا وړانگو دانرژي خطيزانتقال ترتولونورو وړانگو لوړ قيمت لري او لږ څه سل کيلو الکترون ولټ په يوه مايکرو مترواټن کې اندازه شوې دی. په داسې حال کې چې د بېټا او گاما وړانگولپاره يواځې درې سوه الکترون ولټ قيمت لري.

وړانگي	LET [KeV/ μm]	
Co- γ دکوبالټ گاما وړانگي	0,3	
2 MeV Protonen دوه مېگا الکترون ولټ پروتون	17	
3 MeV α دری ميگا الکترون ولټ الفا وړانگي	140	
100 MeV Carbon سل ميگا الکترون ولټه کاربون ايون	160	
330 MeV Argon دری سوه دېرش ميگا الکترون ولټه اړگون ايون	1300	

۲۳- جدول: دانرژي خطيز انتقال (LET = Linear Energy Transfer) قېمتونه په واحد د کيلوالکترون ولټ تقسيم په مايکرو متر ($\text{KeV}/\mu\text{m}$) د گاما، الفا اوځينو ايونولپاره بنودل شوې دي. په بني اړخ کې دکروموزوموډي اين اي غبرگ تاربنودل شوی چې ديوې هستوي ذرې په لگيدلو سره پرې کيږي. هغه وړانگي يا ذرې چې دانرژي خطيز انتقال شميره يې لوړ قيمت ولري لکه الفا ذره، پروتون، اړگون ايون اونور دغه غبرگ تار پرې کوي.



* **پوښتنه:** دچرنوبيل په هستوي پيښه کې چاپېريال په راډيو اکتیو موادو ککړ شو او دشاوخوا اوسیدونکو دایوډین ایزوټوپ په تاثیرايد کې جذب کړ. که ومنو چې د ایوډین I-131 بېټا وړانګې د تاثیرايد نسجونو سره غبرګون وکړي او په دې ترڅ کې یو الکترون دیوې حجرې په کروموزوم کې چې قطر یې لږ څه یو مایکرومتر ($1\mu\text{m}$) دی یوه برخه انرژي لکه پینځه سوه الکترون ولټ د لاسه ورکړي نو په یوه مکعب مایکرومتر ($1\mu\text{m}^3$) نسجونو کې به دانرژي ډوز D_μ کچه څومره وي؟

* **حل:** د ۲۳ جدول له مخې د الکترونولپاره د انرژي خطیزانتقال LET مساوي دی له:

($\text{LET} = \Delta E / \Delta S = 0,5 \text{ keV} / \mu\text{m}$) څرنگه چې د نسجونو کثافت $\rho = 1 \text{ g/cm}^3$ یوګرام په یوه مکعب سانتي متر قیمت لري نو په یوه مایکرومتر واتن نسجونو کې جذب شوي انرژي D_μ په لاندې ډول لاس ته راځي.


$$D_\mu = \frac{\Delta E}{\rho \times V_\mu} = \frac{0,5 \text{ keV} / \mu\text{m}}{1 \text{ g} \times \text{cm}^{-3} \times (10^{-4}) \times (10^{-4}) \times (10^{-4}) \times \text{cm}^3} = 0,08 \text{ Gy}$$

* **ځواب:** په یوه مایکرومتر مکعب μm^3 نسجونو کې د ایوډین یوې بېټا ذرې یانې یوه الکترون لږ څه اتیا ملي ګري (80 mGy) انرژي جذب کیږي.

دنوموړي فرمول په اساس په ۲۴- جدول کې د پروتونو (P)، الکترونو (Electrons) او الفا ذرو (α) لپاره د نسجونو په یوه مایکرو متر حجم کې جذب شوي انرژي ښودل شوي ده.

د هستوي ذرې نوم	په یوه مایکرو متر نسجونو کې جذب شوي انرژي $\Delta E / \Delta S$	په یوه مایکرو متر مکعب نسجونو کې جذب شوي انرژي ډوز کچه په واحد ګري Gy
الکترون (Electron)	0,1 – 10 keV/ μm	0,02- 1.6 Gy
پروتون (Proton)	1- 100 keV/ μm	0,2 – 16 Gy
الفا ذره (Alpha particle)	5 – 300 keV/ μm	0,8 – 50 Gy

۲۴- **جدول:** په یوه مایکرومتر مکعب ($\mu\text{m} \times \mu\text{m} \times \mu\text{m}$) نسجونو کې د الکترون، پروتون او الفا ذرو جذب شوي انرژي کچه په واحد ګري (Gy) ښودل شوي ده. کثافت = کتله تقسیم په حجم ($\rho = \text{dm/dV}$) په نوموړي جدول کې دیوې حجرې حجم په واحد مایکرومتر (μm)³ په طاقت درېو او کثافت یې یوګرام پرسانتي متر مکعب ټاکل شوی. ځینې څیړنې په ډاګه کوي چې (Radioimmunotherapy) راډیو ایمون تیراپي په موخه، د الفا خپروونکو راډیو ایزوټوپولکه Po^{213} ، د بېټا وړانګو خپروونکو ایزوټوپو په پرتله لکه Y^{90} ګټورې نتیجې ورکړي دي. داځکه چې دالفا وړانګو LET د بېټا وړانګو په پرتله لوړ قیمت لري.



مخصوصه ایونایزیشن (Specific ionization)

نوموړی فزیکي کمیت دمثبت او منفي ایونو(جوړه ایونو) هغه شمیر ته ویل کیږي چې د یو سانتي متر په واټن کې دچارج لرونکو ذرو لکه پروتون اونیوترون په واسطه په نسجونو کې تولید کیږي (ion pairs = i.p/cm).

مخصوصه ایونایزیشن = دتولید شوو جوړه ایونو شمیر تقسیم په واحد دواټن


$$\text{specific ionization} = \frac{dE / dx}{\omega}$$

په پورتنۍ معادله کې ω هغه انرژي ده چې د یو جوړه ایونو د تولید کولو لپاره په کار ده. د بېلګه په ډول د هوا د پاره نوموړي انرژي لږ څه څلور دیرش الکترون ولټ (34 eV) ، د اکسیجن لپاره (13,6 eV) او د نایتروجن لپاره (14,5 eV) قیمت لري.



واحد: الکترون ولټ په سانتي متر (eV/cm) تقسیم په الکترون ولټ په جوړه ایونو (eV/i.p)

$$\left[\frac{\text{eV/cm}}{\text{eV/i.p.}} \right]$$

د بدن په نسجونو کې د سپکوزرو لکه الکترونو او درندوزرو لکه پروتونوپه واسطه د واټن په اوږد و کې پیداشو ایونونو شمیره په خپل وار سره په ۵۵- شکل او ۵۶- شکل کې ښودل شوي ده. دنوموړو شکلو څخه په ډاګه کیږي چې د پروتونو مخصوصه ایونایزیشن د الکترونو په پرتله په لس ګونو ځله لوړ دی.



۵۵- شکل: د نسجونوپه حجرو کې (ګردې دایرې) دیوه الکترون (e^-) د غبرګون په پایله کې د پیدا شوو ایونو شمیر په تورو ټکو سره ښودل شوی دی.



۵۶- شکل: د نسجونو په حجرو کې (گردي دایري) د یو پروتون (P^+) د غبرگون په پایله کې د پیدا شوو ایونو شمیر په تورو تګو سره ښودل شوی دی.

دورانګو بیالوژیکي خطر په هغه کچه ډیر دی څومره چې دورانګو په طی شوي لاره کې د پیداشوو ایونو شمیر په واحد د سانتي متر کې لوړ قیمت ولري. د دورانګو دانرژي سم سیخ انتقال یو مهم فزیکي کمیت دی دا ځکه چې په بیالوژیکي ماده کې دورانګودزیان کچه اټکل کوي.

دکتلي دروونکي قدرت ($\text{Mass stopping power} = S$)

دکتلي دروونکي قدرت S د چارج لرونکو ذراتو له هغه ضایع شوي انرژي ده ($-dE/dx$) چې په یو ګرام نسجونو او یو سانتي متر طی شوي لاره کې یې دلاسه ورکوي.


$$S = \frac{-dE/dx}{\rho}$$

په پورتنۍ معادله کې ρ د نسجونو کثافت دی. دنوموړي فزیکي کمیت ګټه په دې کې ده چې په یوه ګرام او یو سانتي متر پنډه ماده کې د چارج لرونکو ذرو ضایع شوي انرژي په ګوته کوي. کله چې لوړ انرژي ذري د یوې مادې څخه تیرېږي د بیلګه په ډول لکه یو پروتون چې انرژي یې لږ څه سل میگا الکترون ولټه په یو نوکلېون قیمت ولري (100 MeV/nucleon) نودلارې په اوږدو کې خپله حرکي انرژي دبریک (Bremsstrahlung) وړانګو او د شیرینکو وړانګو (Cherenkov radiation) په بڼه تر هغه مودې پورې دلاسه ورکوي ترڅو چې په ماده کې ودیږي.

واحد: یو مېگا الکترون ولټ په ګرام په سانتي متر مربع $[\text{MeV/g/cm}^2]$

دالفا ذرو داننتشار فاصله (خپریدلو واتن) (Alpha particle range)

په یوه ماده کې دالفا وړانګود خپریدلو واتن ($\text{Range} = R_\alpha$) هغه فاصله ده چې نوموړې وړانګې خپله ټوله انرژي دلاسه ورکړي او هلته ځای په ځای ودرېږي. په هوا کې دالفا ذرو د خپریدلو واتن R_{air} او د نوموړو ذرو د انرژي E_α تر منځ لاندنۍ اړیکې شته دي (51).



$R_{air} [cm] = 0,56 E_{\alpha}$	کله چې دالفا انرژي دڅلورمېگا الکترون ولته څخه کوچنۍ وي	$E_{\alpha} < 4 \text{ MeV}$
$R_{air} [cm] = 1,24 E_{\alpha} - 2,62$	کله چې دالفا انرژي د څلورمېگا الکترون ولته څخه کوچنۍ وي	$4 < E_{\alpha} < 8 \text{ MeV}$

څرنګه چې د الفا ذرې کتله د فوتون او الکترون په پرتله ډیره غټه ده نو په نسجونو کې سم سیخ مخ په وړاندې ځي او د دطی شوي لارې په اخیږه برخه کې خپله ټوله انرژي د لاسه ورکوي. که چیرته دالفا ذرو د خپریدلو وټن په هوا کې مالوم وي نو کولای شو چې په نسجونو کې دنوموړو ذرو دخپریدلو وټن (R_{tiss}) د لاندنۍ اړیکې له مخې تر لاسه کړو چې د براګ کلېمن قانون (Bragg-Kleeman rule) په نامه سره یادېږي (51).

$$R_{tiss} = R_{air} \frac{\rho_{air}}{\rho_{tiss}} \approx 1,293 \times 10^{-3} R_{air}$$

په پورتنۍ معادله کې دهوا کثافت R_{air} تر عادي فشار او تودوخې لاندې مساوي ده له :
($R_{air} = 1,293 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$) او د نسجونو کثافت یو ګرام په سانتي مکعب (1 g/cm^3) منل شوی دی.

* **پوښتنه:** دغریب شوي یورانیم ایزوټوپ څخه دالفا ذرې خپریږي چې حرکي انرژي یې څلور مېگا الکترون ولټ قیمت لري ($E_{\alpha} = 4 \text{ MeV}$). په نسجونو او په هوا کې دالفا ذرو دخپریدلو وټن څومره دی؟



* **حل:** په هوا کې د الفا ذرو دخپریدلو وټن لپاره لیکلای شو چې:

$$R_{air} [cm] = 0,56 E_{\alpha} = (0,56 \text{ cm/MeV}) (4 \text{ MeV}) = 2,24 \text{ cm}$$

همدارنګه په نسجونو کې د الفا وړانګو دخپریدنې وټن لپاره لیکلای شو چې:

$$R_{tiss} = 1,293 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3 (2,24 \text{ cm}) = 0,003 \text{ cm} = 30 \text{ } \mu\text{m} \text{ (microns)}$$

دغریب شوي یورانیم دالفا وړانګې چې انرژي یې څلور مېگا الکترون ولټ قیمت لري لږ څه دیرش مایکرو متر په نسجونو کې ژور ننوځي. دغه نسجونه دخپل وزن په ترکیب کې په سلو کې 73% اکسیجن، 4% نایتروجن، 12% کاربون او 10% هایډروجن لري.




۵۷- شکل: د رادیم رادیو اکتیف سرچینې څخه د الفا ذرې په هوا کې خپرېږي چې د پلې شوي لاره یې په سپینو کرښو ښودل شوي ده. د بېلګه په ډول د یورانیم په معدني ډبرو کې چې د **پېنېلېنډې** (**Pechblende**) په نامه سره یادېږي همدا سبب (لامل) دی چې دښې له خوا او یا په توره تیاره کې د شین رنګ په ډول ځلیږي. دا ځکه چې د الفا وړانګې د هوا مالیکولونه ایونایزکوي او په پایله کې د رڼا وړانګې ورڅخه خپرېږي چې په سترګو لیدل کېداي شي (52).

نسبي بیالوژیکي اغیزمنتیا ($\text{RBE} = \text{Relative biological effectiveness}$)

تجربو وښودله چې دورانګو بیالوژیکي اغیزې د پاس یادښوي فزیکي کمیت یانې دانرژي سم سیخ انتقال په کارولو سره بشپړ نه تر لاسه کېږي بلکه یو بل بیالوژیکي او فزیکي کمیت ته اړتیا لیدل کېږي چې د نسبي بیالوژیکي اغیزمنتیا (RBE) کمیت نوم ورکړشو. داځکه چې دورانګو بیالوژیکي اغیزې دیولرګن شمیر رادیو بیولوژیکي ارقامو (Data) لکه دنسجونو په ډول، دورانګو په قدرت، د وړانګو په انرژي، دنسجونو په فزیولوژیکي حالت، بیالوژیکي نوښت، په نسجونو کې دورانګو دخپریدلو په موده اود نسجونو په شاوخواکې دجذب شوي انرژي د خپریدلو په کړنلاره پورې اړه لري. د بېلګه په ډول که څه هم دتوپیر لرونکو وړانګو انرژي اندازه په یوه جسم کې سره یوشان وي خو بیا هم د وړانګو بیالوژیکي اغیزې د انرژي په تابع سره توپیر لري.

د یادشوي موخې لپاره نسبي بیالوژیکي اغیزمنتوب یو بل کمیت تعریف شو ترڅو دهر ډول وړانګو د بیالوژیکي اغیزو تر منځ یوه مقایسه وکولای شو. په دې اړوند د اکسریز دوه سوه پنځوس کیلو الکترون (250 keV) ولټ او یا د کوبالټ شپيته (Co-60) رادیو اکتیو عنصرګاما وړانګې دمقایسې په موخه د ستاندارد وړانګو په ډول ټاکل شوې دي. د بیلګه په ډول که چیرته مور اکسریز د ستاندارد وړانګو په صفت ومنواو دوه سوه سانتي ګري په همغه کچه بیالوژیکي اغیزه رامنځ ته کړي لکه چې شل سانتي ګري نیوترون یې رامنځ ته کوي، نو نسبي بیالوژیکي اغیزمنتیا مساوي ده له: $200/20 = 10$

$$\text{RBE} = \text{Cobalt-60 Energy dose (Gy)} / \text{unknown Energy dose (Gy)}$$




نسبي بيالوژيکي اغيزمنتيا RBE = دکوبا لټ شپيته (Co-60) وړانگو انرژي ډوز اندازه په واحد دگري (Gy) تقسيم په ځيرونکو وړانگو انرژي ډوز په واحد دگري (Gy)

نسبي بيالوژيکي اغيزمنتيا په نسجونو کې دکوبا لټ شپيته راديواکتيو عنصر د مقايسه کونکو وړانگو يا د ستاندارد (Standard) وړانگو اوڅيرونکو وړانگو انرژي اندازې د حاصل تقسيم سره مساوي دی کوم چې په همغه کچه بيالوژيکي اغيزي منځ ته راوړي لکه چې د کوبالت شپيته مقايسوي وړانگې يې را منځ ته کوي .

نسبي بيالوژيکي اغيزمنتيا په مرسته سره د دتوپيرلرونکو وړانگو نا څرگنده انرژي ډوز پيدا کولای شو کوم چې په همغه کچه بيالوژيکي ناوړه اغيزي منځ ته راوړي لکه چې دکوبالت سرچيني يو گري Gy انرژي ډوز يې را منځ ته کوي. د بېلگه په ډول دنوموړي کميت په مرسته سره د ځيرونکو وړانگو همغه کچه انرژي ډوز مخ وينه کولای شو چې پنځوس په سل کې وگري د **مرگ** سره مخامخ کوي او د وړانگو دغه اندازه په (LD₅₀=Letal Dose) سره بنودل کيږي.

Organs د بدن غړي	Equivalent dose × Weighting factor = effective Dose اغيزمن ډوز = ډوزن فکتور ضرب معادل ډوز			
Gonads جنسي غده	50 mSv	×	0,25	= 12,5 mSv
Mamma تې يا ماما	50 mSv	×	0,15	= 7,5 mSv
red bone marrow دهډوکوسره ماغزه	50 mSv	×	0,12	= 6 mSv
Lung سږی	50 mSv	×	0,12	= 6 mSv
Thyride تايرايډ	50 mSv	×	0,03	= 1,5 mSv
Bone surface دهډوکومخ سطحه	50 mSv	×	0,03	= 1,5 mSv
other five organs د بدن پاتې پينځه غړي	50 mSv	×	0,06 × 5	= 15 mSv
				= 50 mSv

۲۴- الف جدول: په پورتنی جدول کې د بدن هر يوه غړي لپاره د اغيزمن ډوز برخه محاسبه شوېده کله چې په يوه وار سره ټول بدن په پنځوس ملي سيورت 50 mSv وړانگې رنځ شي.




دېپام وړ: د بدن په حجرو کې دایونایز کونکو وړانګو ناوړه اغیزې هغه وخت پوره اټکل کولای شو چې دنوموړو وړانګو لاندني فزیکي او بیالوژیکي خواصو او پارامټرو parameters په هکله پوره مالومات په لاس کې ولرو:

- ✓ د وړانګو جذب شوې انرژي په واحد ډګرې
- ✓ د وړانګو ډول چې په نسجونو کې توپیر لرونکي اغیزې لري او واحد یې سیورت دی
- ✓ د وړانګو پمقابل کې د بدن د هر یوه غړي توپیر لرونکي حساسیت چې داغیزمن ډوز په مرسته سره په نظر کې نیول کېږي او له دې کبله د وړانګو د رښتوني خطر په اټکلو کې د یوه مهم فزیکي کمیت په توګه ورڅخه کار اخیستل کېږي

پوښتنې (Questions):

- ۱-۷ د وړانګو هغه ډوز چې د اندازې وړ دي څه نومېږي او واحد یې څه دی؟
- ۲-۷ یو ګرې په څومره کچه وړانګې دي؟
- ۳-۷ یومسلکي کار پوه ته دیوې بهرنۍ رادیواکتیوسرچینې څخه یوملي ګرې 1mGy الفا وړانګې، بیتا وړانګې او ګاما وړانګې رسېدلې دي. دنوموړو وړانګو ټول معادل ډوز دهغه بدن ته څومره دی؟
- ۴-۷ د احمدوزن یوسلو دوولس کیلوګرام او د محمودوزن شپږ پنځوس کیلوګرام دی. دواړو ته دیوې سرچینې څخه پینځه ملي ګرې 5mGy وړانګې رسېږي. دهغوی دواړو معادل ډوز سره یوشان دی؟
- ۵-۷ یومسلکي کارګر ته چې وزن یې سل کیلوګرام دی لس ټول انرژي ورسیده. د وړانګو انرژي ډوز یې څومره ده؟
- ۶-۷ یو چا ته لس ګرې بیتا وړانګې اولس ګرې الفا وړانګې رسېدلې دي. د دواړو وړانګو معادل ډوز سره یوشان ده؟



دریمه برخه

اتم خپړکی

د بدن په حجرو باندې د ایونایز کوونکو وړانگو
فزیکي، کیمیاوي او بیالوژیکي اغیزې



(Physical, biological and chemical effects
of ionizing radiation on body cells)

لومړئ: فزیکي اغیزې (Physical effects)


د انسانانو عصبي حجري نه شي کولای چې د ایونایز کونکو وړانگو ناوړه او خطر لرونکي اغیزې حس کړي بلکه یوازې د تخنیکي آلو، فزیکي، کیمیاوي او په تیره بیا د بیالوژیکي کړنلارو او تګلارو په مرسته سره د وړانگو شته والی څرګند کیدای شي. د وړانگو اندازه کول هغه وخت امکان لري چې د وړانگو اغیزې په بدن کې پاتې شي او موږ بیا ددې اغیزو له مخې د وړانگو انرژي پوزتر لاسه کړو او بیا په روغتیا باندې دهغوي د زیان یا خطر کچې اټکل وکړو.

کله چې ایونایز کوونکې وړانګې پر یوه بیالوژیکي ژوندۍ ماده ولګیږي نو لکه د یوې نه ژوندۍ مادې په څیر په لومړي پړاو کې یوه فزیکي پر وسه پیل کیږي یانې د ژوندې مادې د مالیکولونو او اټومونو سره هر اړخیز غبرګون کوي. په پایله کې د ژوندۍ مادې مالیکولونه او اټومونه الکترونه دلاسه ورکوي او د ایونایزیشن او هیجان کولو پروسه صورت نیسي.


په ۵۸- شکل کې د یوې مادې د اټومونو سره د ایونایز کوونکو وړانګو هر اړخیز غبرګونونه لکه کمپټون اغیزه (compton effect)، فوتو اغیزه (photo effect)، د جوړه ذرو پیدایښت (pair production) او هستوي تعاملونه ښودل شوي دي. نوموړې اغیزې درنا شوو وړانګو د انرژي تابع دي. د بیلګه په ډول که د فوتون وړانګو انرژي لس کیلو الکترون ولټ (10 keV) ومني، نو د فوتو اغیزه نهه نوي په سل (99%) او که شل میگا الکترون ولټ (20 keV) ومني، نو یو په سل (1%) هستوي تعاملونه منځ ته راځي.



۵۸- شکل: په ماده کې د فوټون وړانګودانرژۍ انتقال هر اړخیزې فزیکي کړنلارې بنسټول شوی دي. په دې شکل کې مثبت چارج دجمعي او منفي چارج دمنفي په علامه سره بنسټول شوی دی. د کین خوانه شي خواته (فوټو اغیزه، کمپتون اغیزه، د جوړه ذرو پیدایښت، دهستي چاودنه) (7)



۵۸- شکل: په یوه بیالوژیکي ماده کې دوړانګوفزیکي ، کیمیاوي اوبیالوژیکي غبرګون





دويم: دورانگوکيمياوي او بيالوژيکي اغيزې (Chemical and Biological effects of ionizing radiation)

کله چې الکترومقناطيسي وړانگې د حجرې ماليکولوسره فزيکي غبرگون تر سره کړي نو د يوې ثانيې زرمې برخې څخه په کمه موده کې ($10^{-18} - 10^{-3}$ seconds) فزيکي، کيمياوي او بيالوژيکي تعاملونه پيل کيږي چې په پايله کې د فوټون انرژي په نسجونو کې جذب کيږي او د بيو ماليکولونو اړيکي پرې کيږي. د بېلگه په ډول لکه **زهرجن او مغلق کمپلکس کيمياوي مرکبونه** ($R^+; RO_2^+$)، **داوبوتجزيه** (Radiolysate)، **ازاد ډير فعال راديکال** (Free active radicals)، **مثبت او منفي چارج شوي ايونونه** منځ ته راځي (OH^+). برسیره په دې، د نسجونو په الکترولايت (Electrolyte) کې د تيزابي، الکالي او خنثي ليول ($pH = -\log[H^+]$) کچه دنورمال حالت څخه بدلېږي. توليد شوي ايونونه په خپل وار سره د حجرې او د چاپيريال ماليکولوسره داسې ډول کيمياوي تعامل کوي چې په پايله کې د هغوي د پروټينونو (Proteins) اړيکود پرې کولو سبب (لامل) گرځي. د بېلگه په ډول د يو الکترون ولټ څخه تر پينځه دېرش الکترون ولټه پورې انرژي ($1\text{eV}-35\text{eV}$) په کارده ترڅود يوه بيوماليکول د ايونايژيشن کړنلاره منځ ته راشي.


دپام وړ: (تيزابي $pH < 7$ ، خنثي $pH = 7$ ، الکالي $pH > 7$)





داوبوراديو لايزيا دتجزيه کړنلاره (Radiolysate)

کله چې ايونايژ کونکي وړانگې د حجرې په سيتوپلازما (Cytoplasm) ولگيږي او هلته داوبو يوه ماليکول لکه H_2O سره غبرگون وکړي نو د يو لړ فزيکي او کيمياوي تعاملاتو په پايله کې داوبو دغه ماليکول کيمياوي اړيکي پرې کيږي او په کوچنيو برخو تجزيه کيږي. په دې ترڅ کې ازاد الکترونه لکه اوبه زن الکترون ($e^-_{aq} = \text{Aqueous}$)، پروټونه H^+ ، او ځيني نور مثبت او منفي چارج شوي کمپلکس بيوماليکولونه لکه داوبو يو ايونايژ شوي مثبت ماليکول (H_2O^+)، هايډروجن پر اکسايډ (Hydrogen peroxide = H_2O_2)، د ازاد هايډروکسيل راديکال (OH^*) گروپ چې د يوه هايډروجن او يو اکسيجن اټوم څخه جوړ دی او د هايډروجن راديکال (H^*) منځ ته راځي. نوموړي راديکال چې ځيني يې د ازاد راديکال يانې خپلواک راديکال (free radical) په نامه سره هم ياديږي د سمبول د پاسه د يوه ستوري په علامه سره (*) په نښه کوو. ټول ازاد راديکال په لوړه کچه **کيمياوي فعاليت** لري دا ځکه چې په بهرني مدار کې طاق (odd) شمير الکترونه لري او له دې کبله د شاوخوا غرو بيوماليکولوسره يو الکترون شريک کوي او په اخير کې کيمياوي اړيکې منځ ته راځي. په پايله کې همدغه عضوي مرکب د تړون يو الکترون دلاسه ورکوي او سمدلاسه تجزيه کيږي او په دې ډول خپل بيولوژيکي اغيزمنتوب او اهميت بايلي. په ۲۵- جدول کې نوموړي راديکال په مفصل ډول سره تشرېح شوي دي.




۵۹- شکل: په بدن کې دالکترومقنا طیسي وړانگو فزیکي ، بیوکیمیاوي او بیولوژیکي هراړخیزې اغیزې بنودل ښوي دي. دپام وړ ده چې دورانگو کلینیکي اغیزې د ثانیو څخه تر کالونو پورې وخت نیسي اوله دې کبله دطبیعي نورو ناوړه اغیزوسره دهغوي توپیر ثبوت کول ډیر سخت تمامیږي.



 a) proton e)Hydrogen ion H^+ 260K	د هایدروجن اتوم مثبت ا یون یا نی یو پروتون
 c)Hydrogen radical $H\cdot$	د هایدروجن اتوم یو رادیکال چې په باندني مدار کې یو نا جوت الکترون لري
 { 9 positive charges 10 negative charges shells are full no unpaired electron d)Hydroxyl ion OH^-	دهایدروکسیل منفي ايون چې مدارونه يې په نهو مثبت چارجونو او لسو منفي چارجونوباندې ډک شوي دي او له دې کبله یو ناجوت الکترون نه لري.
 { 9 positive charges 9 negative charges an unpaired electron b)Hydroxyl radical $\cdot OH$	دهایدروکسیل رادیکال چې په مدارونو کې نهه مثبت چارجونه او نهه منفي چارجونه لري او په باندني مدار کې یو ناجوت الکترون لري
 a)Solvated electron e_{aq}^-	داوبو سره دورانگودغبرگون په ترڅ کې لومړی یوازاد الکترون منځ ته راځي چې بیا ډیر زرد اوبوخلورومالیکولوڅخه احاطه (ایسار) کيږي او له دې کبله ورته اوبه زن الکترون (Solvated) هم ویل کيږي.


۲۵- جدول: کله چې وړانگې داوبو سره غبرگون وکړي نو په پایله کې ازاد رادیکال، مثبت او منفي چارج شوي مالیکولونه منځ ته راځي چې په پورتنیو شکلونو کې ښودل شوي دي (15) .

په ۶۰- شکل کې داوبوسره دورانگو دغبرگون او تجزيي په پایله کې هر اړخیز کیمیاوي کړنلاري ښودل شوی دي چې په پایله کې تعامل کوونکي مرکبونه ورڅخه پیدا کيږي. نوموړي کړنلاره د رادیو لایز (Radiolys) په نامه سره یادېږي په نوموړي تجزيه کې د سولوبنډ الکترون (Solvated electron) او یا په بل عبارت د اوبه زن الکترون e_{aq}^- اهمیت د یادول وړ دي چې داوبو څلورومالیکولوڅخه احاطه شوی دی. نوموړی یو ازاد الکترون دی چې د اوبومالیکول ډیر مثبت چارج شوي هایدروجن اتوم ته ډیر وړ نږدې دي او ډیر منفي چارج شوي نایتروجن اتوم څخه لرڅه په لیرې



واتن کې پروت دی. همدا سبب (لامل) دی چې داسې یو اوبه زن الکترون بریښنايز ډیپول یانې دوه قطبه (Dipole) خا صیت ځانته غوره کوي او دکیمیایي هر اړخیزو فعال تعاملونو مسئول ګڼل کیږي. څرنګه چې خپلواک رادیګال په ځانګړي توګه داسې خواص لري چې په لوړه کچه دنورویو مالیکولوسره دیوه پایښت لرونکي کیمیایي تعامل سبب (لامل) ګرځي نو له دې کبله کولای شي چې په یوه حجره (ژونکه) کې مهمو مالیکولونو لکه ډي این ای DNA په مالیکول کې بنسټیز بدلون راولي. داوبو رادیولایز ګرځولاره په ۳۸- شکل کې ښودل شوې ده.

دحجرې ډي این ای DNA ته د زهرجنو خپلواکو رادیګالو بیالوژیکي زیان دورانګوانرژي دوز سره سم سیخ متنا سب ده. هر څومره چې ډیر خپلواک رادیګال دورانګوپه واسطه منځ ته راځي په همغه کچه د سرطان یوې حجرې د پیدا کیدلو احتمال هم زیاتېږي. د بېلګه په ډول لکه د OH^* رادیګال چې یو ډیر پیاوړی او زورور کساید کوونکی خاصیت لري او له دې کبله په آسانی سره د هایډروجن یو اټوم د ډي این ای DNA مالیکول څخه را وباسي او په پایله کې د نوموړي مالیکول د شکر و اوفوسفات (Sugar phosphate) تر منځ اړیکې پرې کیږي.




دورانګو په لګیدلو سره داوبو یو مالیکول ایونایز کیږي او په پایله کې داوبو مالیکول یو مثبت ایون او یو خپلواک الکترون منځ ته راځي. دغه خپلواک الکترون بیا وروسته د اوبو څلورو مالیکولو څخه احاطه کیږي او یو بریښنايز ډیپول (Dipole) ورڅخه جوړیږي. نوموړی الکترون ته له دې کبله اوبه زن الکترون هم ویل کیږي (e^-_{aq}).

داوبو مالیکول یو مثبت ایون تجزیه کیږي اود هایډروکسیل رادیګال OH^* اود هایډروجن مثبت یون H^* منځ ته راځي.

یو خپلواک الکترون داوبو مالیکول سره کیمیایي تعامل کوي اود هایډروکسیل منفي ایون OH^- اود هایډروجن یو رادیګال H^* منځ ته راځي.

۶۰- شکل: په دغه شکل کې داوبو یوه مالیکول سره د الکترو مقناطیسي وړانګود نه سم سیخ اغیزې ګرځولاره ښودل شوې ده چې په پایله کې داوبو یو مالیکول په چارج شوو ایونو او خپلواکو رادیګالو تجزیه کیږي. په یوه بیالوژیکي ماده کې دورانګو نوموړي اغیزه د رایو لایز په نامه سره یادېږي (Radiolysis) چې په لاندې پړاوونو کې ویشلای شو (۷).



- **په لومړي پړاو کې** یو فوټون داوبوپه یوه خنثی مالیکول باندې لګیږي کوم چې د ۶۰- شکل په پاسنۍ برخه کې ښودل شوی دی. د ایونیزیشن څخه وروسته یو الکترون او داوبومثبت چارج شوی مالیکول (H_2O^+) لا س ته راځي.
- **په دوهم پړاو کې** داوبو مثبت چارج شوی مالیکول یا ایون په خپل وار سره تجزیه کيږي او دهایدروجن اتوم مثبت ایون او یو اکساید کونکی هیدرواکسیل رادیکال مالیکول ($\text{HO}^\bullet$) منځ ته راځي.
- **په اخري پړاو کې** همغه خپلواک شوي الکترون د اوبو یوه بل خنثی مالیکول سره یوځای کيږي او دهایدروجن یو رادیکال او هایدرواکسیل منفي چارج شوی ایون ورڅخه لا س ته راځي. برسیره پردې دهایدروجن یو مالیکول H_2 هم منځ ته راتلای شي چې بیا نوموړی په خپل وارسره دیوه اکسیجن O_2 مالیکول سره هایدروجن پراکسید H_2O_2 جوړوي چې دورانگو دزیان کچه نوره هم پیاوړې کوي. داوبو رادیولایزکیمیاوي معادله په لاندې ډول لیکلای شو.


$\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{OH}^\bullet + \text{H}^\bullet$	داوبو مالیکول چاودنه
$\text{OH}^\bullet + \text{OH}^\bullet \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$	دهایدروجن پراکساید جوړښت
$\text{H}_2\text{O}_2 + \text{OH}^\bullet \rightarrow \text{HO}_2^\bullet + \text{H}_2\text{O}$	د اوبومالیکول او یو رادیکال جوړښت
$\text{HO}_2^\bullet + \text{HO}_2^\bullet \rightarrow \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}_2$	د اکسیجن او دهایدروجن پراکساید جوړښت
$\text{HO}_2^\bullet + \text{OH}^\bullet \rightarrow \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$	د اکسیجن او د اوبو مالیکول جوړښت

په نه عضوي مرکباتو کې دورانگوکیمیاوي اغیزې

د بدن ډیرنه عضوي مرکبات دورانگودغبرگون په پایله کې په اکساید بدلیږي. د بېلګه په ډول په وینه کې دوه قیمتې اوسپنې Fe^{++} په درې قیمتې اوسپنې Fe^{+++} اوږي. نوموړې کړنلارې ته **کیمیاوي ډوزیمېټري** **Chemical Dosimetry** هم ویل کيږي چې د لومړي ځل لپاره د یوه جرمني کیمیا پوه Fricke له خوا رابرسیره او کشف شوه.



نوموړې کیمیاوي ډوزیمېټري په درملنه کې دورانگودناوړه اغیزو په پیژندنه کې خورا اړین رول لري. د بیلګې په ډول نوموړې تګلاره د بدن په وینه کې داوسپنې ډاکساید کولو په کړنلاره کې خورا ډیر کارول کيږي. کله چې وړانګې په یوه مایع کیمیاوي مرکب ولګیږي نوخنثی اتومونه په الکترونو اوایونو تجزیه کوي. یوه داسې ازادشوی الکترون ته ثانوي الکترون هم وایي اوپه مایع چاپیریال کې دګڼ شمیرغبرگونوپه پایله کې هر ځل لږبرخه حرکي انرژي دلاسه ورکوي. دبیلګه په ډول داوبومالیکول دایونایزیشن لپاره لږ څه 13 eV اود تحریک لپاره لږ څه 7 eV انرژي ته اړتیا شته.



په عضوي مرکباتو کې دورانگوکيمياوي اغيزې


پيرعضوي مرکبات شته دي چې دورانگودغبرگون په پايله کې په اکسايډ بدليږي او دهايروجن اتومونه دلاسه ورکوي. هغه راډيکال چې په نوموړي کړنلاره کې منځ ته راځي کولای شي چې د گڼ شميرنورو کيمياوي تعاملاتو د پيل سبب (لامل) وگرزي. د بېلگه په ډول دالکولوکړنلاره Dehydration، دامينو اسيد کړنلاره Desamination او په تيره بيا هغه امينو اسيد چې د SH-Group گروپ ورسره تړلی وي لکه Cystein او Cystamin او نور چې د هېواد اکسيجن سره کيمياوي تعامل کوي او له دې کبله دورانگو اغيزې په ثبوت رسېدلای شي. داځکه چې نوموړي اسيد دلاندني کيمياي تعامل سره سم په ډيره اسانۍ سره په اکسايډ بدليږي.




په نوموړي کيمياوي تعامل کې ډيسلفايد او اوبه منځ ته راځي. د دغه رنگه کيمياوي تعامل څخه په درملنه کې د وړانگو څخه دځان ساتنې په موخه گټه اخيستل کيږي. د بېلگه په ډول دغه او ځينې نور مواد شته دي چې د وړانگو دخطر دمخ نيوي او دځان ساتنې په موخه خلکو ته د پروفېلاکس Profelax په ډول ورکول کيږي. داځکه چې نوموړي مواد هغه ناوړه راډيکال چې دورانگو په واسطه منځ ته راغلي وي لکه OH^- گروپ ځان ته رانيسي او نه پريږدي چې نورې بيالوژيکي ناوړه اغيزې ترسره کړي او يا بيوکيمياوي تعاملونه دعضوي مرکبونوسره جوړکړي.

د حجري جوړښت (Cell structure)

د بدن اود هرې بيالوژيکي مادې بنسټيز واحد حجره (ژونکه) جوړوي. په ٦٠- الف شکل کې د بدن يوې نورمال او روغې حجري جوړښت ښودل شوی دی. يوه حجره (ژونکه) د يوه ميمبران يا غشا، يوې هسته اوسيتو پلازما څخه جوړه ده. په هسته کې يو کنترول کوونکی سيستم شته دی چې دهستي (nucleus) په نامه سره ياديږي.



٦٠- الف شکل: د بدن يوې نورمال حجري (ژونکې) جوړښت (9)



👉 یوه حجره (ژونکه) لږ څه اتیا په سل 80% کې داوبوڅخه جوړه شوی ده او پاتې شل په سل 20% کې بیالوژیکي کمپلکس مرکبونه لکه پروتیین اوازاد کاربوها یدرات تشکیلوي.

👉 دیوه ستر سړي په بدن کې دبلگه په ډول لږ څه پنځوس تریلوینه (10^{18}) حجرې اټکل کيږي

دحجرې په هسته کې یو ډیرمهم مالیکول شته دی چې د ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید (Deoxyribonucleic acid) په نا مه سره یادېږي او لنډیز یې په ډي این ای (DNA) سره کيږي. نوموړی نامتو مالیکول د حجرې جوړښت، دحجرې د میتوزیس (Mitosis) یا نې د ویشتوب کړنلاره اودحجرې د ژوند هر اړخیزې نورې دندې کنترول کوي. د نوموړي مالیکول ډیره اړینه (مهمه) دنده د بېلگه په ډول د خپل ځان کټ مټ یو شان یوه کاپي کول د یا دونې وړ ده. په ۶۱- شکل کې د ډي این ای مالیکول شودل شوی دی چې د کروموزوموپه منځ کې دڅو غزول شوو برخو په بڼه پروت دی.





Figure 2.5. Illustration of the relative sizes of the DNA helix, the various stages of folding and packing of the DNA, and an entire chromosome condensed at metaphase.

۶۱- شکل: دحجرې یوکروموزوم اود ډي این ای هیلیکس (DNA helix) نسبي غټوالي کچه او همدارنگه ډي این ای توپیر لرونکي تاوشوي او غونډ شوي پړاونه ښودل شوي دي. دبیلگي په ډول د پاس نه ښکته خواته: دوه نانومتر $(2\text{nm} = 2 \times 10^{-9} \text{ m})$ ، یوولس نانو متر، درې سوه نانومتراو لاندنی کروموزوم پخپله یوزرو څلورسوه نانومتر غټوالی لري (26)..

👉 د پاس نه ښکته خواته:

۱- د ډي این ای غبرگ تاوشوي مزي یوه کوچنی برخه ۲- کروماتین ۳- دکروموزوم یوه غوړیدلې برخه ۴- په لاندنی برخه کې د مېټا فزیوېشپړ کروموزوم ښودل شوی دی. دنوموړي شکل په شی خوا کې دویکتورونو (غشی) په مرسته سره د کروموزوم او د ډي این ای DNA غټوالي په واحد دنانو متر $(\text{nm} = 10^{-9} \text{ m})$ سره ښودل شوی دی (28) .



د انسان په بدن کې دوه ډوله حجرې شته دي چې د ویشټوب او ډیر بڼت په اړوند د یوه بل څخه توپیر لري.

لومړۍ: بدني یا سوماتیک حجرې (Somatic cells)
دویم: جنسي یا جنېټیک حجرې (Genetic or germ cells)

د بدني حجرو ویشټوب ته میتوزیس (Mitosis) او د جنسي حجرو ویشټوب ته مایوزیس (Meiosis) ویل کیږي. کله چې یوه بدني حجره (ژونکه) په دوه برخو وویشل شي نو دوه نوې حجرې منځ ته راځي چې هره یوه حجره (ژونکه) د اصلي حجرې په شان کټ مټ یوشان کروموزوم لري. دانوې پیداشوې حجرې بیا په خپل وار او د اړتیا سره سم نور هم خپل ویشټوب ته پایښت ورکوي. بدني حجرې په لاندې ډول سره ویشل شوي دي.



لومړۍ: د سټم حجرې (Stem cells). نوموړې داسې بدني حجرې دي چې د سټي حجرې په بڼه یې تعبیر کولای شو او په لومړي سر کې په خپل منځ کې سره یو شان اودیوه او بل څخه توپیر نه لري او برسیره په دې د لا یتنا هې ویشټوب وړ تیا لري. هغوی کولای شي چې نورې نوې سټم حجرې منځ ته راوړي او بیا د هغوی څخه د ویشټوب وړ نورې توپیر لرونکې حجرې او نسجونه چې ځانګړي دنده په غاړه اخلي تو لید کړي. د بېلګه په ډول لکه د ویني جوړونکي سټم نسجونو حجرې چې د هډوکوپه ماغزو کې پرتې دي (Bone marrow hematopoietic stem cells)، د پوستکي سټم نسجونو حجرې، د معدې موکوز پوستکي سټم نسجونو حجرې

دویم: تیرېدونکې حجرې (Transit cells): نوموړې داسې حجرې دي چې د ویشټوب په کړنلاره کې د یوه ډول حجرې ډلې څخه په بل ډول حجرو باندې اوږي. د بېلګه په ډول لکه یو رېټیکولوخیټ (Reticulocyte) چې د ویني یوه اومه (Immature) حجره (ژونکه) تشکیلوي په اخیرکې د سروکرویاتو په یوه پخه حجره (ژونکه) (erythrocyte) باندې اوږي.

درېم: پخې شوي حجرې (Mature cells): نوموړې هغه ډله حجرې دي چې پوره پخې شوې دي او اضافه نوره ویشل کیږي او نه په نورو توپیر لرونکو حجرو اوږي (Fully differentiated). د بېلګه په ډول لکه د عضلاتو حجرې او د عصبي سیستم حجرې.

په بدن کې څلور ډوله مهم نسجونه دیادولو وړ دي:

د بېلګه په ډول لکه د اعصابو نسجونه، د عضلا تونسجونه، اپیټېل نسجونه (Epithel tissue) او پاسته نېنلرونکي نسجونه شته دي. نوموړي نسجونه په خپل وار سره ځانګړي غړي جوړوي چې خپله ټاکلې دنده تر سره کوي. د نوموړو غړود حجرو د ویشلو او ډیرښت موده او کړنلاره د یوه او بل سره توپیر لري. د بېلګې په ډول د اعصابو حجرې د سړي د زیریدلو څخه وروسته بیا ګرد سره نه ویشل کیږي او د بلي خوا په بدن کې داسې حجرې هم شته چې د څو ساعتونو څخه وروسته ویشل کیږي او د اړتیا سره سم نوې حجرې منځ ته راوړي.



دحجرې گرزیدونکي پړاونه (Cell cycles)

۶۲- شکل: دوخت په تړاود یوې حجرې را گرزیدونکی پړاونه یا دوره (Cell cycles) په لاندنیو تورو لکه (G; S; M) باندې ښودل شوي دي. د G_1 پړاوپه پیل کې دویشتوب یانې ډیرښت اړتیا تر غورلاندې نیول کیږی او بیا ور باندې پریکړه کیږي. دنوموړي پړاو په اخیر کې یوه بله برخه شته ده چې دازموینې ټکی ورته ویلای شو (G_1 -Checkpoint) او دلته یوځل بیا دپوښتنې ازمویل کیږي چې(7):

دې. این. ای. (DNA) خو به زیانمن یا نیمگړی نه وي؟

حجره(ژونکه) پخپله په کافي اندازه سره غټه ده؟

دحجرې چاپېریال دژوند په تړاو پوره مسا عد خواص لري؟

د G_0 څخه د G_1 پړاو په تیریدلو کې دا پوښتنه را پورته کیږي چې :

دحجرې وېشتوب ته اړتیا شته ده او که نه؟

کله چې د G_2 پړاوپیل کیږي نولاندې پوښتنې تر سره کیږي:


په اصلي توگه د دې این ای کټ مټ کاپي کیدل Replication په بریالیتوب سره تر سره شوه؟

حجره(ژونکه) پخپله په کافي اندازه سره غټه ده؟

دحجرې چاپېریال دژوند په تړاو پوره مسا عد خواص لري؟


د پام وړ:

یوه حجره(ژونکه) د میتوز M او د G_1 په پړاو کې دورانگو، دواگانواو کیمیاوي ذهرجنوموادو په مقابل کې ډیر حساسیت لري خو د S په پړاو کې دورانگو سره بیا دومره زیات حساسیت نه لري اوله دې کبله مقاومت (Resistant) هم نه ښیي .



👉 **کله چي ايونايژکونکي وړانگي د بدن په يوه حجره (ژونکه) ولگيږي نو لاند نې بياالوژيکي هر اړخيزي اغيزې منځ ته راتلاي شي.**

- ☢ په بياالوژيکي ماده کې وړانگې هيڅ ناوړه اغيزې منځ ته نه راولي
- ☢ د وړانگو اوبياالوژيکي مادې ترمنځ يوفزيکي غبرگون تر سره کيږي چې په پايله کې ماليکولونه ايونايژکيږي او يا دکولومب قواو په اساس اتومونه په **تحريک (پا رولو)** راځي. دنوموړې فزيکي کړنلارې څخه بيا وروسته بياالوژيکي اغيزې پيل کيږي. د بيلگه په ډول کله چې ديورانايوم الفا يوه ذره د يو چا بدن ته ننوځي او هلته د نسجونو سره غبرگون وکړي او خپله ټوله انرژي د لاسه ورکړي نو په دې ترڅ کې دحجروماليکوسره لږڅه سل **ذره ټکرونه** تر سره کوي.
- ☢ د حجرې په منځ کې هر اړخيز زهرجن مواد منځ ته راځي او له دې کبله مهم **انزايمونه** خپله دنده پوره نه شي تر سره کولای او حجره (ژونکه) د منځه ځي
- ☢ **حجره (ژونکه) خپل ژوند دلاسه** ورکوي دا ځکه چې دورانگو دناوړه اغيزې په پايله کې په کروموزومو کې نه جوړېدونکي موتېشن صورت نيسي او له دې کبله د حجرې دتنفس کولوپروسه په تېه دريږي کوم چې دکروموزوم په واسطه کنترول کيږي (**Apoptosis**).
- ☢ حجره ژوندۍ پاتې کيږي خو په کروموزومو کې د **موتېشن (Mutation)** نيمگړتيا د ټاکلو انزايمو په مرسته پوره نه جوړيږي او په خپل حال پاتې کيږي اوله دې کبله نوموړې نيمگړتيا دميتوز په کړنلاره کې د بدن د اړتيا وړحجروپه پوره کولوکې منځ ته راځي.
- ☢ که وړانگې په جنسي حجروکې موتېشن راولي نو راتلونکو نسلونو ته نوموړې نيمگړتيا انتقال کيږي چې د هر اړخيزو ناروغيو او **عيبناکو اولادونو** د زيږيدلوسبب (لامل) کړځيدلای شي.
- ☢ دميتوز کړنلاره دورانگو دغبرگون په اساس خپل نورمال سرعت د لاسه ورکوي او په تېه دريږي نو له دې کبله دارتيا وړ نوې حجرې منځ ته نه شي راتلاي (**No Regeneration**).
- ☢ **باې ستنډر اغيزې:** (**Bystander effects**) دورانگو يوه داسې اغيزه ده چې رڼا شوې حجرې کولای شي چې گاونډيو هغو حجرو ته هم زيگنلا لونه واستوي کوم چې هيڅ رڼا شوې نه وي. په پايله کې په همدغو نه رڼا شوو حجرو کې هم مو تېشن منځ ته راتلاي شي.
- ☢ دورانگو په مقابل (مخامخ) کې د وينې حجروجوړونکي سيستم لکه د پلنوهوکو سره مازغه ، جنسي حجرې ، د لومفا تيک غدو حجرې (**lymphatic glands cells**) د بدن نورو حجرو په پرتله زيات حساسيت ښيي.
- ☢ ايو نايژکونکي وړانگې داسې څپې لري چې د بياالوژيکي مادې اتومونه په اهتزاز (لرزيدنه) (**Vibration**) نه شي راوستلای او له دې کبله په حجره (ژونکه) کې د تودوخې درجه په ډيره لږ کچه پورته ځي. د بيلگه په ډول دکوبالټ سرچينې يو گري وړانگې لږ څه يو په زمره برخه د سانتي گراد تودوخې لوړوي. دغه فزيکي اغيزه دورانگوداندازه کولولپاره مساعده نه ده.
- ☢ په يوه بياالوژيکي ماده کې دورانگو ناوړه اغيزې په لاندنيوفزيکي او بياالوژيکي کميتونوپورې هم اړه لري. د بيلگه په ډول لکه دورانگودول، د چاپېريال جوړښت، دورانگو انرژي کچه، دحجرو په حساسيت، دحجرې راگرزېدونکي پړاونه (**Cell cycles**) اونور.




unbegrenzte Teilungsfähigkeit erhalten, Kolonie Mitotod Interphasetod Differenzierung	A : حجره (ژونکه) ژوندی پاتې کيږي خودسرطان په یوه حجره (ژونکه) اوږي. دا په دې مانا چې د ویشتوب کړنلاره په تپه نه دريږي او بې شمیره لورگاني حجرې (Daughter cells) منځ ته راځي چې په پایله کې یوه غټه کولوني (colony) ورڅخه جوړيږي. د میتوز په کړنلاره کې هره یوه حجره (ژونکه) ویشل کيږي او د خپل ځان کټ مټ یو شان اوکاپي شوي دوه نوي حجرې منځ ته راځي. B : حجره (ژونکه) په لومړي پړاو کې د میتوز کړنلاره تر سره کوي خو د نوو پيدا شوو دوو حجرو څخه یوه مړه کيږي (†) او بله یې دوه ځله نور هم د میتوز وړتیا تر لا سه کوي او په پای کې ټولې لورگاني حجرې د منځه ځي. C : د میتوز کړنلارې په ترڅ کې حجرې دمنځه ځي. D : حجره (ژونکه) خپل رېښتونی جوړښت د لاسه ورکوي او بڼه یې دا سی اوږي چې خپله اصلي دنده نه شي تر سره کولای. نو له دې کبله دځان وژني لاره غوره کوي.

په ۶۳- شکل کې د بدن یوې حجرې هر اړخیز برخلیک (سرنوشت) ښودل شوی دی کله چې د ایونایزکونکو وړانگو تر تشعشع یانې رڼا (Irradiation) لاندې راشي (7) .

د وړانگو په واسطه د یوې حجرې دمنځه تللو ډولونه


کله چې وړانگې په یوه حجره (ژونکه) ولگيږي نو د هغوي څخه ډیرې حجرې سمدلاسه نه مري بلکه همداسې فعال پاتې کيږي او یو څو ځله نور هم دخپل و ویشتوب کړنلاره تر سره کوي. یوه حجره (ژونکه) په درې ډوله سره خپل ژوند دلاسه ورکوي چې په ۶۴- شکل کې ښودل شوي ده.

➤ **نېکروزیس (Necrosis) :** حجره (ژونکه) خپله دنده نه شي تر سره کولای اوله دې کبله پروتین او انزایم هم نه جوړيږي. په پایله کې د حجرې پوښ مېمبران (Cell membrane) دمنځه ځي او ټول مواد ورڅخه دباندې راوځي.



➤ **اپوپتوزيس (Apoptosis):** نوموړې کړنلاره د حجرې پروگرام شوي ځان وژنې په نوم سره يادېږي. د اپوپتوزېوله ځان وژنه د يوه ټاکلي جين په پريکړه سره چې په کروموزومو کې ځای لري تر سره کېږي او له دې کبله د حجرې مېمبران په پيل کې دمنځه نه ځي.

➤ **کلونوژېنيک مړينه (Clonogenic death):** د سرطان په حجرو کې يو په سل برخه داسې حجرې شته دي چې هغوي تر مخه د يوې ځانگړې حجرې څخه دويشتوب په کړنلاره سره منځ ته راغلي دي او د يوې بلې سره په جنېټيک ډول بيخي يوشان دي. نوموړې حجرې داسې خاصيت لري چې دويشتوب کړنلاره يې لايټناهي (بې کچې) دوام لري. خو کله چې دويشتوب لايټناهي وړتيا د لاسه ورکړي نو په کلينيکي تړاو ورته کلونوژېنيک مړينه ويل کېږي.





٦٤- **شکل:** په پورتنۍ شکل کې د وړانگو د غبرگون په پايله کې د يوې حجرې د منځه تللو دوه کړنلارې بندول شوي دي چې يوه يې د ځان وژنې يانې **اپوپتوزيس (Apoptosis)** او بله يې د **نيکروزيس (Necrosis)** په نامه سره يادېږي.

☑ د ځان وژنې په کړنلاره کې د حجرې د منځ څخه اوبه دباندې راوړي (Dehydration) او بيا حجره (ژونکه) پخپل ځان کې سره ننوځي. په پايله کې په کوچنيو ټوټو (Fragments) تجزيه کېږي.


☑ د نيکروزيس په کړنلاره کې پخپله حجره (ژونکه) او ميتوكوندريوم (Mitochondrion) پړسېږي او بيا ورپسې د پلازما مېمبران يانې غشا پري کېږي.

يادونه: د بدن يوه نورمال حجره کولای شي چې د ټول عمر په موده کې په اعظمي توگه تر 70 ځلو پورې خپل ځان وويشي. د سرطان حجره دهغوزيگنالونو څخه سرغړونه کوي چې د حجرې په جينوکې دويشلو شمير کنترول کوي. دا په دې مانا چې د سرطان حجره په خپل سر او بې شميره ځان وويشي.




۶۵- شکل: په یوه بیالوژیکي ماده کې دورانگواغیزه (Radiation effects) دپورتنيو یادشوو بیوفزیکي کمیتونو سره سم سیخ تر اولري.

- ☠ **دورانگو ډول:** لکه الفاء، بیتا، گاما، نیوترون، پروتون او کازمیکي وړانګې
- ☠ **د انرژي ډوز:** لکه د لوړې کچې انرژي چې د یو سیورټ ($> 1\text{Gy}$) نه پورته قیمت ولري او د ټیټې کچې ډوز چې د دوه نیم سوه ملي سیورټه ($< 250\text{ mSv}$) څخه ټیټه وي.
- ☠ **د چاپېریال اغیزه:** لکه رادیواکتیو مواد، کیمیاوي او بیالوژیکي زهرجن مواد، تودوخ، فشار
- ☠ **د حجرو حساسیت:** لکه د میتوز په پړاو کې دورانگو او کیمیاوي دواگانو پمقابل کې د حجري حساسیت او غبرگون دنورو پړاونو په پرتله ډیر لوړ وي
- ☠ **دوخت په اړوند په نسجونو کې دورانگو ویش او په نسجونو کې د انرژي ډوز وځایزویشتوب.**



دورانگو سم سیخ او نه سم سیخ غبرگون

کله چې ایونایز کونکي وړانگي د بدن په حجرو ولگيږي نو د دوه ډوله بیوفزیکي کړنلارو په بنسټ هغوي ته زیان رسولای شي چې یو یې د سم سیخ (direct action) او بل یې د نه سم سیخ (indirect action) غبرگون په نامه سره یادېږي او په ۶۶- شکل کې شودل شوی دی.




۶۶- شکل: د کروموزومو ډي این اې (Deoxyribonucleic acid = DNA) په برخه کې د ایونایزکونکو وړانگو سم سیخ (direct action) او نه سم سیخ (indirect action) غبرگون ښودل شوی دی (26).

لومړۍ: دورانگو سم سیخ یا مستقیم غبرگون (Direct action)

په نومړې فزیکي کړنلاره کې یوفوتون سم سیخ د ډي این اې DNA په مالیکول باندې لگيږي اوسمدلاسه د ایونایزیشن پروسه صورت نیسي او ورپسې یو کیمیاوي بدلون منځ ته راځي. دغه ډول فزیکي کړنلارې ته دورانگو سم سیخ غبرگون یا اغیزه ویل کیږي.

د فوتون وړانگي د کروموزومو خنثی اتومونو او مالیکولونو ته سم سیخ دومره ډیره انرژي انتقال کوي چې د خپل مدار څخه بیخي راوځي او په دې توګه یو یا څو الکترونه ورڅخه جلا او یایې ور با ندي ډیر و لای شي او په پایله کې اتوم په مثبت او یا منفي چارج شوي ایون بدلیږي. په یوه داسې فزیکي کړنلاره کې چې د ایونایزیشن په نامه سره یې دیري ایونایزکونکي وړانگي خپله یوه برخه انرژي د لاسه ورکوي. که چیرته د فوتون وړانگي د اتوم الکترونونو ته یوازې دومره انرژي انتقال کړي چې دنني مدار څخه باندني لوړ پوړي مدار ته وځي نو دغه رنګه عمليې ته لمسون (Excitation) ویل کیږي.

دپام وړ: دانرژي جذب کیدل او بیالوژیکي وروستی اغیزې دواړه په همغه بیو مالیکول کې صورت نیسي چې په پایله کې د بیو مالیکول د ایونایزیشن او تحریک کیدلو سبب (لامل) ګرزي.



دویم: دورانگو نه سم سیخ یا غیر مستقیم غبرگون (Indirect action)

په نوموړي فزیکي کړنلاره کې لومړۍ یو فوتون د حجرې د اوبو یومالیکول سره غبرگون کوي او یوازې هایدروکسیل (HO) مالیکول منځ ته راځي. نوموړی مالیکول بیا په خپل وار سره د دې این ای مالیکول DNA سره کیمیاوي تعامل تر سره کوي. دغه ډول فزیکي کړنلارې ته دورانگو نه سم سیخ اغیزه ویل کیږي.



د فوتون وړانګې خپله انرژي سم سیخ نه بلکه غیر مستقیم دنورو رادیکالوپه مرسته ګاونډیو بیالوژیکي مالیکولو ته انتقال کوي. په دې اړوند په بدن کې داوبو د تجزیې کړنلاره دنوموړو وړانگو نه سم سیخ اغیزې یو وتلي بېلګه کیدای شي چې په ۶۰ شکل کې ښودل شوی ده.

دورانګوسم سیخ او نه سم سیخ اغیزوکلینیکي پایله

دورانګو نوموړې سم سیخ او نه سم سیخ فزیکي، کیمیاوي او بیالوژیکي اغیزې د بدن په میتا با لیزم کې دومره ناوړې بدلون راوستلای شي چې د ځینو غروګن شمیر حجرې هغوی ته د وررسیدلي زیان له مخې یا داچې خپله دنده په بشپړ توګه سرته نه شي رسولای او یا داچې بیخي د منځه ځي. د ایونایزکونکو وړانګو دغه ناوړه اغیزې په تیره بیا په هغو حجرو باندې پیرې دي څومره چې په هغوي کې د میتوز (Mitosis) یانې ویشني کړنلاره پیره وي. د بېلګه په ډول دویني سپین کرویات، جنسي حجرې او نور. خو دنوموړو حجرو په پرتله دزره عضلاتو حجرې، د اعصابو سیستم حجرې د ټول عمر په اوږدو کې نه ویشل کیږي یانې د میتوز پروسه صورت نه نیسي او له دې کبله نه نوي کیږي. د بدن دنورو غړو ټولې حجرې د پینځه کالو څخه وروسته بیخي نوې کاپي کیږي. **دا په دې مانا چې پینځه کاله وروسته د هر سړي څخه یو نوی سړی جوړیږي.**

کله چې د یوې حجرې یوه مهمه برخه د بېلګه په ډول لکه دې این ای پخپله د چاپیریال د زهرجنو او خطرناکو موادو لکه د کیمیاوي زهرجنو موادو، د چاپیریال وړانګو، د چاپیریال تودوخي اونورو تر ناوړو اغیزو لاندې راشي نودهمغې حجرې په دنده کې یو ژور بدلون راوستلای شي. که څه هم دغه زیان په لوموړي وخت کې یوازې په همغه یوه حجره (ژونکه) کې پروت وي خو دوخت په تیریدلو سره همدغه زیان بیا لوموړۍ همغه غړۍ ته او بیا وروسته د بدن نورو غړو او برخوته مخ په وړاندې ځي. دا ځکه چې زیانمن شوې حجرې دیوې خوا د بدن اړتیا نه شي پوره کولای او دبلې خوا د ویشلو دکنترول دنده د لا سه ورکوي. د چاپیریال د نوموړو موادو ناوړه اغیزې ددې سبب (لامل) ګرزیدلای شي چې په همغه یوه حجره (ژونکه) کې دومره فیزیولوژیکي اومورفولوژیکي بدلون منځ ته راولي چې په پایله کې هر اړخیزې ناروغۍ لکه د سرطان ناروغۍ، دزره ناروغۍ، د بدن ددفاع سیستم کمزورتیا اونور منځ ته راتلای شي.


په ۶۷- جدول کې دایونایزکونکو وړانګوسم سیخ غبرګون Direct action او دورانګو نه سم سیخ غبرګون Indirect action ښودل شوی دی. دلویدونکو وړانګوبڼه په کړواوتاشووکړښودل شوي. هایدروجن ایون H^+ ، هایدروکسیل ګروپ OH^- او هایدروجن پر اکساید، دورانګونه سم سیخ اغیزو په پایله کې منځ ته راځي.



۶۷- شکل: د ایونایز کوونکو وړانگو سم سیخ اغیزی (Direct action) او نه سم سیخ اغیزی (Indirect action) ښودل شوې دي چې په پایله کې د بدن یوه حجره (ژونکه) خپله نیمګړتیا بیرته سمولای شي او یا داچې د سرطان په یوه حجره (ژونکه) اوږي (70).

تومور (Tumor) :

د بدن نسجونو هر ډول پړسوب (Swelling) او د حجم غټوالي ته تومور ویل کیږي. د بیلګه په ډول لکه التهاب (inflammation)، اویا څوېست cyst چې د حجروناسم کنټرول میکانیزم په پایله کې منځ ته راځي.





فزيکي، بيالوژيکي او کيمياوي تعاملونه	دوخت موده
دورانگوسم سيخ اغيزې : د فوتون وړانگې د يوه ماليکول سره غبرگون کوي او دا يونانيزيشن او هيجان فزيکي کرنلاري په پايله کې مثبت اومنفي ايونونه او خپلواک راديکال منځ ته راځي . دورانگونه سم سيخ اغيزې: د فوتون وړانگې د ډي اين اي DNA سره سم سيخ غبرگون کوي او د کروموزومو موتيشن سبب (لامل) گرزي.	د غبرگون موده يې د اتو (Atto) (10^{-18} s) ثانيو څخه تر لس مايکرو ثانيو پورې وخت نيسي .
د سم سيخ او نه سم سيخ غبرگون په پايله کې پيداشوي راديکال او ايونونه د حجرې د ماليکولوسره کيمياوي تعامل کوي اوله ډې لارې يوې حجرې ته زيان رسوي. د حجرې په هسته کې داسې انزايم اونورميکانيزم شته دي چې نوموړې نيمگړتيا بيرته د منځه وړي. که چېرته دغه نيمگړتيا پوره نه شي نودموتيشن په پايله کې لاندني پيښې منځ ته راتلاي شي. الف : حجره (ژونکه) خپل ژوند دلاسه ورکوي. ب : د بدن يوه حجره (ژونکه) زيانمنه کيږي او کيدای شي چې په راتلونکي وخت کې د يوې نا څرگندې ناروغۍ او يا د سرطان ناروغۍ سبب (لامل) وگرزي. ج : هغه چاته چې وړانگې رسيدلي وي دهغه په اولادونوکې يوه ناروغۍ منځ ته راتلاي شي.	ديوي دقيقې نه تر پيړيو پورې وخت نيسي


٢٦- جدول: په بدن کې د ايونايזکونکو وړانگو هراړخيزې فزيکي، بيوکيمياوي او راديوبيولوژيکي اغيزې دوخت په تيريدلو سره بنودل شوي دي.

په ٦٨ شکل کې بنودل شوي ده چې که د الفا يوه ذره د بېلگه په ډول لکه د رادون Radon غاز الفا ذره د سېري يوې حجرې د ډي اين اي DNA غبرگ تاوشوی تار پري کړی نو دورانگود يوې داسې ناوړه اغيزې په پايله کې د سرطان ناروغۍ د منځ ته راتلو احتمال ډير لوړ اټکل کيږي. په نوموړي شکل کې د سرطان يوې حجرې ډيپل کيدلو هراړخيز پړاونه شودل شوي دي.

داکسيجن مرکباتو لکه هايډروجن پر اکسايډ H_2O_2 بيرته فعال کيدل او د ډي اين اي DNA غبرگ هيلیکس پرې کيدل ددې سبب (لامل) گرځي چې دتومور مخه نيوونونکی جين P53 غير فعال شي او په پايله کې يو تومور (Tumor) منځ ته راشي. نوموړی پروتئين په ١٩٧٩ م کال کې David Lane et al له خوا ابرسیره شو او کله چې د ډي اين اي يوه برخه زيانمنه شي نو دهغه ځای جينودنده کنترول کوي.



۶۸- شکل: کله چې د الفا دوه ذرې په يوه حجره ولگيږي او هلته يوه ذره دېي اين اي غبرگ تار پري کړي او بله ذره په سيتو پلازما کې غبرگون وکړي نو په پايله کې دتومور مخه نيوونکی جين p53 **غیر فعال کيږي او له دې کبله** يو تومور (Tumor) منځ ته راځي .





په نوموړي موتیشن کې (P53) دحجرې په کروموزومو کې دجین یوداسې پروتین دی چې د **Tumorsuppressorprotein p53** په نامه سره یادېږي. د نوموړي پروتین مالیکولي وزن درې پنځوس کیلو ډالتن (53kD) اود اولسم کروموزوم **Chromosom 17** یوجین تشکیلوي. په ۱۹۷۹ م کال کې څیړنو په ډاگه کړه چې د نوموړي پروتین دتومور د منځ ته راتللو مخ نیوی کوي. د بېلگه په ډول:

➡ ۱- دحجرې دویشلویانې میتوز کنترول ۲- : کله چې دې این ای DNA کومې برخې ته زیان ورسېږي دهغې برخې بیرته جوړول ۳- : دارتیا په وخت کې حجرې ته د ځان وژنې زیکنال استول اونور.

تجربو وښودله چې نوموړي پروتین په هغو ناروغانو کې چې دسرطان په ناروغي اخته شوي وي پنځوس په سل کې نیمگړی شوی او زیانمن شوئوي نو له دې کبله په لابراتواري تگلاره کې د (P53) پروتین اندازه کول دناروغیوپه پیژندنه کې تر ټولو غوره ځای نیولی دی.

د پام وړ:

- یو جرمني بیالوژي پوه تیودور باوري Theodor Baveri 1862-1915 د نونسمی پېړۍ په پیل کې رابرسیره کړه چې که ددوکروموزومو تر منځ د جینو راکړه ورکړه وشي او بیا سره ویلي شي Translocation نوپه پایله کې دهمدغې یوې حجرې څخه دسرطان ناروغي پیل کیږي. داځکه چې نوموړي موتیشن ددې لامل (سبب(لامل)) گزري چې همدغه حجره کې دویشلویانې میتوزکړنلاره د کنترول څخه وزي اود اړتیا نه ډیرې نورې حجرې منځ ته راځي.
- دبیلګې په ډول هغه څوک چې د وینې سرطان په یوډول ناروغی اخته وي لکه (Chronic myel. Leucamia) نوتر نوي په سل ناروغانو کې دنهم کروموزوم یوه برخه د ددوه ویشتم کروموزوم سره اوبرعکس ددوه ویشتم کروموزوم دجین یوه برخه (Gen-Bcr) د نهم کروموزوم جین (Gen-Abl) سره ویلي شوې وي. دغه ډول نوی جین چې منځ ته راځي (Bcr-Abl) یو پروتین دی چې د فیلادلفیا کروموزوم (Philadelphia chromosome) په نامه سره یادېږي. په نوموړي کروموزوم کې(Bcr-Abl) یو پروتین یانې یو غیرعادی جین تشکیلوي چې د هډوکوپه ماغزو کې د وینې جوړونکي پیاوړي سټم حجرو Stem cells ته دا بلنه ورکوي چې خپل ځان وویشي اود اړتیا نه ډیرې حجرې تولید کړي.




کله چې په یوه حجره (ژونکه) کې د تومور Tumor مخه نیونکي پروتین P53 نیمګړی نه وي نو کله چې دې د DNA ته زیان ورسېږي بیا نوموړی پروتین فعال کیږي او کولای شي چې دغې ناروغې حجرې ته دځانمرګی زیګنال ورسوي

کله چې په یوه حجره (ژونکه) کې د یوه تومور Tumor مخه نیونکي پروتین P53 نیمګړی وي نو کله چې دې د DNA ته زیان ورسېږي بیا نوموړی پروتین نه فعال کیږي اوله دې کبله دتومورحجرې منځ ته راځي.


ځینې وایرسونه Virus هم پیژندل شوي دي چې په روغو حجرو کې نه بلکې یوازې په تومورحجرو کې ډیرښت مومي او په پایله کې هغوی دمنځه وړي. دنوموړی کړنلارې څخه ددرملنې په موخه کار اخیستل کیږي.

۶۹ - شکل: په پورتنۍ برخه کې ښودل شوي ده چې د Tumor suppressor protein p53 پروتین دسم کارکولو په حالت کې یوه ناروغه حجره (ژونکه) دمنځه وړي. دا ځکه چې نوموړی پروتین نه پرېږدي چې دغه ناروغه حجره (ژونکه) خپل ځان وویشي او ډیرښت ومومي. په منځنۍ برخه کې ښودل شوي ده چې که نوموړی پروتین نیمګړی وي (Abnormal P53) نو د سرطان یوه ناروغه حجره (ژونکه) دمنځه نه ځي او بې شمیره خپل ځان ډیرولاي شي. دا په دې مانا چې د p53 پروتین د نیمګړتیا په پایله کې یو تومور Tumor پیدا کیږي. داځکه چې دنوموړي پروتین په واسطه د میتوز کنټرول کوونکي دنده دمنځه ځي. دنوموړي شکل په لاندنۍ برخه کې ښودل شوي ده چې څرنگه یو وایرس (Virus) د روغې حجرې په ځای د سرطان یوې ناروغې حجرې دي. این.ای. ته ورننوځي او هلته ګڼ شمیر نور وایرسونه تولیدوي چې هغوي په خپل وار سره د سرطان پاتې حجرې د منځه وړي (38).



د پام وړ:

- په ۱۹۵۳ کال کې دوو برتانوي کارپوهانوهر یوه F.Crick او J.Watson د دې این ای DNA غبرگ تاوشوو تارونو اونوموړي مالیکول جوړښت د یوې فزیکي کرنلارې په مرسته سره چې ډاکسریز ډیفراکشن (X-Ray diffraction) په نامه سره یادېږي را برسيره کړ.
- نوموړوپوهانووښودله چې د یوې حجرې د ژوند ټول مالومات د دې این ای مالیکول په ټاکلو برخو کې خوندي اوپټ پروت دی چې د جین (Gene) په نامه سره یادېږي.
- داهم په ډاگه شوه چې په دې این ای کې دوه ډوله جین ځای په ځای شوي دي چې یو یې اونکو جین (Oncogene) او بل یې تومور سپرېسر جین (Tumor suppressor gene) په نامه سره یادېږي. نوموړي دواړه داسې دندې تر سره کوي چې اونکو جین د حجرې دویشتوب کرنلاره پر مخ بیایي او تومور سپرېسر جین د ویشتب کرنلاره په هغه وخت کې په تپه دروي چې نور اړتیا ورته نه لیدل کېږي. دا په دې مانا چې دواړه جینونه د یوه او بل په ضد کارکوي او د یوې حجرې دنورمال کارکولو لپاره ددواړو جینو د گډ او سم کار ډیر اړین دی ترڅو په دې ډول دحجرې د بې ځایه ډیرښت مخه ونیول شي.
- که چیرته دنوموړو دواړو جینونوترمنځ د موتیشن له کبله دغه تعادل دمنځه لاړ شي نو داونکو جین له خوا هڅه کېږي چې دحجرې ویشتب کرنلاره بې کنټروله مخ په وړاندې ولاړه شي او په پایله کې دسرطان ناروغی منځ ته راځي.
- که فرض کړو چې یوه حجره (ژونکه) د یوه موټر سره ورته ده نو داونکو جین دنده دغاز پیدال او دتومور سپرېسر جین دنده لکه دموټر بریک په ډول کارکوي. کله چې دموټر سرعت د خپل ټاکلي برید څخه واورې (اونکو جین ناسم کارکوي) نو د بریک (تومور سپرېسر جین) په مرسته سره موټر سوکه کېږي تر څو دسرک څخه د باندې وه نه وزي. خو کله چې په نوموړو جینونو کې موتیشن منځ ته راغلی وي نو دغه تعادل د منځه ځي.
- دسرطان ناروغی د پیژندلو په موخه د تومور سپرېسر جین لکه P53 ټاکل نن ورځ یوه ډیره مهه کرنلاره تشکیلوي. دا ځکه چې د بدن یوه غړي هغه نسجونه چې د سرطان په ناروغی اخته وي د نوموړي جین اندازه د پخوا په پرتله تغیر کوي.





په ۲۲ الف جدول کې یو لړ تومورمخنیوونکي جینونه، دهغوی دندې او همدارنګه په ټاکلو کروموزومو کې دهغوی موقعیت ښودل شوی دی. نوکله چې په یوه تومور سپریسر جین کې موتیشن او یا نیمګړتیا پیدا شي نو په پایله کې دیوه ټاکلي غړي ناروغي د منځ ته راتلو سبب (لامل) ګرځي. په لاندني جدول کې دتومورمخنیوونکو جینونو نومونه په لنډ ډول سره لیکل شوي دي. دیبلګه په ډول هغه ښځې چې د تیو سرطان په ناروغي اخته وي نو دهغوی په حجرو کې د تومورسپریسر جین نوم لنډیز داسې لیکل شوی دی: Breast cancer 1= BRCA1 او یا دسترګودشېکي سرطان دتومورمخنیوونکي جین نوم لنډیز داسې دی: (Retinoblastoma gen = Rb)

Tumor suppressor gene دتومورمخنیوونکي جین نوم	Function دنده	Chromosomal location په کروموزوم کې موقعیت	Tumor types observed دتومور ډول
P53	دحجری سایکل یانې ګرزیدني کنترول او ځان وژنه	17p13.1 اولسم کروموزوم	دماغزو سرطان، دویني سرطان، دتیو سرطان
RB1	دحجری سایکل کنترول	13q14.1-q14.2 دیارلسم کروموزوم	دسترګورېټینا سرطان
BRCA1	دحجری سایکل کنترول، د دې این ای نیمګړتیا رغول، دپروتین کنترول	17 q21 اولسم کروموزوم	دتیوسرطان او د تخمدان سرطان
PTCH	دپوستکي ریسپیتورونو کنترول	9q22.3 نهم کروموزوم	دپوستکي سرطان
PTEN	پروتین تیروزین فوسفاتاز	10q23.3 لسم کروموزوم	دماغزو سرطان، دتیو سرطان، د غاړې او تایراید سرطان
CDH1	دحجرو ترمنځ د ښلولو پروتین	16q 22.1 شپاړسم کروموزوم	دمعدې سرطان

۲۲-الف جدول: دیولر نامتو پیژندل شوو سرطان ناروغي مخنیوونکو جینونو Genes دنده او کلینیکي


سینډروم Syndroms ښودل شوي دي



۲۲- ب جدول: د یوې رادیو اکتیوسرچینې څخه لکه تیحنیسیم Tc-99 دگاما وړانګې خپرېږي او د بدن په غړو او نسجونو کې جذب کیږي. کله چې دغه جذب شوي انرژي دورانگو وزن فکتور سره ضرب کړو نو د غړو او نسجونو معادل ډوز لاس ته راځي. دورانگو کلینیکي او بیالوژیکي خطر د اړخولو او ټاکلو په موخه دا اغیزمن ډوز پیژندل اړین دی. نوموړی فزیکي کمیت دنسجونو وزن فکتور او معادل ډوز د حاصل ضرب څخه تر لاسه کیږي.

پوښتنې (Questions):

- ۸-۱ دورانگو سم سیخ او نه سم سیخ اغیزې د یوه بل سره څه توپیر لري؟
- ۸-۲ خپلواکر ادیکال څه ته وايي؟
- ۸-۳ په دې اړین ای DNA باندې دورانگو ناوړه اغیزې په څه ګوته کړی؟
- ۸-۴ دورانگو انرژي ډوز اود دې اړین ای غبرګ تاو شوو تارونو د پرې کیدلو په تړاو څه ډول اړیکې شته دي؟
- ۸-۵ که چیرته په دې اړین ای DNA کې دورانگو د غبرګون په پایله کې نیمګړتیا راشي او بېرته د ټاکلوانزایمو په مرسته دغه نیمګړتیا د منځه لاړه نه شي نو کومې ناوړه اغیزې به منځ ته راشي؟
- ۸-۶ کله چې یوه بیالوژیکي ماده کې وړانګې جذب شي نو په خپل وارسره کومې پېښې پرلپسې پېل کیږي؟
- ۸-۷ دورانگو سم سیخ او نه سم سیخ غبرګون د بدن په حجرو کې څه ډول ناوړه اغیزې منځ ته راولي؟
- ۸-۸ کله چې ایونایز کوونکې وړانګې د یوې بیالوژیکي مادې سره غبرګون وکړي نو په پایله کې پرلپسې کومې فزیکي، کیمیاوي او بیالوژیکي پېښې منځ ته راځي؟
- ۸-۹ دورانگو تصادفي اغیزو (ستوخاصیک) او نه ستوخاصیتیک (Deterministic) اغیزو ترمنځ توپیر څه دی؟



څلورمه برخه

نهم څپرکی

د یورانیم لاس ته راوړل او رایستلو تکنالوژي



(Uranium mining and production)

طبیعی یورانیم (Natural Uranium)

په 1789 م کال کې طبیعي یورانیم د لومړۍ ځل لپاره د یوه جرمني کیمیا پوه مارتین هاینریش کلاپروت (Martin Heinrich Klaproth) له خوا رابرسیره شو او داورانوس سیارې نوم ورکړ شو. دیورانیم عنصر نوم د سیاره اورانوس (Planet Uranus) څخه اخیستل شوی چې په یوناني ژبه کې د اسمان (Sky) مانا ورکوي.


طبیعی یورانیم ددوه ایزوټوپو څخه جوړ دی چې یو یې د یورانیم دوه سوه اته دیرش (U-238) او بل یې دیورانیم دوه سوه پینځه دیرش (U-235) په نامه سره یادېږي. لومړۍ ایزوټوپ یانې (U-238) دطبیعی یورانیم لږ څه نهه نوي عشریه درې په سلو کې (99,3%) او یورانیم دوه سوه پینځه دیرش (U-235) دطبیعی یورانیم لږ څه صفر عشریه اوه په سل کې (0,7%) تشکیلوي. وروستی ایزوټوپ د یوې خوا د (U-238) ایزوټوپ په پرتله په لوړه کچه رادیو اکتیو خواص لري اودحرارتي نیوترون په جذب کولو سره چوپي او دبلې خوا دنوموړي اتومونه یې له باندنیو فزیکي، بیالوژیکي او یا کیمیاوي اغیزو څخه په خپل سراوپه طبیعي حالت کې هم چوپي (Fission) نو له دې کبله په هستوي بڼو کې دسونگ موادو په صفت دبرېښنا د تولید په موخه او همدارنګه دهستوي وسلو د جوړولو لپاره په کار اچول کېږي. نن ورځ یورانیم دوه سوه اته دیرش په ملکي اوهم په پوځي برخو کې کارول کېږي. د یورانیم یوډیر ګټور استعمال په بریدرېټي (Breeder reactors) کې دیادولور دی. په نوموړې بڼې کې U-238 اتوم یو ګړندی نیوترون جذب کوي او په پایله کې دخپلې اندازې په پرتله نوي اوډیرسونگ مواد یانې پلوتونیم P-239 تولید کېږي نسبت ودې ته چې د هستوي ځنځیري تعامل لپاره په کاروي.

داسې اټکل کېږي چې په نړۍ کې دیورانیم زیرمې د اتیا کالونوڅخه وروسته خلاصې شي. دیورانیم عنصر لږ څه شپږنیم بېلیونه کاله (6,6 billions) پخوا په سوپر نووا (Super novae) کې منځ ته راغی. سوپر نووا په کایناتو کې په ډیره لوړه کچه یوه ځلیدونکې او درنا څخه ډکه چاودنه ده چې هر پینځوس کاله وروسته یو ځل منځ ته راځي. دسوپر نووا ماده دایونایز شوو اتومونو څخه جوړه ده او دیلازما په نامه سره یادېږي. دنوموړې هستوي پېښې عمرلنډ دی اولږڅه یوه میاشت وخت نیسي او بیا یې رڼا وروروکمېږي اوڅر پیر رنګ ځان ته غوره کوي. په نوموړي وخت کې سوپرنووا دومره انرژي د رڼا په بڼه خپروي لکه چې لمر یې د لسو بېلیونو په موده کې خپروي.




دطبیعی یورانیم فزیکي خواص:


- ✓ سوچه طبیعي یورانیم (Natural Uranium) دسپینو زرو په شان یوسپین رنگه خلیدونکی رادیو اکتیو عنصر دی چې دالفا وړانګې ورڅخه خپرېږي اود ډیرو درندو فلزاتو په ډله کې شمیرل کېږي. دنومړي عنصر کیمیاوي سمبول په یو (U) سره بنودل کېږي.
- ✓ طبیعي یورانیم نهه نوي په سلو کې دیورانیم دوه سوه اته دیرش U^{238} 99% , لږڅه صفرعشاریه اووه په سلو کې U^{235} 0,711% دیورانیم دوه سوه پینځه دیرش اوپاتي برخه یې د یورانیم دوه سوه څلوردیرش U^{234} ایزوټوپونه تشکیلوي.
- ✓ نوموړي عنصر دډیرو درندو عنصرولکه سرب (lead)، کادمیم (Cadmium) او تنگستن (Tungsten) د ډلې څخه شمیرل کېږي چې کثافت یې نونس ګرام په یوه سانتي متر مکعب ($19,1 \text{ g/cm}^3$) یانې داو سپني کثافت څخه درې واره لوړ دی.
- ✓ دطبیعی یورانیم فزیکي نیمایي وخت لږ څه څلورنیم ملیارده (45000000000) کاله دی اود ځمکې دپیدا یښت سره یوشان ده. نوموړی عنصرلږڅه شپږنیم بلیونه کاله (6,6 billions year) دمخه یانې د سوپر نووا (Supper Novae) دجوړیدو سره یوځای منځ ته راغلی دی.
- ✓ دطبیعی یورانیم یوايزوټوپ دوه نوي 92 پروتونه او یوسلو شپږ خلوینت 146 نیوترونه لري اود کتلې شمیره یې دوه سوه اته دیرش $A = 238$ ته رسیږي. دنوموړي یورانیم کیمیاوي سمبول په U^{238} بنودل کېږي.
- ✓ دویلي کیدلو ټکی یې یولس زره دوه دیرش ګراد سلسیوس (1132°C) اودغلیان نقطه یې درې زره پینځه سوه ګراد سلسیوس 3500°C ده
- ✓ مخصوصه رادیو اکتیویټي یې مساوي دی له: 12450 Bq/gram
- ✓ په نړۍ کې لږڅه 440 هستوي بټي ککارکوي اودیورانیم 86000 ټنوته اړتیا شته



طبیعی یورانیم رادیو اکتیو خاصیت لري دا په دې مانا چې په خپل سر بې له باندنۍ کیمیاوي او فزیکي اغیزې څخه چوي او درادیواکتیو تجزیې په ترڅ کې په نورو عنصرونو لکه توریم Th^{232} ، پروتاکتینم Pa^{234} او یورانیم U^{238} ایزوتوپو باندې بدلیږي. په ۷۰ شکل کې دیورانیم دوه سوه اته دیرش دتجزیې انرژي شپږکتړم بنودل شوی دی.




۷۰- شکل: په پورتنۍ شکل کې دیورانیم U^{238} تجزیې شپږکتړم بنودل شوی دی چې دالفا دوه زري خپروي. نوموړی عنصر اوه اويا په سل 77% کې دالفا یوه ذره α_1 او درویشته په سل کې 23% دویمه الفا ذره α_2 خپروي چې دهغوي حرکي انرژي په خپل وار سره لږڅه څلورمیگا الکترون ولته $\alpha_1 = 4.18 \text{ MeV}$ او $\alpha_2 = 4.13 \text{ MeV}$ قیمت لري. په دغه تجزیه کې یورانیم دتوریم Th^{234} رادیواکتیو یوه نوي عنصر بنسټیز انرژي لیول ته رالویږي. درویشته په سلو کې یورانیم په یوه هیجاني توریم عنصر تجزیه کیږي. په نوموړي صورت کې یورانیم یوه بله الفا وړانګه خپروي چې انرژي یې څلورعشاریه دوه 4.23 MeV ده او د توریم یوې هیجاني انرژي لیول ته رالویږي. دهیجاني لیول او د بنسټیزلیول (Ground state) توپیر 0.05 MeV قیمت لري چې دغه اضافي انرژي دګاما وړانګې په څیر دلایسه ورکوي. (17)





دطبیعی یورانیم ایزوتوپ U^{238} هسته د چاودېدونکي یورانیم دوه سوه پینځه ایزوتوپ U^{235} په بر خلاف د حرارتي نیوترونو په ویشتلوياني جذب کولو سره نه چوي او له دې کبله د هستوي بټۍ لپاره د سونګ موادو په ډول نه شي په کارېدلای. خو د ګرنډیونیوترونو په ویشتلو سره چې انرژي یې د یو میگا لاکترون 1 MeV ولته څخه پورته وي ددې امکان شته دی چې نوموړي نیوترونه د یورانیم دوه سوه اته دیرش ایزوتوپ U^{238} هستې ته ورننوي او بیا دنوموړې هستې څخه جذب شي. په هستوي بټۍ کې نوموړي ګرنلاره تر سره کیږي او په مصنوعي ډول سره رادیو اکتیو پلوتونیم Pu^{239} لاس ته راځي.

یادونه: یومترمکعب یورانیم اکساید (O_3O_8) لږ څه $700\,000 \text{ kWh}$ انرژي تولیدوي.

دا ځکه چې د یورانیم دوه سوه پینځه هستې په چاودنه کې دوه تر دری ګرنډی نیوترونه ازادکيږي او



دشاوخوا یورانیم دوه سوه اته دیرش هستو سره غبرگون کوي. کله چې یو ګړندی نیوترون n د یورانیم په هسته ولګیږي نو په پایله کې په خپل وارسره د یورانیم دوه سوه نهه دیرش U^{239} نیپتون دوه سوه نهه دیرش Np^{239} او په اخیر کې پلوتونیم دوه سوه نهه دیرش Pu^{239} نوې هستی لا س ته راځي. د نوموړي هستوي تعامل په ترڅ کې د بېتا وړانګې β خپرېږي چې معادله یې په لاندې ډول لیکلای شو.




پلوتونیم د یورانیم دوه سوه پینځه دیرش په څیر د حرارتي نیوترونو په جذب کولو سره سم د لاسه چوي او له دې کبله د چاودېدونکي موادو په صفت په هستوي بڼو کې د سونګ موادو او په تېره بیا د هستوي وسلو په جوړولو کې لکه اټوم بم خورا اهمیت لري. په پورتنۍ شکل کې یونیوترون په یوه هسته لګیږي او په پایله کې دوه سپکې هستې او درې نیوترونه منځ ته راځي.

د طبیعي یورانیم دویم ایزوټوپ یورانیم دوه سوه پینځه دیرش تشکیلوي او د پلوتونیم په ډول په هستوي بڼې کې د سونګ موادو په توګه کارول کیږي. کله چې دیورانیم دوه سوه پینځه دیرش هسته وچوي نو په منځني ډول دوه او یا درې ګړندي نیوترونونه ور څخه ازادیږي چې هغوی بیا په خپل وار سره خپل ګاونډي یورانیم دوه سوه اته دیرش U^{238} هستو باندې لګیږي او په پایله کې ورڅخه پلوتونیم دوه سوه نهه دیرش Pu^{239} لاس ته راځي. د نوموړي چاودنې څخه په ګټه پورته کولو سره کیدای شي چې د سپکواووه هستوي بڼې او یا په بریدر هستوي بڼې (Breeding Reactor) کې د پلوتونیم چاودېدونکي سونګ مواد تر لاسه شي.

هستوي بڼې یوې داسې هستوي دستگاه ته ویل کیږي چې هلته د اټومي انرژۍ په مرسته سره بریښنا لاس ته راځي. د نوموړي موخې لپاره د هستوي بڼې په زړه کې لږ څه دوه سوه ټنه یورانیم اکساید (UO_2) ځای په ځای شوی وي چې د سونګ موادو په ډول ورڅخه کار اخیستل کیږي. نوموړی یورانیم دوه په سل کې په یورانیم دوه سوه پینځه دیرش $U-235$ باندې بډای شوی وي. په یوه هستوي بڼې کې د یورانیم دوه سوه اته دیرش U^{238} هسته کولای شي چې چټک نیوترونه جذب کړي چې په پایله کې پلوتونیم دوه سوه نهه دیرش Pu^{239} منځ ته راځي.


دیورانیم U^{238} د مول کتله مساوی ده له دوه سوه اته دیرش ګرام. دا په دې مانا چې په دوه سوه اته دیرش ګرام یورانیم کې $6,02 \times 10^{23}$ اټومونه موجود دي. په دې اساس په یوه ګرام کې $2,53 \times 10^{21}$ اټومونه او په یوه مایکرو ګرام کې $2,53 \times 10^{15}$ اټومونه شته دي. څرنگه چې د یورانیم نیمایي عمر څلور نیم ملیارده کاله دی نو دا په دې مانا چې د نوموړي مودې څخه وروسته په یوه کال کې یوه هسته چوي. نو په یو مایکرو ګرام یورانیم کې لږ څه نیم ملیون چاودنې په یوه کال کې تر سره کیږي او په یوه ورځ کې یوزرو پینځه سوه څلوېښت هستې چوي او په همدغه کچه الفا وړانګې خپروي.



د طبیعي یورانیمو داستخراج کرنلاره

د یورانیمو زیرمې او کانونه په طبیعي ډول دځمکې کورې (globus) په ډېر برخو او په غیر متجانس ډول سره پیدا کیږي. په لومړي پړاو کې د طبیعي یورانیمو معدني مینرالونه لکه (Uraninit = Pechblende) دیو لږ فزیکي او کیمیاوي کرنلارو په مرسته سره دنورو ډېرو څخه بیل کیږي.

په ۷۱- شکل کې د طبیعي یورانیمو د لاس ته راوستلو کرنلاره ښودل شوې ده.




۷۱- شکل: د طبیعي یورانیمو د استخراج ټکنالوژي او دیورانیمو دوه سوه پینځه دیرش (U^{235}) د بډای کولو (Enrichment) کرنلاره چې په هستوي پټیو (Nuclear Power Plants) کې د سونگ موادو په موخه ور څخه کار اخیستل کیږي (43)

د یورانیمو د استخراج او بډای کولو کرنلاره په لاندې پړاوونو کې تر سره کیږي

لومړی: د یورانیمو درایستلو کرنلاره (Mining)

د طبیعي یورانیمو فلز په سوچه توګه په طبیعت کې نه پیدا کیږي بلکه په معدني ډبرو کې د یورانیمو اکساید (U_3O_8) مرکب په شکل سره موجود وي. کله چې نوموړی عنصر دیورانیمو یوه معدن (کان) څخه استخراج کیږي نو په مرکب کې د سوچه یورانیمو برخه لږ څه صفر عشاریه درې په سل (0,3%) کې ده. د طبیعي یورانیمو مرکبات د اکساید په بڼه ډیر ډولونه لري. د بېلګه په ډول لکه ناتریم یورانات، یورانیمو اکساید، ماګنیزیم یورانات او امونیم ډي یورانات. په ۷۲- شکل کې د طبیعي یورانیمو یوه معدني ډبره (Pechblende) ښودل شوې ده (71).



۷۲- شکل دطبیعی یورانیم معدني ډبره (Pechblende)

دويم: ديورانيم اكسايد اوږه كول (Milling/Refining)

ديورانيم اكسايد معدني ډبرې د يوې ژړندې په مرسته سره دومره كوچنې او ميده كيږي تر څو لكه د اوږو په شان په پوډرو باندې واوړي. دغه ډول اوږه شوي يورانيم ته د زير كيك (Yellow Cake) نوم وركړ شوي دي.


دريم: يورانيم هېكسا فلورايد (UF₆) (Uranium hexafluoride)

يورانيوم هېكسا فلورايد په عادي تودوخې او فشار كې يو پودر شكله جامد شكل لري چې كثافت يې لږ څه پينځه گرام په يوه سانتي متر مكعب دي. خودتودوخي په لږڅه شپږ پنځوس درجه د سانتي گراد 56, 4 °C د جامد حالت څخه سم سيخ په غاز شكله حالت باندې اوړي. نوموړي غاز د يوې خوا يودير سخت راډيو اكتيو او د بلې خوا كيمياوي ډير زهرجن خاصيت لري نو كله چې تنفس شي د سږو او پښتورگو لپاره ډير زيان رسوي.

يورانيوم هېكسا فلورايد د هستوي بټۍ لكه د سپكو اوبو بټۍ (Light Water Reactor)، د خوتېدونكي اوبو بټۍ (Boiling water Reactors) او يا د لوړ فشار اوبو بټۍ لپاره (High Pressurized Water Reactors) د چاودېدونكي سونگ موادو په موخه ورڅخه گټه اخېستل كيږي. ديورانيم د بډاۍ كولو لپاره ضرور ده چې لومړۍ جامد يورانيم اكسايد يانې زير كيك (U₃O₈) د يو لړ كيمياوي پړاوونو په اخير كې ديورانيم هېكسا فلورايد په غاز باندې واوړول شي. دغه كړنلاره په لاندې ډول تر سره كيږي.

نوموړي زير كيك په نيتريك اسيد كې حل كيږي HNO₃ او د يورانيل نيترات مركب Uranyl = Nitrate UO₂(NO₃)₂ ورڅخه لاس ته راځي. وروسته له هغه څخه دامونيم هايډرواكسايد NH₄OH سره گډيږي تر څو امونيم ډي اورانات (NH₄)₂U₂O₇ = Ammonium Diuranate باندې واوړي. په اخير كې نوموړي مركب د هايډروجن مالېكول په مرسته سره د ريډكشن كيمياوي پروسې لاندې نيول كيږي ترڅو چې يو نسواري رنگه يورانيم ډي اكساي (UO₂) ورڅخه جوړ شي. په خپل وار سره بيا د هايډروفلوريك اسيد (HF = hydrofluoric acid) او د فلورين (F₂ = fluorine) په اكسايدېشن سره لومړۍ (UF₄) اوورپسي يورانيم هېكسا فلورايد (Uranium hexafluoride) لاس ته راځي.

د يورانيم هېكسا فلورايد غاز مركب چې صفر عشاريه او په سلو كې % 0,7 د يورانيم دوه سوه پينځه ديرش U²³⁵ او يا تي برخه يې U²³⁸ جوړوي بيا په خپل وار سره د يوه ځانگړي ټكنالوژي په مرسته سره چې ديورانيم غاز سنټريفوگ په نامه سره ياديږي تر لږ څه درې په سل (% 3) كې د چاودېدونكي



يورانيوم دوه سوه پينځه ديرش U^{235} برخه بډای کيږي. په دغه کرنلاره کې يورانيوم دوه سوه اته ديرش ايزوتوپ U^{238} لږ څه پينځه اتيا په سل (85%) کې او يورانيوم دوه سوه پينځه ديرش صفر عشاريه دوه څخه تر صفر عشاره پينځه په سل کې (U^{235} % 0,2 - 0,45) ورڅه بيليري او دفاضله موادو په ډول اچول کيږي.

دنوموړې موخې لپاره يورانيوم ديوې مخصوصې آلې په مرسته سره چې د يورانيوم ژرنډې (Uran Mill) په نامه سره يادېږي تر هغه پورې میده کيږي ترڅوچې دپودربنه ځانته غوره کړي. ديورانيوم دغه ډول کوچنی ذرې چې دپودربنه لري دقلوي اویا تيزابي مرکباتو په مرسته سره داوکسیدیشن oxidation کونکومرکباتولکه (Na_2ClO_4) په گډون سره دنوروموادو څخه بېل کيږي. يوداسې پوډروله يورانيوم چې د ژير کيک په شان بريښي دپېلو کيک (Yellowcake) په نامه سره يادېږي او کيمياوي سمبول يې په U_3O_8 سره ليکل کيږي. نوموړی ژيرکيک په ډيرو غټو بخاريو (Oven) کې تر شپږ پنځوس درجې دسانتي گړېد ($56^\circ C$) پورې تودوخې ورکول کيږي اوديو لږ کيمياوي پروسو په اخيرکې د نيتريک اسيد، امونيم هايډرواکسايډ، هايډروجن، هايډرو فلوريک اسيد او دفلور غاز ($Flour = F_2$) په مرسته سره په شپږ قېمته يورانيم او فلورمرکب باندې اوږي. ديورانيم دغه ژيررنګه مرکب چې په اوبو کې يې د حل کيدلو قابليت دڅلورقيمه يورانيوم په پر تله ډيربڼه دی د يورانيوم هېکسا فلورايد (UF_6) په نامه سره يادېږي او ډير زهرجن خاصيت لري.



په پايله کې د يورانيوم هېکسا فلورايدغازبيا په خپل وار سره ديورانيوم اکسايډ (UO_2) په يوه پوډر اړول کيږي او دلور فشار، ټاکلی تودوخې اوځانگړي ټکنالوژي په مرسته او په ناڅاپي ډول سره په لومړي پړاوکې دغاز څخه په جامد حالت او بيا په دوهم پړاو کې د کوچنيوکروي جسمه ټوټو يا مردکيو (Pellets) باندې اړول کيږي. په چاو دېدونکي يورانيوم دوه سوه پينځه ديرش بډای شوي مردکي بيا په هستوي بڼيو کې د سونگ موادو په موخه کارول کيږي.

د يورانيوم د بډای کولو کرنلاره (Uranium enrichment)

په طبيعي يورانيوم کې د چاودېدونکي يورانيوم دوه سوه پينځه ديرش ايزوتوپ دېدای کولو لپاره ډيري کرنلاري منځ ته راغلي چې مهمې يې دادي: د سنټريفوگ کرنلاره (Uranium Gas Centrifuge) د ډيفوزيون يا د نفوذ کرنلاره (Uranium Gas Diffusion) او د ليزر کرنلاره (Laser processes). دپېلگه په ډول په ۷۲ شکل کې د يورانيوم د بډای کولو نفوذ کرنلاره ښودل شوې ده.

ديورانيم بډای کولو نفوذ کرنلاره (Uranium Gas Diffusion)

په نوموړي کرنلاره کې جامد يورانيوم هېکا فلورايد (UF_6) په يوه لوبښي کې مایع کيږي اوبيا دلور فشار اوتودوخې په مرسته سره په غاز بدليږي. نوموړي کرنلاره دلومړي ځل لپاره ددويمې نړيوالې جگړې په پيل کې د امريکا يې کارپوهانوله خوا دهستوي وسلودجوړولو په موخه دمانهټان په پروژه کې وکارول شوه. دغه کرنلاره دروغتيا په تراودپيره خطرناکه گڼل کيږي داځکه چې يورانيم هېکا فورايډ يو کيمياوي او راډيولوژيکي ډير زهرجن غاز دی. دنوموړي کرنلاري يوه بله نيمگړتيا داده چې ډيره انرژي ورته په کارده او له دې کبله نن ورځ په ډيروهيوادونو کې نه استعمالېږي.




۷۲ الف شکل: دیورانیوم دبدای کولوکرنلاره چي دغازنفوذ (Gaseous Diffusion) تکنالوژي کرنلاره ورته ویل کیږي. په پورتنی شکل کې کوچنی دایرې دیورانیوم دوه سوه پینځه دیرش او غټې دایرې د یورانیم دوه سوه اته دیرش اتومونه رابښي(85).

دنوموړي شکل په چپ اړخ کې طبیعي یورانیم هیکا فلوراید غازترلور فشار لاندې د یوه فیلتریا میمبران (Porous membran) څخه تیریږي چې ډیر واره سوري لري. څرنگه چې د طبیعي یورانیم هیکسا فلوراید غاز په مرکب کې دیورانیوم دوه سوه پینځه دیرش U^{235} او یورانیم دوه سوه څلوردیرش U^{238} ایزوتوپونه دیورانیوم دوه سوه اته دیرش U^{238} په پرتله سپک دي نو له دې کبله د فیلترسوریو څخه په ډیر لور سرعت تیریږي. کله چې دیوگن شمیر فیلترونو څخه نوموړی غاز تیر شي نو په اخیر کې دبدای شوي یورانیم (Enriched uranium) او غریب شوي یورانیم (Depleted uranium) دیوه بل څخه بیلیري.

نوموړې فزیکي کرنلاره چې دیوي خوا دروند ایزوتوپ (U^{238}) د سپک ایزوتوپ (U^{235}) څخه بیل کوي او د بېلې خوا دچاودیدونکي یورانیم دوه سوه پینځه دیرش ایزوتوپ سلیزه برخه د طبیعي یورانیم په مرکب کې د پخوا په پرتله ډیره کوي دیورانیوم د بدای کولو کرنلاري په نامه سره یادیري (Uranium enrichment).

د طبیعي یورانیم هغه مرکب چې د بدای کولو څخه وروسته د فاضله موادوپه څیر پاتي کیږي اودچاودیدونکي یورانیم دوه سوه پینځه دیرش سلیزه برخه یې دغازنفوذ په کرنلاره کې د پخوا په پرتله را ټیټه شوي ده د غریب شوي یورانیم په نامه سره یادیري. څرنگه چې غریب شوي یورانیم رادیواکتیوخاصیت لري نو له دې کبله نه په صنعت کې او نه د ژوندانه په نوروتولنیزو برخو کې ورڅخه گټه پورته کیږي. خو دنوموړي یورانیم څخه په پوځي برخه کې نن ورځ په پراخه توگه کار اخیستل کیږي.



ډيورانيوم ٻڌاي کولو سپنټريفوگ کړنلاره (Uranium Gas Centrifuge)

په نوموړي کړنلاره کې يورانيم هېکسا فلورايد يوگن شمير سلېنډر شڪله څرخېدونکي لوشي Uranium (Gas Centrifuge) ته ورننوي چې ډير لوړ څرخېدونکي سرعت لري د بېلگه په ډول د پنځوس زرو څخه تر اويا زرو څرخېدل په يوه دقيقه کې ترسره کوي (50000-70000 rotation/min). په دې کړنلاره کې ډيورانيوم په دواړو ايزوټوپ باندې د لوبني منځ څخه دباندې خواته تېنډونکي قوه (Centrifugal force) په تو پير سره اغيزه کوي چې په پايله کې ډيورانيوم لږ څه دروند ايزوټوپ U^{238} د لوبني ډيوال خواته اود يورانيم لږ څه سپک ايزوټوپ U^{235} د لوشي منځنۍ برخې ته نږدې را ټولېږي.






Figure 2-III. Isotopes of Uranium



۷۲ ب شکل: ډيورانيوم ٻڌاي کولو غاز سپنټريفوگ (Gas Centrifuge) تکنالوژي بنودل شوي ده. يورانيم دوه سوه اته ديرش اټومونه په غټوټور وگرځوټکو اود يورانيم دوه سوه پينځه ديرش په سپين بخونو گړدو ټکو بنودل شوي دي (86).

د يورانيم هېکسا فلورايد غاز تر هغه وخته پورې په څرخېدونکو لوبنو کې څرخي تر څو چې د چاودېدونکي يورانيم دوه سوه پينځه ديرش U^{235} برخه په سلو کې لږ څه درې په سل 3% او يا نوره هم پورته لاړه شي. د بېلگه په ډول د چاودېدونکي يورانيم ډېدای کولو کچه د هستوي بټۍ لپاره درې په سل کې او په پوځي برخه کې لکه د هستوي وسلو لپاره لږ څه نوي په سل کې 90% کې قيمت لري. که چيرته د چاودېدونکي يورانيم څخه په پوځي برخه او يا د هستوي وسلو په موخه کار اخېستل وغوښتل شي نو ضرور ده چې ډيورانيوم هېکسا فلورايد غاز UF_6 په سل گونو څرخېدونکو لوبنو کې و څرخي تر څو ډېدای کولو کچه يې پورته لاړه شي. په ۴۳ شکل کې ډيورانيوم غاز سپنټريفوگ يا څرخېدونکو لوبنو (Uranium Gas Centrifuge) دستکاه بنودل شو ده. کله چې يوزر څرخېدونکي لوبني څنگ په څنگ په بريښنايز سرکېټ کې ونښلو ل شي چې دهغوي تخنيکي ارقام لکه اوږدوالی يې يونيم متر، سرعت يې څلور سوه متره په ثانيه کې وټاکل شي او شپه او ورځ کار وکړي، نو په يوه کال کې لږ څه شل کيلو گرام په لوړه کچه غني شوی يورانيم (HEU) تر لاسه کيږي. په دغه اندازه غني شوی يورانيم بس دی چې يواټوم بم ورڅخه جوړ شي.



۷۳- شکل: دیورانیوم دوه سوه پینځه دیرش U^{235} ایزوتوپ دبدای کولوآله چې د سل گونوخرخېدونکو سلنډرشلکه لوښو څخه جوړه ده. په دغه ډول کرنلاره کې په هره یوه سلنډرکې د یورانایوم دوه سوه پینځه دیرش دبدای کولو فکتور څلور په زرمه $\sqrt{m_{238}/m_{235}} = 1,004$ برخه تشکیلوي (43).

دیورانیوم غاز سنتریفوگ په کرنلاره کې په ډیره لوړه اندازه غریب شوی یورانیم **Depleted uranium** د فاضله موادو په ډول پاتې کیږي. دنوموړي یورانایوم کچه دلاندې بېلگه په مرسته سره اټکل کولای شو. که فرض کړ وچې د یورانایوم هېکسا فلوراید مرکب دوولس ټنه مواد (12 t) راوښو چې د بدای کولو په پیل کې د یورانایوم دوه سوه پینځه دیرش برخه صفرعشاریه اوه په سل ($0,7\% U^{235}$) کې ولري نوکله چې دبدای کولوکرنلاره تر سره شي نو په پایله کې یو ټن (1 tonn eU) بدای شوی یورانایوم دوه سوه پینځه دیرش لاس ته راځي چې لږ څه درې نیم په سل کې ($3,5\% U^{235}$) بدای شوی وي. پاتې برخه یې یانې لږ څه یوولس ټنه یې (11 tonn depleted Uranium) فاضله مواد تشکیلوي چې دغریب شوي یورانیم (**Depleted uranium**) په نامه سره یادېږي. په نوموړو فاضله موادوکې دیورانایوم دوه سوه پینځه دیرش برخه د صفرعشاریه اوه په ځای یوازې صفرعشاریه درې ($0,3\%$) ته را شکته شوی وي.

بدای کول : (Enrichment)



په عمومي ډول سره د بدای کولو کلمه ټولو هغو کیمیاوي، فزیکي اومایکروبیولوژیکي تگلارو او کرنلاروته ویل کیږي چې دهغوی په مرسته سره په یوه مرکب کې دیوې ځانګړې مادې او یا عنصرسلیزه برخه دپخوا په پرتله ډیره شي. د بیلګې په ډول په ۷۴ شکل کې دیورانایوم د بدای کولو کرنلاره ښودل شوې ده.

☑ دعنصرواتومي وزن دتوپیرنه په ګټه اخیستلو سره درادیو ایزوتوپوفزیکي بیلول لکه U^{238} او U^{235}

☑ دبیوکیمیاوي کرنلارې په کارولوسره لکه دکنافټ توپیردلیوپروټینو لکه LDH او HDL بیلول

☑ دمایکروبیولوژي کرنلارې په مرسته سره لکه د مالېکولوسرعت د وایرس، غټو مالیکولواوانټیجن بیلول


☑ داتومونو د جذب شپېکترم په مرسته سره لکه دلیزر (Laser) په کرنلاره کې د ایزوتوپو بیلول



۷۴- شکل: دطبیعی یورانیوم د بډای کولو کړنلاره بنودل شوې ده. کله چې د بډای کولو په موخه دولس تنه یورانیوم هېکسا فلوراید (12 t UF_6) په کار واچول شي نو په پایله کې د هستوي بټی لپاره لږ څه یونیم تن 3,6% بډای شوي یورانیوم دوه سوه پینځه دیرش U-235 اویاتې لس نیم تنه غریب شوی یورانیوم دوه سوه پینځه دیرش (Depleted Uranium = dU) دفاضله مواد په ډول لاس ته راځي. په غریب شوی یورانیوم کې د یورانیوم دوه سوه پینځه دیرش U-235 برخه د طبیعي یورانیوم په پرتله نیمایي ته را ټیټه شوې وي. د هستوي بټی لپاره د بډای شوي او دغریب شوي یورانیوم پرتله کولو کړنلاره یو پر اوه (0,14) تشکیلوي (33).

د هستوي بټی سونگ مواد (Nuclear Fuel)

کله چې په طبیعي یورانیوم کې دچاودېدونکي یورانیوم ^{235}U د بډای کولو کړنلاره سرته ورسېږي نو د یورانیوم هېکسا فلوراید غاز UF_6 د یوې ځانگړې ټکنالوژي په بنسټ یوه ناڅاپه دغاز حالت څخه په جامد حالت اړول کېږي. نوموړی کلک اوبډای شوی یورانیوم د سونگ موادو (Fuel) په صفت په هستوي بټیو کې د بریښنا د لاس ته راوړلو په موخه او یا داچې په لوړه کچه بډای شوی یورانیوم د هستوي وسلولکه اتوم بم، هایډروجن بم او نیوټرون بم کې په کار اچول کېږي. د بېلگه په ډول د یوه اتوم بم دجوړولو لپاره چې د چاودنې انرژي کچه یې منځني قوه تشکیلوي د یورانیوم دوه سوه پینځه دیرش بحراني کتلې (Critical Mass) کچه نهه څلوېښت کیلو گرام (49 kg U-235) اود سوچه پلوتونیم لپاره لږ څه لس کیلو گرام (10 kg Pu-239) اټکل کېږي تر څو یوځنځيري پایښت لرونکی هستوي تعامل منځ ته راشي (Chain reaction).



پوښتنه: پلوتونيم Pu^{239} په هستوي بټۍ کې په مصنوعي ډول منځ ته راځي او راډيو اکتیو خواص لري. نوموړی عنصر په یورانیم دوه سوه پینځه دیرش U^{235} تجزیه کيږي او په څنګ کې دالفا یوه ذره (هیلیم) او لږڅه پینځه میگا الکترون ولټ انرژي خپروي ($P^{239} \rightarrow U^{235} + He^4 + 5,15 \text{ MeV}$)

دیوه کیلوګرام پلوتونیم څخه څومره هستوي انرژي تر لاسه کيږي؟

حل: څرنگه چې دپلوتونیم اټوم د کتلې شمیره دوه سوه نهه دیرش ده نو یو مول پلوتونیم دوه سوه نهه دیرش ګرام کیږي $1 \text{ mole} = 239 \text{ g}$ او په یوه کیلو ګرام پلوتونیم کې دمول شمیر مساوي ده یوزر ګرام تقسیم په دوه سوه نهه دیرش $1000 \text{ g} / 239 = 4.18$

هستوي انرژي = دمول شمیر × اووګادرو عدد (شمیره) × ازاده شوي انرژي

$$\text{Energy} = 4,18 \times 6,022 \times 10^{23} \times 5,15 \text{ MeV} = 1,3 \times 10^{31} \text{ eV}$$


ځواب: لږ څه لس په طاقت دیو دیرش الکترون ولټ انرژي تر لاسه کيږي

په لاندني جدول کې ښودل شوي ده چې په یوه هستوي چاودنه کې دنیوټرونو شمیر او د انرژي اکسیونینسال ډیرښت دوخت په تیریدلو سره په واحد میکرو ثانیو μs څرنگه پورته ځي.

ازاده شوي انرژي	دپیداشو نیوټرونو شمیر	وخت په واحد دمیکرو ثانیو	دنیوټرونو د نسل شمیر
Energy (MeV)	# neutrons	Time (μs)	N generation
0	1	0,00	0th صفر
245	2,7	0,01	1st لومړی
910	7,4	0,02	2nd دویم
2720	20	0,03	3rd دریم
$3,1 \times 10^6$	$2,2 \times 10^4$	0,1	10th لسم
$6,9 \times 10^{10}$	$4,9 \times 10^8$	0,2	20th شلم
$7,4 \times 10^{23}$	$5,2 \times 10^{21}$	0,50	50th پینځوسم
$3,0 \times 10^{26}$	$2,1 \times 10^{24}$	0,56	56th شپږ پنځوسم
$8,1 \times 10^{26}$	$5,7 \times 10^{24}$	0,57	57th اووه پینځوسم

پوښتنې:

- ۱-۹ طبیعي یورانیم دکوموايزوټوپو څخه جوړ دی؟
- ۲-۹ په غریب شوي یورانیم کې دکوم یوه ایزوټوپ کچه دپخوا په پر تله کمښت مومي ؟
- ۳-۹ هستوي بټۍ څه ډول آله ده؟
- ۴-۹ دیورانیم دغني کولو کړنلاري کومې دي؟
- ۵-۹ دهستوي وسلو دجوړولو په موخه دیورانیم دوه سوه پینځه دیرش کچه په طبیعي یورانیم کې څومره پورته ولاړه شي ياني بډای شي؟



پينځمه برخه

لسم څپرکی

په چاپيريال باندې د غريب شوي يورانيوم اغيزې


(Environmental effects of depleted uranium)

سريزه

په افغانستان کې د لږڅه اووه ويشت کالوڅخه راپدې خوا د جگړې په ډگر کې اودهيواد په گڼو سيمو کې د هراړخيزو وسلو څخه په هر شکل او بڼه کې وي خوپه يوه ډول سره بياهم ناوړه کار اخيستل کيږي. د جگړې هغه وسلې چې په افغانستان کې استعمالیږي د پخوانيو عادي وسلو په پرتله کوم چې د افغان او انگريز دريو جگړو په اوږدو کې استعمال کيدلي دي توپير لري. دا ځکه چې د جگړې پخوانۍ وسلې د سوچه اوسپنې څخه جوړېدلې خو د 1990 م کال څخه را پدې خوا د نوموړو وسلو په ټکنالوژي او جوړښت کې يو ځانگړی نوښت او پرمختگ منځ ته راغلی دی.

د بېلگه په ډول د کيمياوي وسلو ، بيالوژيکي وسلو په څنګ کې يو بل ډول وسلې چې د راديو لورژيکي وسلو (Radiological weapons) او يا ديورانيوم وسلو په نامه سره هم ياديږي منځ ته راغلي دي . نن ورځ د جگړو په ډگر کې داسې وسلې کار ول کيږي چې د يوې خوا په کمپيوټر باندې سمبال دي اونښه (Target) په خپله د ليزر وړانگو (Laser rays) په مرسته سره پيدا کولای شي او د بلې خوا راديو اکټيو خطرناک مواد ورسره گډ شوي وي، نو له دې کبله د خپل ځان څخه هستوي وړانگې خپروي. په دې کتاب کې به پر چاپيريال باندې د راديو لورژيکي وسلو ناوړه اغيزې او دهغوی په ټکنالوژي باندې چې د غريب شوي يورانيوم فلز (Depleted Uranium) څخه جوړې شوې دي، او له دې کبله هم ورته ديورانيوم وسلې نوم ورکړ شوی دی (Uranium weapons) يو څه رڼا واچوو . د کتاب په وروستي څپرکي کې ددې څيړنه واکل شوې ده چې په نوموړو وسلو باندې د چاپيريال ککړتيا له امله اولسي خلکو ته څومره گواښ شته او په راتلونکې وخت کې چاپيريال د څومره خطر سره مخامخ کولای شي.

د بلې خوا دهيواد گاونډي او نږدې هيوادونه د هستوي انرژي څخه په اتومي بڼو او هستوي ازموينو کې کار اخلي ، چې په پايله کې چاپيريال په راديو اکتیوموادو ککړ کيږي. اوس ددې اړتيا ليدل کيږي چې دنړيوال اتومي انرژي قانون (Atomic Energy Act §9) دويمه برخه نهم پاراگراف په بنسټ د هيواد په ټاکلوسيمو کې د چاپيريال راديو اکتیوي څارنه وشي او د گاما شپيکټرومېټري آلو په مرسته سره په هوا، اوبو او ځمکې پر مخ دراديو اکتیوموادو کثافت اندازه شي.




ډيورانيوم وسلو پيښليک

په 2003 م کال ډاکټور مياشت په شپاړسمه نيټه دجرمني هیوادد هامبورگ په ښارکي ډيورانيوم وسلو په هکله يونړيوال علمي کنفرانس جوړشو(5). دنوموړي کنفرانس يونامتو برخه وال ډاکټردوراکويچ A.Durakovic (1) چې دواشنکتن ښاردیورانيوم د طبي څيړنود مرکز (Uranium Medical Research Center) مشرتوب په غاړه لري په ډاگه کړه چې د نړۍ په ځينو هیوادونو لکه افغانستان، عراق اود پخوانۍ یوگوسلاويا په اوږدو جگړو کې په سل گونو ټنه داسې وسله استعمال شوې ده چې په هغه کې یوراديواکتيو يانې وړانگې خپرونکي فلز لکه غريب شوي یورانيوم (Depleted Uranium) او يا پلوتونيم (Plutonium) ايزوتوپونه ور گډ شوي دي. نوموړي طبي څيړنپوه په تيروکالونو کې، دوه ځله ديوي ډلي پوهانو په ملگرتيا افغانستان ته سفروکړ او دهیواد په هغو سيمو کې، چې ډيورانيوم وسلې کارول شوې وې، د بېلگه په ډول لکه دکابل ښار، سپين غر سيمه، جلال اباد او داسې نوروځايونو کې طبي ازموينې او علمي پلټنې تر سره کړې. داځکه چې دنوموړو سيمو اوسيدونکو ديو ډول ناوړې او تر اوسه ناپيژندل شوې ناروغۍ په هکله شکايت کولو.

دبېلگه په ډول د هډوکوخوړيدل، دغړوکمزورتيا، تبه لرل، عصبي تکليف، دسترگو ديد کمښت، سرخوړيدل، دحافظې کمښت، ژورخفگان (Depression) او داسې نور.

دنوموړو ناروغيوکلينيکي سيمپتومونه يا علامې (Symptoms) د هغې يوې ناروغۍ سره چې د خليج ناروغۍ او يا (Gulf Syndrom) په نامه سره ياديږي ډير ورته دي. په دې اړوند بايد وويل شي چې دا خبره به اوس دوخت نه تر مخه وي چې گڼه په پوره باور سره دا پريکړه وښي چې نوموړې ناروغۍ دغريب شوي يورانيوم سره تړاوتري. داځکه چې د تيټي کچې انرژي ډوز په هکله لا تراوسه پورې اپيډيمولوژي څيړنې نه شته، داځکه چې په دې تړاو مسئول دولتي سازمانونه هيڅ ډول چمتووالي نه ښيي. د بلې خوا نوموړې ناروغۍ هغه وخت هم منځ ته راتلاي شي چې که په چا پيريال کې کيمياوي او بيالوژيکي وسلې استعمال شي او خلک يې تنفس کړي او يا تماس ورسره پيدا کړي. نو له دې کبله تر ټولو مهمه (اړينه) داده چې دغريب شوي يورانيوم يانې د تيټي کچې وړانگودحجروي بيولوژي (Cellular Biology) او مولیکولاربيولوژي (Molecular Biology) په سطحه پراخي څيړنې پيل شي.

ډاکټر آصف دوراکويچ او دهغه طبي ډله، د نوموړو سيمواوسيدونکوپه وينه او ميتيازو (Urine) کې ډيورانيوم درې ډوله راديواکتيو ايزوتوپونو لکه (U^{234} ; U^{236} ; U^{238}) کچه، د يوې ځانگړې فزيکي آلې اونوي تگلارې په مرسته سره، تر ازموينې لاندې ونيولې چې نتيجه يې په ۷۵- شکل کې ښودل شوې ده. نوموړې کړنلاره چې دکتلي شپکټرومتر (Inductively coupled plasma mass spectrometry) په نامه سره ياديږي دومره حساسه (sensitive) او دقيقه (Accurate) ده چې ترڅيړنې لاندې کسانود وينې (Blood sample) او ميتيازو (Urine) په نمونه کې د يورانيوم ايزوتوپود يوگرام يوپه ملياردمه برخه يانې يو نانو گرام ($1\text{ng} = \text{nano gram} = 10^{-9}\text{g}$) باني ډيوگرام يو په ملياردمه برخه هم اندازه کولای شي.





$$\text{Uranium: } A = 238$$

$$r = 1.2 (238)^{1/3}$$

$$= 7.4 \text{ f}$$


ډيورانيوم هستي شعاع لږ څه څلورنيم فرمي ده



۷۵- شکل: په عمودي محور کې ديورانيوم کثافت په واحد د نانو گرام په يوه ليتر ميتيازو (ng/L) کې اوپه افقي محور کې دځينو هيوادونو لکه دافغانانو (Afghan)، انگرېزانو (UK) او امريکايانو (USA) دعام اولس برخه اخيستونکو وگړو شمير بنودل شوېدي. دنوموړي شکل په افقي بني اړخ کې عمودي ستنه دهغو افغانانو په ميتيازو (Urine) کې ديورانيوم کچه بنښي، چې دجگړې په سيمه کې اوسيدل. د دغو وگړو په يوه ليتر ميتيازو کې ديورانيم قيمت مساوي دی له: 373 ng/Liter Urine درى سوه درى اويا نانوگرام (1)

د نوموړي شکل څخه څرگنديږي چې د هيواد په هغو سيمو کې چې هلته د يورا نيم وسلې کارول شوې دي دپلټل شوو کسانو په يوه ليتر ميتيازو (Urine) کې ديورانيوم کثافت کچه نسبت هغوکنترول کسانو ته چې د هغوى په سيمه کې د يورانيم وسله هيڅ نه وه کارول شوې د څلوېښت څلوڅخه لوړ قيمت لري (1).

بر سيره پر دې داهم وښودله شوه چې په بمباري شوو سيمو کې ديورانيوم کثافت کچه دڅښلو په اوبو کې درى ځله او په چاپيريال کې د بېلگه په ډول دځمکې پرمخ شپږ ځله نسبت وهغه کثافت ته چې د نړيوال روغتيا سازمان (WHO) له خوادعامو وگړو لپاره ټاکلې شوى ده لوړ قيمت لري.



نن ورځ په نړۍ کې **شپاړس هیوادونه شته دي** چې دیورانایوم وسلې جوړوي اودیوی خوايي په ازادبازار کې خرڅوي اود بلې خوا ورڅخه په جگړه کې کاراخلي. په 1991 م کال کې د لومړي ځل لپاره دیورانایوم وسله د خلیج په جگړه کې وکارول شوه. څو کاله وروسته په دغه سیمه کې د گڼ شمیر نړیوال کار پوهانو په نظر د سرطان ناروغي د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. برسيره پردې یوډول نوې ناروغي چې د گلف زیند روم (Gulf Syndrom) په نامه سره یادېږي منځ ته راغله. که څه هم دنوموړې ناروغۍ پخلی د نړیوال روغتیا سازمان WHO له خوا نه دی شوی خو بیا هم دنوموړو سیمو اوسیدونکو اندېښنې یې ډیرې زیاتې کړې دي.


غریب شوی یورانایوم څه شی دی؟

غریب شوی یورانایوم (Depleted Uranium) د هستوي بټۍ لپاره د سونگ موادو دلاس ته راوستلو په موخه او همدارنگه د هستوي وسلو لکه اتوم بم جوړولو په کرنا لاره کې، د طبیعي یورانیم هغو وروسته پاتې شوو، فاضله موادو ته ویل کېږي، چې د چاودیدونکي یورانایوم دوه سوه پینځه دیرش U-235 د بډای کولو په کرنا لاره کې باقی پاتې کېږي.

څرنگه چې په نوموړې وسله کې د چاودیدونکي یورانایوم دوه سوه پینځه دیرش برخه د طبیعي یورانایوم په پرتله د صفر عشریه اوه (0,7%) څخه تر صفر عشریه دوه پورې (0,2%) را ټیټه شوې وي نو له دې کبله ورته غریب شوی یورانیم یا ډېپلېټېډ (Depleted Uranium) هم ویل کېږي. نوموړی یورانایوم د درې رادیواکتیو ایزوټوپو لکه (U^{238} , U^{235} , U^{234}) څخه جوړ دی.

د اتومي انرژۍ نړیوال سازمان سازمان (IAEA) د تعریف سره سم د غریب شوی یورانیم وسله یوه نوې وسله ده چې لږ څه نهه نوي عشریه اته % 99,80 په سل کې درادیواکتیو یورانایوم دوه سوه اته دیرش (U-238) ایزوټوپ څخه او پاتې برخه یې یانې صفر عشریه دوه په سل کې 0,2% د چاودیدونکي رادیواکتیو ایزوټوپ دوه سوه پینځه دیرش (U-235) او پاتې ډیرلږ دوه سوه څلور دیرش (U-234) ایزوټوپو څخه تشکیل شوې ده. ددې کتاب په راتلونکو څپرکو کې به د غریب شوي یورانایوم پرځای داسا ننیا لپاره یوازې د یورانایوم ويي (لغت) وکاروو.

دورانگویو انگریزی متخصص ډاکتر کریس بسبي Chris Busby (57) چې د لیورپول په پوهنتون کې استاد او داروپا په اتحادیه کې د بریتانیا استازی دی په خپلو خبرونو کې زیاتوي چې د غریب شوي یورانایوم وسلې ټولې نړۍ ته خطر متوجي کوي. دنوموړې وسلې د کارسینوجېنیک (Carcinogenic) او موتوجېنیک (Mutegenic) رادیو اکتیوډزې د باد په واسطه ټولې نړۍ ته خپریږي. باد سرحد (پوله) نه پیژني او دوخت په تیریدوسره سم هر ځای ته رسیږي. د غریب شوي یورانایوم وسلو رادیو اکتیو خاصیت ډیر اوږد فزیکي نیمایي عمر لري یانې تر څلور نیم ملیارده کاله پورې هم وړانگې خپروي او دنوموړې مودې څخه وروسته یې هم خطر نه ورکېږي بلکه یواځې د رادیواکتیویتی کچه یې نیمایي ته راوړي.



دغریب شوي یورانیم سرگولی د پوځي نښې د لگیدلو سره سم په وړو ذرو بدلیري چې قطر یې لس مایکرو متره ($10\ \mu\text{m}$) نه هم کوچنی وي او له دې کبله په آسانی سره تنفسي جهاز ته ننوځي. یوه برخه یې په سږو کې پاتې کیږي او دیورانیم پاتې کوچنی ذرې د وینې له لارې هډوکو او بدن نورو برخو ته رسیږي. څرنگه چې یورانیم هډوکو څخه په ډیره خوښي جذب کیږي نو د هډوکو ماغزو ته وړانګې رسوي چې د ټول بدن لپاره وینه جوړوي. که چیرته نوموړې حجرې نیمګړتیا ولري نو ټولې هغه حجرې چې دهغوی څخه نورې نوې حجرې جوړیږي هم نیمګړې وي او له دې کبله دموټیشن او سرطان ناروغی سبب (لامل) ګرزیدلای شي.

دغریب شوي یورانیم فزیکي خواص

دغریب شوي یورانیم فزیکي خواص د طبیعي یورانیم سره یوشان دي خو یوازې دا چې دچاودېدونکي یورانیم دوه سوه پینځه دیرش U-235 کچه په نوموړي یورانیم کې لږ څه نیمایي ته را ټیټه شوې وي. دیورانیم وسله نهه نوي عشریه اته په سل کې (99,8%) یورانیم دوه سوه اته دیرش تشکیلوي.

دیورانیم سمبول Uranium (U)

Atomic Number: 92 دیورانیم اټومي نمبر

Atomic weight: 238 دیورانیم اټومي وزن


غریب شوي یورانیم: (Depleted Uranium)

غریب شوي یورانیم طبیعي یورانیم هغه فضوله موادو ته وايي چې دهستوي بټیو دسونګ موادو (Nuclear fuel) دېدای کولوپه تولید کې منځ ته راځي اودراديو اکتیویټي کچه یې طبیعي یورانیم په پرتله لږ څه نیمایي ته را لویډلي وي.


بډای شوي یورانیم: (Enriched Uranium)

کله چې په طبیعي یورانیم U-238 کې د چاودېدونکي یورانیم U-235 اصلي کچه دهستوي بټیو دسونګ موادو لپاره د صفر عشریه اووڅخه تر لږڅه څلور په سل کې لوړه شي (0,7%-4%) نو بډای شوي یورانیم لاس ته راځي. په داسې حال کې چې په هستوي وسلو کې دیورانیم دوه سوه پینځه دیرش برخه د یورانیم دوه سوه اته دیرش په پرتله لږ تر لږه دشلو نه ترنوي په سل کې (90%) بډای شوي وي. غریب شوي یورانیم دنوموړودواړوبډای کولو کرنلاروپه پایله کې هغه پاتې شوي او فضوله مواد تشکیلوي چې دیورانیم په وسلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي.

په غریب شوي یورانیم کې دیورانیم دوه سوه اته دیرش U-238 برخه د طبیعي یورانیم په پرتله لږ څه پینځه په سل 5% کې ډیره ده.




څرنگه چې غريب شوی یورانیم لکه طبیعي یورانیم رادیواکتیو خاصیت لري نو دوخت په تیریدوسره تجزیه کيږي او په لومړي وخت کې یوازې د الفا او بېتا وړانګې ورڅخه خپریږي. دتجزیې په کړنلاره کې په نورو عنصرونو لکه توریم (Th-234) ، پروتاکتینیم (Pa-234) ، او یورانیم دوه سوه څلور دیرش (U-234) باندې اوږي. د یورانیم دوه سوه اته دیرش دتجزیې معادله په لاندې ډول سره لیکلای شو.



په پورتنۍ معادله کې لاندنۍ تجزیه تر سره کيږي. په لومړۍ تجزیه کې یورانیم دوه سوه اته دیرش چې د عمر نیمایي وخت یې څلور نیم ملیارده کاله دی دالفا یوه وړانګه α خپروي چې حرکي انرژي یې لږ څه څلور میگا الکترون ولټه ده او په توریم بېخي یوه نوي عنصر (Th-234) باندې اوږي. په دوهمه تجزیه کې توریم دوه سوه څلور دیرش چې د عمر نیمایي وخت یې څلیر وینست ورځې دی د بېتا یوه وړانګه β او یا په بل عبارت الکترونه خپروي. دنوموړې وړانګې حرکي انرژي لږڅه صفرعشاریه دری میگا الکترون ولټه قیمت لري. د تجزیه په دریم پړاو کې په همدې ډول سره پروتاکتینیم او یورانیم دوه سوه څلور دیرش منځ ته راځي او په خپل وار سره د بېتا او الفا وړانګې ورڅخه خپریږي. په ۲۷- جدول کې دیورانیم وسلو د ایزوټوپو جوړښت او دهغوی رادیواکتیو خاصیت ښودل شوی دی.

د یورانیم وسلوایزوټوپونه او دهغوی رادیواکتیویتي				
مجموعه	U-238 یورانیم-۲۳۸	U-235 یورانیم - ۲۳۵	U-234 یورانیم - ۲۳۴	
100 %	99,799 %	0,2 %	0,0008976%	په سل کې نسبي وزن
100 %	84,7 %	1,1 %	14,2 %	په سل کې اکتیویتي برخه
14656 Bq	12420 Bq	160 Bq	2076 Bq	د یوه گرام غریب شوي یورانیم اکتیویتي په واحد بیکاریل

۲۷- جدول: د غریب شوي یورانیم په وسلو کې د ایزوټوپونو سلیزې برخې اود رادیواکتیویتي کچه ښودل شوې ده. د بېلګه په ډول په یوه گرام یورانیم کې دیورانیم دوه سوه پینځه دیرش اکتیویتي یوسلو شپيته بیکاریل (160 Bq/g) ده. په داسې حال کې چې په طبیعي یورانیم کې دیورانیم دوه سوه پینځه دیرش اکتیویتي څلور سوه بیکاریل (400 Bq/g) قیمت لري. دا په دې مانا ی چې په غریب شوي یورانیم کې د U-235 کچه د طبیعي یورانیم په پرتله لږ څه شپيته په سل کې کمه ده.



Isotopic composition of natural, enriched, and depleted uranium دطبیعی یورانیم، بدای شوی یورانیم اودغریب شوی یورانیم دایزوتوپو ترکیب			
Isotope ایزو توپ	Percent in uranium دیورانیم سلیزه برخه		
	natural طبیعی یورانیم	enriched بدای شوی یورانیم	depleted غریب شوی یورانیم
U – 238	99.2739	97.01	99.745
U – 235	0.72	2.96	0.250
U – 234	0.0057	0.03	0.005


که چیرته په غریب شوي یورانیم کې نور ایزوتوپونه لکه یورانیم دوه سوه شپږ دیرش U^{236} او پلوتونیم دوه سوه نهه دیرش Pu^{239} ورگډ شوي وي کوم چې د هستوي بټۍ د سونگ موادو سوځیدل شوي پاتې برخه تشکیلوي (Burnt nuclear fuel) نو دروغتیا په اړوند دیورانیم وسلې اند یینې نوری هم زیاتیري. دېبلگه په ډول نړیوالوڅیړنو(UNEP) په ډاگه کړه چې هغه سرگولی چې د (1994-1999) کالونوپه موده کې د بالکان په جگړه کې استعمال شوي دي د یورانیم دوه سوه شپږ دیرش ځانگړې اکتیویتي اندازه په یوه کیلو گرام کې د شپيته زره بېکارېل (60000 Bq/kg) او دپلوتونیم ځانگړی اکتیویتي په یوه کیلو گرام کې د دوولس بېکارېل څخه هم لوړه وه.

په غریب شوي یورانیم کې درادیوایزوتوپوسلیزې برخې په لاندې ډول لیکلای شو:

دیورانیم دوه سوه اته دیرش U-238 سلیزه کچه مساوي ده له: 99,745% ☒

دیورانیم دوه سوه پینځه دیرش U-235 سلیزه کچه مساوي ده له: 0,25% ☒

دیورانیم دوه سوه څلور دیرش U-234 سلیزه برخه مساوي ده له: 0,005% ☒




په سل کې دډوز برخه	اغیزمن ډوز Sv/g DU	دډوز ضریب Sv/Bq	سلیزه %	مخصوصه اکتیویټي Bq/g	نیمایي وخت $T_{1/2}$	درادیواکتیو عنصر نوم Radionuclid
83,74 %	$9,940 \times 10^{-2}$	8×10^{-6}	99,80	$1,245 \times 10^4$	$4,468 \times 10^9$ کاله	U-238
0,08 %	$9,6 \times 10^{-5}$	$7,70 \times 10^{-9}$	-	-	24 ورځي	Th-234
1,15 %	$1,4 \times 10^{-3}$	$8,5 \times 10^{-6}$	0,2	8×10^4	$7,04 \times 10^8$ کاله	U-235
15 %	$1,8 \times 10^{-2}$	$9,4 \times 10^{-6}$	$8,2 \times 10^{-4}$	$2,3 \times 10^8$	$2,45 \times 10^5$ کاله	U-234
100 %	120 mSv		100 %			مجموعه


۲۸ - جدول: په یوه گرام غریب شوي یورانیم کې (1g Depleted Uranium = 1g DU) داغیزمن ډوز کچه یوسلویشل ملي سیورت ته رسیږي ($H_{eff} = 120 \text{ mSv}$). په داسې حال کې چې د عادي وگړو لپاره په یوه کال کې دنړیوال روغتیا سازمان له خوا داغیزمن ډوز لوړه کچه یو ملي سیورت (1 mSv) ټاکل شوې ده.

دغریب شوي یورانیم دتجزیې کرنلاره

په ۷۶- شکل کې د غریب شوي یورانیم دتجزیې کرنلاره د وخت په تابع سره ښودل شوې ده چې د یورانیم وسلوپه جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي.



۷۶- شکل: په عمودي محور کې دیوه گرام غریب شوي یورانیم اکتیویټي (Depleted uranium) په واحد د کیلو بیکارېل او په افقي محور کې د کالونو شمیر ښودل شوی دی. دلر څه یو کال نه وروسته یورانیم په توریم (Th-234) او پروتاکتینیم (Pa-234) تجزیه کیږي اودالفا وړانگو په څنګ کې د بیتا او گاما وړانګې هم خپریږي. د یو میلیون کالونو دننږدلو څخه وروسته دتجزیه شوو عنصرانو



اکتیویټي یوسلو اتیا زره بیکارېل ته پورته ځي. دا په دی مانا چې په یوه ثانیه کې یوسلو پنځوس زره الفا، بیتا او گاما وړانګې خپرېږي. (32)

👉 یادونه: په پورتنۍ گراف کې یو ملیون داسې لیکل شوي دي.



$$1\text{E}+06 = 1000\ 000$$

دنوموړي شکل څخه څرگند ږي چې دڅومياشتو څخه وروسته دغریب شوي یورانیم (Depleted Uranium) ایزوټوپ په دوه نورورادیو اکتیو عنصرنو لکه توریم (Thorium-234) او پروتاکتینیم (Protactinium-234) باندې اوړی چې دبېتا هستوي وړانګې خپروي. دیوه کال څخه وروسته دغریب شوي یورانیم دواړو ایزوټوپو لکه U^{235} او U^{238} او همدارنګه د توریم او پروتاکتینیم دیوه ګرام رادیو اکتیویټي تر پنځوس زره بېکارېل پورې پورته ځي. دنوموړو عنصرورادیو اکتیویټي ترلس زرو کالوپورې ثابت او په خپل حال پاتې کیږي. وروسته له لږڅه یو ملیون کالو څخه ګڼ شمیرنور نوي رادیو اکتیو عنصرونه منځ ته راځي چې اکتیویټي یې ددې مودې نه وروسته د یورانیم سره په تعادل حالت کې پاتې کیږي او دالفا، بیتا او گاما وړانګې خپروي. دنوموړې مودې څخه وروسته دپیدا شوو رادیو اکتیو عنصرونواکتیویټي اعظمي قیمت ځانته غوره کوي او په یوه ګرام کې لږ څه دوه سوه کیلو بېکارېل پورې (200 KBq/g) رسیږي. په دغه موده کې نوي رادیو اکتیو ایزوټوپونه لکه رادیم Ra، رادو Rn، پولونیم Po، سرپ Pb، بیسموت Bi منځ ته راځي خو په اخیر کې په یوه ثابت عنصر سرپ دوه سوه لس Pb-206 باندې اوړي. دنوموړي شکل په شي اړخ کې دهغو رادیو اکتیو عنصرنو نومونه لیکل شوي دي چې د یورانیم د تجزیې په کړنلاره کې منځ ته راځي.

دلږ څه یو ملیارد کالونو څخه وروسته غریب شوي یورانیم نورنه تجزیه کیږي او په یوه ثابت یانې په وړانګو نه خپروونکي عنصر سرپ یانې پلوم بوم (Plumbum = Pb-206) باندې اوړي او له دې کبله دغریب شوي یورانیم د تجزیې په لړ کې یوازې نوموړي اخرنی عنصر دی چې روغتیا ته کوم خطر نه لري. دپورتنۍ تحلیل څخه دا پایله ترلاسه کیږي چې دروغتیا په تراودغریب شوي یورانیم خطر په اوسني وخت کې دومره نه بلکه په راتلونکي اوږده موده کې دیرزیا ت اټکل کیږي اوله دې کبله داند پېښې وړدی.


دالفا ذرې په خپرېدلو سره دیورانیم دوه سوه اته دیرش کتلي شمیره A دڅلورپه واحد او د پروتونو شمیره Z ددوه واحدو په کچه راټیټیږي. د بیلګه په ډول درادیوم هسته یوه الفا ذره خپروي نو دکتلي شمیره یې ددوه سوه شپږویش A = 226 څخه دوه سوه ویش A = 222 او دپروتونو شمیر یې د Z = 88 څخه Z = 86 ته راویږي. دا په دې مانا چې په الفا تجزیه کې د پیدا شوو هستو کتلي شمیره دګراف کینې خواته خوځيږي.

په ۳۰- جدول کې دیورانیم دتجزیې په ترڅ کې د پیل څخه تراخیره پورې د ټولوپیدا شوو رادیواکتیو عنصرنونومونه، خپرېدونکي وړانګې او نیمایي فزیکي عمر بنودل شوي دي.



۳۰- جدول: د یورانیم دوه سوه اته دیرش ایزوتوپ د تجزیې په لړ کې ګڼ شمیر نور نوي رادیواکتیو عنصرونه منځ ته راځي چې په زرګونو کالو نیمایی عمر لري او دالفا او بیتا وړانګې خپروي. په نوموړې تجزیه کې دیوه عنصر څخه بل عنصر جوړیږي او په اخیر کې په یو مستقر ثابت عنصر سرب دوه سوه شپږ Pb-206 باندې اوږي. د جدول چېې خوانه بنی خواته عمودي ستنې عبارت دي له: د عنصر نوم Nuclide، فزیکی نیمایی عمر (Half-Life) او وړانګودول (Radiation) رانښيي.

د سلوزرو کالونو څخه وروسته د غریب شوي یورانیم دوه سوه څلور دیرش اکتیویټي اته دیرش او همدارنګه د توریم دوه سوه دیرش اکتیویټي د یورانیم سره برابر کیږي. او د دوه ملیونو کالو څخه وروسته د ټول ایزوتوپونه رادیو اکتیویټي سره برابر او یو اعظمي قیمت ځانته غوره کوي چې په ملیاردونو کالونو پورې په همدې حال پاتې کیږي.




دغریب شوي یورانیمو کیمیاوي خواص

که چیرته دغریب شوي یورانیمو فلز په دومره کوچنیو ټوټو ویشو چې د پودراویا او پرو بڼه ځانته غوره کړي نود تودوخي په نورمال درجې کې هم داوبو، هوا او اکسیجن سره یو کیمیاوي مرکب جوړوی او په خپل سر اوراخلي. کله چې د کاربون دای اکساید او نایتروجن سره یو ځای شي نو سم دلاسه یوه غټه او زوروره کیمیاوي چاودنه منځ ته راوړي. دنوموړو خواصو له کبله دغریب شوي یورانیمو فلز څخه په پوځي برخه کې په سرگوليو او د چاودیدونکو موادو په موخه هم کار اخیستل کیږي.


دغریب شوي یورانیمو سرگولی

په ۷۷- شکل کې د یورانیمو څوډوله سرگولی ښودل شوي دي چې د نړیوال اتومي انرژۍ سازمان له خوا په پخوانۍ یوگوسلاویا کې موندل شوي دي.

په لاندې عکس کې د یورانیمو درې ډوله سرگولي ښودل شوي دي. 	د اکسیریز فلورېسېنس د ډیډیکټور او الکترون میکروسکوپ په مرسته سره د یورانیمو سرگولي کوچني زري ډوبکتورونو په څوکه ښودل شوې دي. غټوالی یې لږ څه یو سلو پنځوس میکرومتر ته رسیږي.
DU ammunitions used during the Kosovo conflict. Credit: A. Bleise/IAEA. 	Images of DU particles (light areas) obtained by Scanning Electron Microscope equipped with an Energy Dispersive X Ray Fluorescence detector. Credit: P. Danesi/IAEA. 

۷۷- شکل: د یورانیمو سرگوليو څو ډولونه ښودل شوي دي چې د پخوانۍ یوگوسلاویا په جگړه کې کارول شوي او د نړیوال اتومي انرژۍ (IAEA) تر څیړنې لاندې نیول شوي دي.

دپام وړ: کله چې یو سوکه یانې حرارتي نیوترون د یورانیم دوه سو په پښه دیرش (U-235) هستې ته ورننوي، نود یورانیم دوه سو شپږ دیرش (U-236) په لوړه کچه هیجاني منځنی هسته منځ ته راځي، چې د ډیر لنډ عمر یانې لس په طاقت د منفي څوارلس ثاني (10^{-14}) څخه وروسته دالفا وړانگوپه خپرولوسره په کریپتون (Kr-89)، باریم (Ba-144) اودوه نیوترونو تجزیه کیږي.



تجربو بنودلي ده چي ديورانيوم سرگولي كله چي د الوتکي څخه و شړل شي او په نښه وه نه لگيري نودهغوی گڼ شمیر سرگولی د ځمکي پرمخ اويا د ځمکي لاندی او يا په کورونو کي خښي پاتي کيږي. که چيرته د نوموړو سرگوليو سره کوچنيان تماس پيدا کړي نوهغو ی ته د خطريوه ډکه سر چينه کيدلای شي. دا ځکه چي د تماس ډوز اندازه يي داتومي انرژي نړيوال سازمان (IAEA) له خوا دوه ملي سيورت په يوه ساعت (2mSv/h) کي اټکل شوی دی(72). دا په دې مانا چي دنړيوال کميسيون ICRU د سپار بښتنې سره سم دعام ولس لپاره دورانگو کلنی لوړه کچه چي يو ملي سيورت په کال کي ټاکل شوی ده د نيم ساعت څخه وروسته پوره کيږی

نن ورځ د يورانيوم وسلو څخه دټانکونوپه جوړولو کي هم کار اخيستل کيږي. د بېلگه په ډول دټانکونو باندني پوښ ديوې سانډويچ په شکل جوړوي. يانې دسانډويچ دمنځ په برخه کي يورانيوم او باندنی دواړه برخي يي بل فلز تشکيلوي. د داسي ډول ټانکونو سره د بدن تما س د لويانو خوپه تيره بيا د کوچنيانو روغتيا ته ډير گواښ دی.


که فرض کړوچي ديوې سرگولی سرعت يو زرو پينځه سوه متره په ثانيه او وزن يي پينځه کيلو گرام وي نود چاودني انرژي يي د تي ان تي TNT په واحد په لاندې ډول لا س ته راځي.


$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = \frac{1}{2} (5\text{kg}) (1500\text{m/s})^2 = 5,6 \text{ MJ} = 1,4 \text{ kg TNT}$$

* **خواب:** لږ څه يونيم کيلو گرام تی ان تي او يا پينځه نيم مېگا ژول.

دغريب شوي يورانيوم پوځي استعمال

څرنگه چي د غريب شوي يورانيم څخه کوم چي دهستوي بتي د فاضله موادو څخه تر لاسه کيږي د روغتيا په تراوخطر لرونکي وړانگي لکه دالفا، بيتا او گاما هستوي وړانگي خپريږي نو له دې کبله د ژوندانه په ورځني عامو او صنعتي برخو کي کوم گټور کار نه شي اخيستل کيدای. خوددی لپاره چي د غريب شوي يورانيوم فلزڅخه يوه اقتصادي گټه تر لاسه شوې وي نو د 1991 م کال څخه را پدې خوا د نړی گڼ شمیر هيوادونه دنوموړي خطر ناک فلزڅخه د يورانيوم وسلي په جوړولو کي کار اخلي. دبيلگي په ډول دغريب شوي يورانيوم څخه په پوځي برخه لکه په الوتکو، ټانکونو، سرگوليو(Warheads) او توغنديو BGM-105 Tomahawk-Cruise Missiles په جوړښت کي د يوه ډير کلک اودرانده فلز په صفت کار اخيستل کيږي. ديوه يورانيوم هستي تجزيه په لاندې ډول ده.





غریب شوی یورانیم د پوځي وسلو لپاره خورا مساعد دی چې د یوې خوا یی د او سپني په پرتله بیه ډیره ټیټه ده او دبلې خوا یی ځانګړې کثافت داوسپني په پرتله لږڅه درې ځله او دسربو (Pb) په پرتله لږ څه دوه ځله لوړ دی. دهمدې لور کثافت ګټه په دې کې ده چې د یورانیم سرګولی دهغوی د سرعت سره سم چې لږ څه یونیم کیلو متر په ثانیه (1,5 km/s) کې قیمت لري. په ډیره اسانۍ سره دپوځي الوتکو، ټانکونو او نورو هغو پوځي وسلو څخه چې د او سپني او یانورو فلزاتو څخه جوړې شوي وي تیریدلای شي او هغوی بیخي د منځه وړي.

نن ورځ یوډول نوي بمونه هم شته دي چې د سمڅ بمونه یا سنگر بمونه ورته ویلای شو (Bunker Bomber) چې دهغوی په سرګولی کې هم غریب شوي یورانیم ورګډ شوی وي. کله چې نومړې سرګولی په یوه پوځي نښه لکه په پرنسو، ډبرو، کانکریت کورونو او نوروشیانوباندې ولګیږي نوپه هغوی کې تر لس گونو متروپورې ژوره ننوتلای شي. د یورانیم وسلو یو بل ځانګړی خاصیت دادی چې کوم وخت دیورانیم سرګولی په نښه ولګیږي نو هلته دومره زیاته تودوخې منځ ته راوړي چې تودوخې یی تر درې زرو درجودسانتي ګراد پورې ($3000\text{ }^{\circ}\text{C}$) پورته ځي او بیا د لارې په اخري برخه کې چوي. د یورانیم په سرګولی کې یو کمپیوټري سیستم نښلول شوې وی چې په هر ه مایکروټا نیه یانې دیوې ثانیه په یو ملیونمه برخه کې د ځمکې لاندې د طی شوي لاری موادو کثافت کچه مرکزي کمپیوټر ته د الکترومقناطیسي څپو په مرسته خبرورکوي. څرنگه چې د ډبرې کثافت، د خاوری کثافت او د هوا کثافت د یوه بل سره توپیر لري نو د مرکزي کمپیوټر له لارې یانې ریموټ کنټرول په مرسته سره سړی کولای شي چې داسې یو کمپیوټري پروګرام مخ تر مخه وټاکي چې د یورانیم سرګولی کله او په ځمکه کې څومره ژوره وچوي. د بېلګه په ډول که چیرته د یوه غره په منځ کې یوه سمڅه او یا په جګړو کې د خلکو د خوندي ساتلو لپاره تر ځمکې لاندې یو غار کېنډل شوی وي نو هلته خواخا مخا هوا موجوده ده نو د سنگر بم په استعمال سره د هماغه غارد هوا کثافت دکمپیوټر په مرسته اندازه کیږي او په هماغه ژوروالي کې بیا بم چوي. دنوموړو وسلو بل خاصیت دادی چې دچاودنې سره سم دهمغه چاپیریال ټول اکسیجن اوراخلي او د تنفس کولو لپاره هیڅ اکسیجن نه پاتې کیږي.


دپوځي وسلو پیژندونکی انګریز مسلکي کارپوه ډای ویلیامز (Dai Williams) په ګوته کوي چې په افغانستان کې کارول شوې سرګولی لکه (GBU-28) یونیم ټن غریب شوی یورانیم لري. دیوې غټې سرګولی لکه Big BLU لږ څه لس ټنه وزن لري. نوموړی کارپوه په افغانستان کې د غریب شوي یورانیم کچه لږ څه یوزر ټنه اټکل کوي(2).

دچاپیریال ککړتیا (Environment contamination)

څرنگه چې دیورانیم وسلو څخه ایونایز کوونکي وړانګې لکه الفا، بېټا او ګاما وړانګې خپریږي نوله دې کبله دچاپیریال ټولواوسیدونکو، نباتاتو، ځنگلونو او حیواناتو ته په تیره بیا په راتلونکو څو کالونو کې دخطر یوه غټه سرچینه ګرزیدلای شي. داځکه چې دانسانانو، نباتاتو اوڅارویو حجرې دیورانیم وسلو کیمیاوي او وړانګیزو زهرجنو ناوړو اغیزوله کبله دتل لپاره زیانمنې کیږي.

په هغه سیمه کې چې د یورا نیم وسله وکارول شي او سرګولی یې په نښه (Target) ولګیږي نوسمد لا سه یې د چاودنې انرژي په حرا راتي انرژي بد لیږي. دپورتني بېلګه سره سم دنوموړې انرژي کچه لږڅه یونیم کیلو ګرام تي این تي TNT قیمت لري. په دې ترڅ کې دومره ډیرتودوخې منځ ته راځي

چې درجه یې دخو زرو سانتي ګراد څخه هم اوړي او په پایله کې د اور یوه لمبه او را دیو اکتیوغاز



ورڅخه پورته کيږي. دغه غاز يا ايروزول (Aerosol) چې ديورانيم اکسايډ (UO₂) نه حل کيدونکي کوچني زري او بڅرکي پکې دي د يو ما يکرو متره يانې ديوه متر يوه يوه يوه يوه يوه يوه يوه يوه بل عبارت د يوه سر وينسته په کچه پنډوالی لري او په آسانی سره دتنفس له لاری بدن ته ننوتلای شي چې په پايله کې داوسيدونکوپه روغتيا او همدارنگه په چاپېريال باندې ناوړه اغيزې لري. په نوموړې کړنلاره کې دغه راډيو اکتیو غاږد باد په مرسته سره هرې خوا ته خپر يږي او په اخير کې د چاپريال ټول ژوندي اونه ژوندي شيان لکه نباتات، څاروي، انسانان، اتموسفير او د ځمکې مخ په راډيو اکتیو موادو ککړ کيږي. که چيرته انسانان، حيوانات، خزنده، نباتات او دچا پريال نور هر اړخيز ژوند سوري د يورا نيم وسلو راډيو اکتیو مواد تنفس کړي او يا د اوبو او خوراک له لاري د هغوی جسم ته ور ننوځي نو دپرو پوهانو په نظرد يورانيم وسله دچاپېريال هر اړخيزو نوموړوژونديو شيانو لپاره به په راتلونکوڅوکلونو کې د خطر يوه غټه سرچينه وگرځي. په پايله کې ددې احتمال هم شته دی چې په اوږده موده کې د چاپېريال په طبيعي اقليم او اوبو هواکې هم داسی بدلون راشي چې ځنکونه، د څاروي ځايونه او نباتات او بوټي به د منځه ولاړ شي. داځکه چې د يورانيم وسلودراډيو اکتیو موادوفزيکي نيمايي عمرڅلورنيم مليارده کالو ته رسيږي. نيمايي عمرهغه وخت ته وايي چې په هغه کې دټاکلي پخواني وخت راډيو اکتیو عنصراندازه نيمايي کچې ته را ولويږي. که چيرته ديورانيم کوچني زري تنفس شي نو ترډيروکالونوپورې په بدن کې پاتې کيدای شي.

د بېلگه په ډول په سړی کې ديورانيم بيا لویژيکي نيمايي عمر دوه کاله نه تر شپاړس کالونوپورې رسيږي. داپه دې مانا چې وروسته له شپاړسو کالونوڅخه ديورانيم نيمايي برخه د بدن څخه وځي اونيمايي برخه يي په بدن کې پاتې کيږي.



دغريب شوي يورانيم فزيکي نيمايي وخت څلورنيم مليارده کاله دی. دا په دې مانا چې د نوموړي وخت څخه وروسته بيا هم دلومړي وخت په پرتله نيمايي اکتیويټي پاتې دی او له دې کبله هغه سيمي چې ديورانيم وسلې پکې خوري وړې شوې او په راډيو اکتيف موادو ککړې شوې وي تر زرگونو کالونو پورې هم په نوموړي عنصر ککړې پاتې کيږي او د روغتيا لپاره دخطريوه سرچينه گرځيدلای شي.

بهرنی وړانگې (External Radiation)

بهرنی وړانگې هغو وړانگوته ويل کيږی چې د يوې راډيو اکتیو سرچينې څخه د بهر نه د يو چا په بدن ولگيږي او هلته خپله انرژي د لاسه ورکړي. د بېلگه په ډول کله چې ديورانيم يوه سرگولی په نښه ولگيږي نو دچاودنې په پايله کې د يورانيم فلزکوچني زري هرې خوا ته خپريږي او يوه برخه يي دځمکې پرمخ پريوځي او بله برخه يي دراډيو اکتیوگرډ په شکل د باد او هواد فشار په واسطه هرې خواته خوځيږي. ديورانيم نوموړي شيندل شوي راډيو اکتیو مواد د گاما، الفا او بېټا وړانگې خپروي چې دچا پريال لپاره د خطر سرچينه گرځيدلای شي.

لومړی: دگاما وړانگې

په ۷۹- شکل کې د يوې بهرنۍ راډيو اکتیوسرچينې گاما وړانگې ښودل شوي دي. دنوموړي سرچينې څخه دگاما وړانگې خپريږي او بيا د يوچا په ټول بدن باندې لگيږي. دغه ډول وړانگو ته بهرنې وړانگې ويل کيږی دا ځکه چې د ليري واټن څخه هم انسانانو، څلور پښيو او نباتاتو ته رسيدلای شي او له دې کبله دخطر سرچينه گرځيدلای شي.




۷۹- شکل: کله چې چاپیریال دیورانیم په رادیو اکتیو موادو ککړ شي نو ددغې سرچینې څخه یوازې د گاما وړانگې کولای شي چې داوسیدونکو وگړو ته زیان ورسوي او په ټول بدن باندې ولگيږي.

که چیرته دځمکې مخ په رادیو اکتیو موادو ککړ وي نو معادل ډوز H په واحد دملي سیورت په ثانیه د لاندې معادلې څخه تر لاسه کولای شو.

معادل ډوز = دډوز ضریب (mSv m^2) $\times$ دځمکې ککړه سطحه (Bq/m^2)

$H (\text{mSv s}^{-1}) = \text{Dose faktor } (\text{mSv m}^2) \times \text{Surface activity } (\text{Bq /m}^2)$

په پورتنۍ معادله کې دډوز ضریب دیوه مترمربع ځمکې سطحې څخه دورانگو انرژي ډوز په واحد ملي سیورت mSv مانا ورکوي. نوموړی قیمت د نړیوال سازمان ICRP د خپرونو څخه اخیستل شوي دی او دهر یوه ایزوتوپ لپاره ځانگړی قیمت لري. د بیلگې په ډول د سیزیم ایزوتوپ لپاره نوموړی ضریب $0,39 \times 10^{-12} \text{ mSv m}^2$ قیمت لري.



* **پوښتنه:** په ۱۹۸۶ م کال کې دچرنوبیل هستوي پيښه منځ ته راغله اودالمان په جنوبي سيمه کې دځمکې په يو مترمربع سطحه باندې د سيزيم راديو اکتیوايزوتوپ درى زره بېکاريل اکتیويټي اندازه شوه. دمعادل پوزکچه په يوه مترارتفاع کې څومره ده؟ يادونه: (1Bq = 1/s)

* **حل:**

$$3000 \text{ Bq/m}^2 \times 0,39 \times 10^{-12} \text{ mSv m}^2 = 117 \times 10^{-9} \text{ mSv/s} = 0,04 \text{ mSv/a}$$

* **ځواب:** په يوه کال $\text{annual} = a$ کې ديوه متر مربع ځمکې څخه څلويښت مايکرو سيورت گاماوړانگې خپريږي. دنوموړي بېلگه څخه ښکاري چې د بدن لپا ره د بهرنيو وړانگو خطرکچه د پام وړنه ده.


دويم: دالفا او بېتا وړانگې

څرنگه چې په هواکې دالفا وړانگو اود بېتا وړانگود خپريدلو واټن Range د څو سانتي مترو څخه نه اوړي نو له دې کبله ديوراننيوم نوموړو وړانگوخطر دليري واټن او د بهر خوا څخه خورا لږ اټکل کيږي. خو که چيرته د يورانيم سرگولی کوچنی زړې په پوستکي کې خښې پاتې شي اويا د يوه پرهار يانې د بدن تپي شوې برخې، تنفس اوخوراک دلارې بدن ته ننوځي نودالفا او بېتا وړانگو خطر دگاما وړانگو په پرتله څو ځله ډيردی.

دځمکې د سطحې څخه کيدلای شي چې د يورانيم کوچنی زړې د ځمکې لاندې ژورو اوبو لکه څاه، کاریز، وياله ، سرچينه اونورو ته لاره پيداکړي نوبيا ددې امکان شته دی چې د څلور پښيو او نباتاتو څخه جذب شي او بيا بيرته د خوراک او څښاک دلارې دخلکو بدن ته ورننوځي.

لکه څرنگه چې د لویا نو لپاره د يوراننيوم وسله د خطر يوه سرچينه گڼل کيږي همدارنگه کوچنيان هم دنوموړي عنصر د خطر سره مخامخ دي ، چې د هوا، خوراک او داوبوڅښلو له لارې دهغوی بدن ته ننوځي. په څلورپښيوکې تجربو دا سپينه کړې ده، چې کوچني څلورپښي د غټو څلورپښيو په پرتله، په وينه کې په لوړه کچه يوراننيوم جذب کيږي. همدارنگه تجربو وښودله، چې په دوه ځانو څلورپښيو کې (0,03%) درى په زرو کې نطفې ته يوراننيوم وررسيدلی وه، کله چې دغه څلور پښيو ته په لوړه کچه يوراننيوم پيچکاري شوې وه. همدارنگه هغه کوچني څلورپښي، چې د مور شدي يي راودلي اود ميندو څلورپښيو ته يورانيم پيچکاري شوي وو، په او لادو کې هم يوراننيوم پيدا شو. په داسې حال کې چې په نارينه څلورپښيوکې د سپرم (Sperm) شمير را ښکته شو.

دهستوي وړانگوځانگړي فزيکي خواص			
مخصوصه ايونايژيشن	سرعت	په هوا کې دخپريدواټن	دورانگودول
Ion pairs/cm	km/sec	Range in air	Radiation
20000- 50000	3000-32000	5-7 cm	الفائزه
50-500	دنورسرعت 25-99%	200-800 cm	بيټائزه
5-8	دنورسرعت 300000	دنېما يي پنډوالي کارول	گاما وړانگې




دپام ور:

هرڅومره چې په يوه هسته کې دنيوترونواوپروتونواصول تقسيم يانې تناسب لږوي په همغه کچه دغه هسته راديواکتيوخاصيت لري او د α لږ يوه ذره خپروي . دبيلگي په ډول په پولونيم دوه سوه لس کې Polonium-210 ، مخکې له تجزيي څخه يوسلو شپږويشت نيوترونه اوڅلور اتيا پروتونه لري. نوموړی تناسب مساوي دی له: $126/84 = 1,50$ خوکه چې د α لږ يوه ذره خپره کړي يانې تجزيه شي نو دنيوترونواوپروتونو تناسب يې مساوي دی له: $124/82 = 1,51$ دا په دې مانا چې وروستی تناسب دپخواپه پرتله لوړ دی او هسته دپخوا په پرتله دانرژي يوه ثابت حالت غوره کړ.

پوښتنې (Questions):

- ۱-۱۰ غريب شوی يورانيم څه ډول تعريف شوی دی؟
- ۲-۱۰ د خليج سيندروم ناروغی Gulf syndrome څه ډول کلينيکي نښې لري؟
- ۳-۱۰ د غريب شوي يورانيم فزيکي اوبیالوژيکي نيمایي عمر څومره دی؟
- ۴-۱۰ د غريب شوي يورانيم پوځي استعمال او هم ملکي يانې غير نظامي استعمال وښيي؟
- ۵-۱۰ په چاپيريال کې د غريب شوي يورانيم کوچنی ذرې دکومو لارو څخه بدن ته ننوتلای شي؟
- ۶-۱۰ د طبيعي يورانيم اود غريب شوي يورانيم ترمنځ توپير څه دی؟
- ۷-۱۰ د غريب شوي يورانيم څخه په لوړه کچه کومې وړانگې خپريږي اوانرژي يې څومره ده؟



شپږمه برخه

یوولسم څپرکی

په روغتیا باندې د وړانگو ناوړه اغیزې

(Health hazards of radiation effects)


سریزه:

د هغې مودې نه چې انسان د ځمکې پر مخ پیداشوی دی او دنړۍ په هر ګوټ کې که ژوند هم کوي دطبیعي وړانگو دخطر سره مخامخ دی. د طبیعي وړانګویوه غټه سرچینه پخپله لمرتشکیلوي. د بېلګه په ډول د لمر په ننه کې دهیلیم او هایډروجن هستې سره ویلي کیږي (Fusion) اودهغوی د هستوي تعاملاتوپه پایله کې ځمکې ته الکترومقناطیسي وړانګې لکه لمر، د تودوخې وړانګې اوهستوي ذرې لکه پروتونه، نیوترونه او میونونه خپریږي.

داسې اټکل کیږي چې د لمر په ننه کې هره ثانیه شپږ سوه ملیونه ټنه (600 mill tons) هایډروجن هستې سره ویلي کیږي او پینځه سوه پینځه نوي ملیونه ټنه (595 mill tons) هلیم هستې ورڅخه جوړیږي. دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې د هایډروجن دا پینځه ملیونه (5 mill tons) هستې څه شوي؟ دالبرت اینشتاین (Albert Einstein) د فرمول له مخې د لمرپه منځ کې دغه پینځه ملیونه ها یدروجن کتلي کمښت په انرژي بدلیږي اود الکترومقناطیسي وړانګولکه د لمر وړانګو ، دنیوترون زرو اونورو هر اړخیز کوچنیو زروپه بڼه هری خواته خپریږي.

که څه هم د لمر وړانګې د ځمکې پرمخ ټولوژوو ته دژوند ی پاتې کیدلوبنسټ تشکیلوي خو بیا هم نوموړې وړانګې او همدارنګه د فضا څخه کازمیکي وړانګې که په ډیره کمه کچه هم دي خوبیا هم د انسانانود روغتیا په تړاوداندیښني وړدي.

د 1896 م کال څخه را پدې خوا ساینس پوهانو ته څرګنده شوې ده چې که د ایونایز کونکو وړانګو سره سم چلن وه نه شي نو د رادیو اکتیو موادو هستوي وړانګې څومره چې دناروغیو په درملنه کې ګټوررول لوبوي نوپه همغه کچه د ګټې په څنګ کې روغتیا ته هم د خطریوه ستره سرچینه کیدلای



شي. دېبلگه په ډول کله چې په 1896 م کال کې دراديووم Radium راديو اکتیو عنصر د پولینډي هیواد یوې فزیک پوهې میرمنې ماري کیوري (Marie Curie) څخه په فرانسه کې دڅیړنو په ترڅ کې را برسیره (کشف) شونودنوموړې کارپوهې یوبل نامتو فزیک پوه هېنري بېکاریل (Henri Becquerel) دمیرمن کیوري څخه هیله وکړه چې دراديووم یوه کوچنۍ نمونه یا سمپل چې د پېښلېنډي (Pechblende) په کریسال کې د مرکب په شکل موجوده وه دتجربو په موخه هغه ته امانت ورکړي. کله چې فروفیسر بېکاریل دراديووم یوه کوچنۍ نمونه د واسکت په جیب کې کینودله نو وروسته له شپږو ساعتونو څخه دنوموړې کارپوه د بدن پوستکي دیورانیوم راديو اکتیو وړانګود بیاوژیکي ناوړې اغیزې له کبله وسوځیده او په خوژیدلوې پیل وکړ. ښاغلي بېکارېل سمدلاسه دیورانیوم نمونه بیرته میرمن کیوري ته وسپارله اوورته وه یې ویل:

دستاسو د ښه نیت څخه ډیره مننه خو هغه څه چې راديووم Radium عنصر پرما باندې وکړه خواه مې ورڅخه ډیره بده شوه. او اوس تا سوته دغه امانت بیرته سپارم.

کله چې په 1895 م کال کې د اکسریز د جرمني فزیک پوه رونتګن له خوا کشف شوې نو شپږ میاشتي وروسته د ناروغیوپه پیژندنه کې ورڅخه ګټه اخېستل پیل شوه. خو په 1900 م کال کې د جراحي او رادیولوژي ګڼ شمیر ډاکتران چې ډاکسریز د استعمال سره یې پوره پام اوسم چلن نه وو کړې دورانګو په ناروغۍ اخته او یا ټپي شول.

د نونسمې پیړۍ په لومړیو دوه لسیزو کې دیورانیوم فلز څخه دډیرو شیانود ښایسته ښکارېدلو په موخه لکه هینداره، چینایي لوبښي، دغاړې ګاڼه، قاشق، پنجې اونورو شیانو په جوړولو کې دیوې رنگیز مادې په صفت کار اخيستل کیده. همدارنګه دچلم څکولو هغه برخه چې په خوله کې نیول کیږي دښایست په موخه د یورانیوم فلز څخه جوړه وه. د څو کالونو څخه وروسته دا څرګنده شوه چې هغو کارګرو چې په فابریکو کې یې کارکولواد یورانیوم فلز سره دنوموړو شیانو په تولید کې برخه درلوده د لږ څه د یارلسو کالونو څخه وروسته د هډوکو سرطان (Bonesarkome) په ناروغۍ اخته شول. دا ځکه چې درادیم راديو اکتیو مواد دبدن نورو غړو په پرتله په هډوکو کې زیات جذب کیږي.

نن ورځ په دې کې هیڅ شک نه شته، چې دراديو اکتیو موادو وړانګي که په ډیره کمه کچه هم وي، د سرطان ناروغۍ دراپارولو (Induction) سبب(لامل) ګر زیدلای شي.


د یورانیوم کیمیاوي او راد یولوژیکي زهرجنې اغیزې

دیورانیوم وسلې راديو اکتیو ایزوټوپونه د روغتیا لپاره دوه مهم او دیادوني وړ خطرونه لري چې دهر ډول ناروغیود منځ ته راتلو سبب(لامل) کیدای شي. نوموړي خطرونه عبارت دي له:

کیمیاوي زهرجنې اغیزې (chemical toxicity) ☒

LD₅₀ هغه اندازه کیمیاوي زهرجن موادواويا دورانګو انرژي ډوز ته ویل کیږي چې ازمویل شووکسانو څخه نیمایي مړه کوي. دنوموړي کمیت واحد یوملي ګرام زهرجن مواد دبدن په یوه کلوګرام کتله باندې ټاکل شویډی. ☒

راد یولوژیکي یانې دورانګو زهرجنې اغیزې (radiological toxicity) ☒



د یورانیمویم کیمیاوي او رادیولوژیکی زهرجنې اغیزې	
رادیولوژیکی زهرجنې اغیزې (radiological toxicity)	کیمیاوي زهرجنې اغیزې (chemical toxicity)
د حجرو په کروموزومو کې یورانیمویم جذب کیدی او هلته په جنینو کې بدلون راولي چې د سرطان ناروغۍ احتمال ورسره زیات تیري	د بدن ځینو غړو دندې نیمګړې کیدي د بېلګه په ډول پښتورګی یورانیمویم ډیر زیات جذب کوي چې د التهاب سبب (لامل) ګرځي. Nephritis


لومړۍ: کیمیاوي زهرجنې اغیزې (Chemical toxicity)

دیورانیمویم هستوي وړانګې د بدن په حجرو کې سوماتیک او جنټیک ناوړه اغیزې تر سره کوي. نو کله چې دیورانیمویم کثافت اندازه د ټاکلې کچې څخه د بدن په غړو کې پورته لاره شي په تیره بیا لکه په پښتورګو کې نو دغه غړي خپله دنده په سمه او صحیح توګه نه شي تر سره کولای اود هماغه غړي د التهاب سبب (لامل) ګرځي. یورانیمویم لکه سیماب (Hg) ، ارزین (Arsen) ، سرپ (Pb) او نیکل (Ni) یوډیر زهرجن فلز دی چې د بدن ډیر وغړو دندې په تیره بیا د پښتورګو کارکول نیمګړی کوي. د نړیوال روغتیا سازمان (WHO) د سپار بنټنې سره سم دعام ولس لپاره په یوه ګرام پښتورګو کې د یورانیمویم غلظت (Concentration) اندازه د دریو مایکروګرام (3μ g) څخه وا نه وړي. دیورانیمویم ډای اکساید ایون (UO_2^{+}) یو ډیر پیاوړی رادیکال دی چې د بیا لوژیکی مالیکولو او غړو په نسجونو کې د بیکاربونات (Bicarbonate) ، سیترات (Citrate) او پروتینوسره زهرجن کیمیاوي کمپلکس (Complexes) مرکبونه جوړوي.

☞ که چیرته پینځه ملی ګرام نه حل کیدونکی یورانیمویم (UO_2) تنفس شي نو پایله یې دومره خطرناکه ده چې سړی د مرګ سره مخامخ کوي او یا داچې پښتورګي د تل لپاره د کار کولو څخه وباسي.

دویم: رادیولوژیکی زهرجنې اغیزې (Radiological toxicity)

دروغتیا په تړاو دیورانیمویم رادیواکتیو موادو دویمه ناوړه اغیزه دایونایز کونکو وړانګو هغه زیان دی چې د بدن په حجرو کې دموټیشن سبب (لامل) ګرزي. کله چې دیورانیمویم هستوي وړانګې د بدن په حجرو ولګیږي نو په هسته کې یې د کروموزوموپه جوړښت کې بدلون راولي چې دغه ډول اغیزې ته موټیشن (Mutation) ویل کیدي او په نتیجه کې دسرطان ناروغي لکه دویني سرطان منځ ته راوستلای شي. په هغه سیمه کې چې دیورانیمویم سرګولی ولګیږي نو سمدلاسه په دغه چاپر یال کې دایونایز کونکو وړانګو معادل ډوز لس ملی سیورټ (10 mSv) چې د طبیعي وړانګو څخه لږ څه پینځه ځله لوړ قیمت لري رامنځ ته کیدای شي (33). دنوموړو زهرجنو اغیزو بر سیره، په بدن کې د یورانیمویم شته والی، ددې سبب (لامل) ګرځي، چې د بدن ددفاع بنسټیز سیستم (Immune System) کمزوری کړي اوله امله انسان د بېلا بېلو سختوناروغیوسره لاس او ګریوان کیدي.



دروغتيا په تړاو د يورانيم زهرجن ډولونه




يورانيوم ډير سخت کيمياوي زهرجن راديواکتيو مواد دي چې د بدن مهمو غړو دندې په تيره بيا لکه پښتورگي په تپه دروي او يا د التهاب سبب (لامل) گرځي.

يورانيوم دالفا وړانگې خپروي اونوموړې وړانگې د حجرې په ډي اين اي DNA کې بدلون (Mutation) راوستلای شي. په پايله کې د سرطان ناروغي منځ ته راتلای شي.

که په پوره اندازه يورانيم د تنفس له لارې او يا د خوراک له لارې بدن ته ورننوځي، نو دروغتيا په تړاو دنوموړي عنصر کيمياوي اوراديو لوژيکي زيان احتمال ډير لوړ اټکل کيږي. داځکه چې ديورانيم فلز دنورو درندو او زهرجنو فلزاتو لکه کادميم cadmium او سيماب mercury په ډول سخت کيمياوي زهرجن ايونونه اوازاد رادیکال لري. د يورانيم فلز ايونونه دومره کيمياوي زهرجن مواد دي، چې د پښتورگو دنده د فعاليت څخه و باسي او يا دهغو د التهاب سبب (لامل) گرځي. دا په ډي مانا چې بدن ته ديورانيم وسلو زيان په لومړي درجه د کيمياوي زهر نه پيل کيږي او بيا په دويمه درجه ديورانيم وړانگو زيان د بدن نورو غړو ته د اندېښنې وړ دی. ديورانيم وسلو دورانگو زهر د کيمياوي زهر په پر تله ډيرکالونه وروسته پيل کيږي او د سرطان ناروغي احتمال يې د هغې سيمي اوسيدونکو ته په راتلونکي وخت کې د اندېښنې وړ دی.

➤ په دې اړوند بايد وويل شي چې که يو چا ته ديورانيم وړانگې ورسېږي نو دورانگو زهر لکه د سرطان ناروغي سمدلاسه منځ ته نه راځي، بلکه په کالونو او کالونو وروسته را برسېره کيږي. په داسې حال کې چې ديورانيم کيمياوي زهر سمدلاسه پيل کيږي

دورانگو لوړ لېمېټ چې د روغتيا په تړاو دا ندېښنې وړ نه دی د وړانگو څخه د ساتنې نړيوال کميسيون (International Commission on Radiological Protection = ICRP) له خوا ټاکل شوي دي. دنوموړي سازمان لخوا دورانگو اعظمي انرژي ډوز لېمېټ د عام ولس لپاره په يوه کال کې يو ملي سيورټ **1 mSv** او دهغو خلکو لپاره چې په مسلکي توگه دراديو اکتيو موادو سره بوخت او سروکار ولري شل ملي سيورټ **20 mSv** ټاکل شوي دي.



د نړیوال روغتیا سازمان له خواداسې اټکل کيږي چې که شل زرو کسانو ته یو ملي سیورت وړانګې په یوه کال کې ورسېږي، نو هغه اضافګی خطر چې د یو ملي سیورت وړانګو سره تړ اړي او د سرطان ناروغۍ منځ ته راوستلای شي، نو د شل زرو کسانو څخه به یو تن مړشي. په داسې حال کې چې په طبیعي توګه سره دعام ولس د پنځو تنو څخه که څه هم هغوی ته وړانګې ورر سپړلې نه وي د نا څرګنده علت په اساس د سرطان ناروغۍ څخه یو تن مړ کيږي.

د وړانګو نه دځان ساتنې نړیوال کمیسیون ICRP له خواد یو بیو کینېټیک موډل په مرسته سره یوه ریاضي شمیرنه دغریب شوي یورانیم (DU) لپاره تر سره شوې، چې په لاندنۍ جدول کې بنودل شوی ده. نوموړی جدول مور ته جوته وي چې په کومه اندازه یورانیم بدن ته دتنفس او خوراک له لاری د اجازې وړ دی، تر څو د نوموړي عنصر کیمیاوي زیان لېمت دیوی خوا او د رادیولوژیکی زیان لیمیت دېلې خوا تر پښو لاندې نه شي. دروغتیا نړیوال سازمان WHO په خوراکي موادوکې دیورانیم کچه په لاندې ډول سپارښتنه کوي.

دیورانیم کیمیاوي زیان لوړ لیمیت کچه $3\mu\text{g/g}$ دری مایکرو ګرام یورانیم په یوګرام پښتورګوکې ټاکل شوی دی.

کله چې ټول بدن په متجانس ډول په وړانګو رڼا شي نو دیورانیم وړانګو اغیزمن انرژي دوزپه یوه کال کې د یو ملي سیورت (1 mSv) څخه وانه وړي.


دیورانیم کثافت د بدن په هر کیلو ګرام وزن اویوه ورځ کې دصفر عشر یه پینځه مایکروګرام ($0,5\mu\text{g}$) څخه وانه وړي

دتنفس په یوه متر مکعب هوا کې د یورانیم کثافت د یو مایکرو ګرام یانې د ګرام یو په ملیونمې برخې څخه وانه وړي ($1\mu\text{g/m}^3$)

کوچنیانو ته د څښاک داسې اوبه ورکړ شي چې یورانیم پکې هیڅ نه وي او دلویانو لپاره دڅښاک په یو لیتر اوبوکې دیورانیم لوړ لېمیت د یوه مایکروګرام دوه په لسمه برخه $0,2\mu\text{g/liter}$ ټاکل شوی دی


په ټول بدن کې د یورانیم کچه پینځه په لس مایکروګرام په یوه کیلوګرام نسجونو $0,5\mu\text{g/Kg}$ کې او یا په بل عبارت دیرش مایکرو ګرام په ورځ کې $30\mu\text{g/day}$ وانه وړي

په طبیعت کې د ځواکونو(قواو) پیژندل شوي ډولونه		
دغبرګون ساحې ډول	نسبي زورورتوتیا	
Graviton گراویټون	10^{-39}	Gravitational force دځمکې جاذبه قوه
Boson بوزون	10^{-7}	Weak force کمزوري قوه
Photon فوتون	10^{-2}	Electrom. force الکترومقناطیسي قوه
Gluon گلوون	1	Stronge force زوروره قوه



Route of intake بدن ته دیورانیم د ننوتلولاړ	بدن ته دیورانیم هغه اندازه لیمیت چې غلظت یې د پښتورگي په یوه گرام نسجونو کې درې میکرو گرام ته ورسیري 3μg/mg		بدن ته دیورانیم هغه اندازه لیمیت چې یو ملي سیورت ورانگې منځ ته راولي 1 mSv	
	کتله (mg)	Activity (Bq) اکتیویټي په بېکاریل	کتله (mg)	Activity (Bq) اکتیویټي په بېکارېل
Inhalation دحل وړ یورانیم لکه UO_3 گردونه یا اېرزول تنفس کول	230	3400	32	480
Inhalation د نه حل کیدونکي یورانیم لکه UO_2 گردونو تنفس کول	7400	110000	11	160
Ingstion د حل کیدونکي یورانیم اندازه چې دخوراک له لارې بدن ته ننوځي	400	5900	1500	22000
Ingestion د نه حل کیدونکي یورانیم اندازه چې دخوراک له لارې بدن ته ننوځي	4000	59000	8800	130000

۳۱- جدول: دورانگو نه دځان ساتنې نړیوال کمیسیون ICRP له خوا د یورانیم ترتولو لورلیمیت بنسودل شوی دی، چې دروغتیا په تراوداندینې وړ نه گڼل کیږي. د بېلگه په ډول نوموړې جدول رانښيي چې که د خوراک او څښاک له لارې (Ingestion) څلورسوه ملي گرام یورانیم (400 mg) بدن ته ننوځي، خو سره دهغې هم په پښتورگوکې د کیمیاوي زیان لوړ لېمېټ 3μg/mg څخه یې قیمت نه اوړي. همدا رنگه که دیو چا بدن ته لږ څه یوزرو پینځه سوه ملي گرام (1500 mg) یورانیم ورننو تلاي شي بې له دې چې دیورانیم دورانگو دز یان لوړ لیمیت یانې یوملی سیورت (1mSv) څخه یې قیمت پورته لاړشي.




بدن ته د وړانگو د خطر هراړخيزې لارې

ديورانيم وسلې راديو اکتیو مواد چې د الفا، بيټا او گاما وړانگې خپروي د مختلفو لارو لکه تنفس (Inhalation)، خوراک (Ingestion)، څښاک، د بدن ټپي شوي برخې، او پوستکي څخه بدن ته دننه ورننوځي او په دې ډول د خلکو روغتيا د خطر سره مخامخ کوي.

	۱- بهرنۍ وړانگې (External Radiation) : هغه وړانگې دي چې دباندې خوا څخه په بدن لگيږي. که څوک د يورانيم سرچينې ته ورنږدې شي نو دهغه بدن ته د گاما وړانگو زيان دالفا او بيټا وړانگو په پرتله ډير زيات دی.
	۲- د ننه وړانگې (Internal Radiation) : هغه وړانگې دي چې د بدن په ننه کې خپريږي. د بيلگي په ډول کله چې ديورانيم کوچنۍ ذرې د تنفس، پوستکي، د خوراک او يا څښاک له لارې بدن ته ننوځي. د بدن په ننه کې دالفا او بيټا وړانگو زيان د گاما وړانگو په پرتله ډير دندېښني وړ دی.
	۳- دککړتيا وړانگې (Contamination Radiation) : که چيرته د بدن پوستکي ديورانيم په کوچنۍ ذرو او يا راديو اکتیو گرد ککړ شي، نو هغه وړانگې چې ورڅخه خپريږي او په پايله کې بدن ته ننوځي، دککړتيا وړانگو په نامه سره ياديږي. د پوستکي په مخ ديورانيم وسلې دالفا او بيټا وړانگو زيان د گاما وړانگو په پرتله ډير زيات دی.

۸۰ - شکل: بدن ته د پوستکي، د تنفس اود بهر نه د وړانگو د ننوتلو او جذب کيدلو هراړخيزې لارې ښودل شوي دي.




دبېلگه په ډول که ډيورانيوم يوه سرگولی چې قطر يې يو ډيرش ملي متر او دوه سوه اويا گرامه وزن ولري په پوستکي کې ننوځي نو په يوه ساعت کې دانرژي ډوز اندازه يې د دوه ملي سيورت (2mSv/h) څخه هم اوړي. دا په دې مانا چې دپوستکي لپاره داندېښنې وړ انرژي ډوز قيمت چې دنړيوال کمسيون ICRP له خواپه يوه کال کې پينځه سوه ملي سيورته 500 mSv/a ټاکل شوی دی د دوه سوه پنځوس ساعتو څخه وروسته پوره کيږي. دنوموړې سرگولی قدرت دواټن په مربع سره برعکس کمښت مومي. د بېلگه په ډول دپوستکي څخه په يوه متر واټن کې نوموړی قدرت يوازې اوه نانو سيورت په ساعت کې (7 nSv/h) قيمت لري. په ليرې واټن کې يوازې د گاماو رانکو خطر داندېښنې وړ دی په داسې حال کې چې دالفا وړانگې په لږڅه يو سانتي متر هوا او دبېتا وړانگې د هواڅو سانتي مترو د تيريدلو څخه بيخي جذب کيږي.

دورانگوڅخه دساتنې نړيوال کميسيون ICRP د سپارښتنې سره سم دعام و لس لپاره کلنی انرژي ډوزکچه 1 mSv يو ملي سيورت ټاکل شوی لوړ لېميت هغه وخت پوره کيږي، کله چې يو څوک په يوه ساعت کې لږ څه يو متر مکعب $1\text{ cm}^3/\text{h}$ هوا تنفس کړي او په همدغه يوه متر مکعب هوا کې د يورانيوم وسلې کثافت بايد د يو مايکرو گرام څخه وا نه وړي ($1\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$). څرنگه چې يورانيوم د پښتورگو لپاره ډير زهرجن مواد دي، نو د څښلو په اوبو کې ديورانيوم اندازه دنړيوال روغتيا سازمان WHO د سپارښتنې په بنسټ د دوه مايکرو گرام څخه ($2\mu\text{g}/\text{Liter}$) په يوه ليتر اوبوکې وانه وړي.

په روغتيا باندې د يورانيم وسلوناوره اغيزې په دې پورې اړه لري، چې په نسجونوکې جذب شوي انرژي په کومه کچه بيالوژيکي ناوړه بدلون منځ ته راولي. همدا رنگه دبدن حجروته چې کومه انرژي انتقال کيږي، د وړانگو په ډول، دورانگوپه انرژي، دحجروپه ډول اود تشعشع په موده پورې اړه لري. د بدن هغه حجرې چې د هغوي د وېشتوب کړنلاره يا ميتوزپه لور ه فريکونسي سره تر سره کيږي د بېلگه په ډول سپين کرويټات، د ها ضمي سيستم حجرې، د کوچنيانو دبدن ټولې حجرې او د مور په نس کې سټريډونکي ماشوم، د وړانگو په مقابل کې دنورو حجروپه اړوند، ډير حساسيت څرگندوي او له دې کبله هم دسترو يانې بالغو سړيو په پرتله دوه واړه زيات خطر سره مخامخ دي.

دبېلگه په ډول که فرض کړوچې ديورانيوم يوه کوچنۍ ذره، چې قطريي ددوه نيم مايکرو متر $2.5\mu\text{m}$ په اندازه وي او د سريوه ويښته سره يوشان ده، تنفس شي نو دغه کوچنۍ ذره تقريبا په يوه کال کې څلوېښت الفا وړانگې خپروي ($40\text{ alpha particles}$). هغه اغيزناکه معادل انرژي ډوز چې نوموړې ذره يې په يوه کال کې شاوخوا نسجونوته انتقال کوي له **دوه ذره ملي سيورت** 2000 mSv/a سره مساوی ده. په داسې حال کې چې د نړيوال روغتيا سازمان WHO له خوا دعامو خلکو دټول بدن لپاره، دورانگو لور ه کچه يا لېمېټ په يوه کال کې **يوملي سيورته** 1mSv/a ټاکل شوې ده.



بدن ته دورانګو د خطر هراړخيزې لارې په لاندې ډول سره تر څيرنې لاندې نيسو:

لومړۍ: د تنفس د لارې (Inhalation)

که چاپيريال ديوراننيوم په راډيو اکتیو گرد (Aerosols) ککړشي نو دتنفس له لارې لومړۍ دنوموړي گردیوه برخه سږو ته ورننوځي. ديوراننيوم هغه کوچنۍ زري چې قطريې يومايکرومترستروالی لري يوه برخه يې دلمف نوډ (Lymph node) ته لاره پيدا کوي او بله برخه يې د سږي څخه وينې (Blood) ته ننوځي او په دې ډول د بدن هر ځای ته انتقال يا نې ليردول کيږي.


- دبېلګه په ډول شپيته په سل (60%) په هډوکو، شپارس په سل (16%) په سږو، اته په سل (8%) په پښتورګو او پاتې برخه يې د وينې د لارې د بدن نورو برخو ته انتقال کيږي.
- که چيرې د يوراننيم کوچنۍ زري د نه حل کيدونکو مرکباتو ډلې څخه وي نو کيدای شي چې نوموړی عنصر د شپارسو کالونو څخه هم زياته موده په سږو کې پاتې شي او هلته په زياته کچه انرژي جذب شي.
- ديوراننيوم وسلوراديو اکتیوګرد (Aerosols) شپيته په سل کې د $60\% \text{U}_3\text{O}_8$ او شل په سل کې 20% اکسايډ مرکباتو څخه جوړدی چې په اوبو کې نه حل کيږي.

دتنفس له لارې دورانګو معادل انرژي ډوز H په واحد دملي سيورت په ثانيه (mSv/s) دلاندنی معادلي څخه تر لاسه کيږي.


معادل ډوز = دډوز ضريب (mSv/Bq) × دهواتنفس اندازه (m^3/s) × اکتیويټي (Bq/m^3)

$$H (\text{mSv s}^{-1}) = \text{Dose faktor} (\text{mSv Bq}^{-1}) \times \text{Breathrate} (\text{m}^3 \text{s}^{-1}) \times \text{Activity} (\text{Bq m}^{-3})$$

په پورتنۍ معادله کې دورانګو معادل ډوز H په واحد ملي سيورت او په يوه ثانيه کې هغه وخت شميرلای شو، چې دتنفس شوي ايزوتوپ راډيو اکتیويټي په يومکعب متر هوا کې راته مالوم وي. دېلې خوا دنړيوال کمسيون ICRP دڅيړوني سره سم په يوه ثانيه کې يونورمال بالغ سږي په يوه ثانيه کې لږ څه $\text{Breathing rate} = 6,03 \times 10^{-5} \text{m}^3/\text{s}$ هوا تنفس کوي. دډوز ضريب هغه فزيکي کميت دی چې ديوه بیکاريل اکتیويټي معادل انرژي ډوز په واحد ملي سيورت رابښي. نوموړی کميت دهر يوه ايزوتوپ اود بدن هر يوه غړي لپاره ځانګړی قيمت لري او په نړيوالو څيړونو کې (BMI; 1986) خپور شوی دی.




د لوپکېمي (Leukemia) يا دويني سرطان د منځ ته راتللو احتمال هغه وخت زيات اټکل کيږي کله چې د يورانينوم کوچني زري دويني له لاري د لومف سيستم (Lymphsystem) او د پلنو هډوکو لکه پښتۍ، د سر هډوکوماز غوټه چې هلته سپين او سره کرويات جوړيږي (Bone marrow) ورننوځي او جذب شي.



۸۱- شکل: کله چې د چاپيريال څخه په راډيواکتيو موادو ککړ شوي هوا تنفس شي نو بيا وروسته د سږو حجرو په کروموزومو کې د يوکيمياوي مرکب په بڼه جذب کيږي او هلته دالفا وړانگو په واسطه د ډي.اين.اي. (DNA-Helix) غبرگ تاوشوي مزې يا نې هېليکس پرې کيږي.

په پورتنۍ شکل کې بڼې خواته د سږي حجرو ډي.اين.اي. (DNA-Helix) غبرگ تاوشوي مزې يا نې هېليکس بنودل شوي دي چې دالفا وړانگوراديو اکتيو مواد تنفس شوي دي. ☠

د ډي.اين.اي. (DNA-Helix) پورتنۍ برخه کې دواړه تارونه او لاندنۍ برخه کې يو تارد الفا وړانگودغبرگون په پايله کې پرې شوي دي. ☠



دوینې سرطان (Leukemia) :

دسپینوکرویاتونا هر ډول ناروغی او بدلون ته، د وینې سرطان ویل کیږي. که څه هم دنوموړی ناروغي اصلي علت لا تر اوسه څرگند نه دی، خودکارپوهانو په اند په ډیر احتمال سره دخطر فکتورونه (Risk factor) ایونایز کوونکي وړانکي (الفاء، بېتا، گاما)، وایرس، باکتریا، ځیتوستاتیکا (Cytostatica) او کیمیاوي مواد تشکیلوي. دوینې سرطان کلینیکي نښې دادي چې دوینې جوړونکوسرچینوکې، د یوې خواد سپینوکرویاتوشمیرد اړتیا نه ډیر بیخي پورته ځي او دېلي خوادغه تولید شوي سپین کرویات، دپوخوالی پراوته نه وي رسیدلي او له دې کبله خپله دنده نه شي تر سره کولای. د وینې جوړونکي سرچینې عبارت دی له:

- د بدن ټول پلنوهوکوپه ما غزوکې لکه : (red bone marrow) ، لکن خاصره (Iliac Pelvis bone) ، دسینې په پوښتیوکې (Ribs) ، ککړی (Skull) ، د سینې سرپوښتی یا عظم قص (Sternum) چې په ډیره کچه د وینې سره کرویات اوهمدارنگه سپین کرویات جوړیږي. په پایله کې دوینې کمښت، د ایمون سیستم (Imunsystem) کمزورتیا، درنگ سپینوالی او د انتاني ناروغي (Infection disease) منځ ته راځي.


په ۳۲- جدول کې دعام ولس لپاره دځینو رادیو اکتیو موادو کلنی لورلېمیت ښودل شوی دی چې دنړیوال کمیسیون ICRP-61 په یوشپېتمه گڼه کې خپور شوی اودروغتیا په تړاو داند یښی وړ نه دي.

دتنفس له لاری کلنی لورلېمیت: (Annual Limits of Inspiration=ALI)

دخوراک له لارې کلنی لورلېمیت: (Annual Limit of Ingestion=ALI)

نوکلید Nuclide	دتنفس لور کلنی لېمېټ په واحد د بیکارېل (Bq)	د خوراک لور کلنی لېمېټ په واحد د بیکارېل (Bq)
سودیوم Sodium-22	1×10^7	7×10^6
ایوډین Iodine-131	1×10^6	8×10^5
پلوتونیم Plutonium-239	300	3×10^5
یورانیم Uranium-238	300	3×10^5
سېزیم Caesium-137	2×10^6	1×10^6

۳۲- جدول: دعام ولس لپاره دتنفس کولو او خوراک دلارې د رادیو اکتیو موادوکلنی لورلېمیت، چې دورانگو نه دځان ساتنې نړیوال کمیسیون ICRP-61 له خوا یې سپارښتنه شوې ده.





که د یو چا بدن ته رادیواکتیو مواد تنفس او یا خوراک څښاک له لاری ننوځي، نو دگاما وړانگو زیان د الفا او بیتا وړانگو په پرتله نسبتا کم دی. داځکه چې دگاما وړانگي د بدن څخه د باندې راو تلای شي اوداتومونو سره دومره ډیر غبرگون نه کوي.

که چیرته د یورانیم په وسلو کې د هستوي بټی دسولنګ فاضله او سوځیدل شوي مواد (Nuclear fuel)، دانرژي دلاس ته راوستلو څخه وروسته وکارول شي، نو دروغتیا په تړاو ډیر دا ندیننې وړ دي. دا ځکه چې په هستوي بټی کې د یورانیم دوه سوه اته دیرش څخه په مصنوعي توګه دیونویترن په جذب کولو سره دپلوتونیم رادیو اکتیوايزوتوپ جوړیږي. دپلوتونیم رادیو اکتیویټي د یورانیم اکتیویټي په پرتله دوه سوه زره واره لوړه ده. اویلوتونیم تر ټولو ډیر سخت کیمیاوي زهرجن عنصر دی.

دپلوتونیم الفا وړانگې P16 جین غیر فعال کوی


اوسنئ څیړني په ګوته کوي (77) چې که د پلوتونیم Pu-239 رادیواکتیو مواد تنفس شي نو د سږي سرطان منځ ته راځي (Lung adenocarcinoma). دا ځکه چې دنوموړي عنصر څخه د الفا وړانگې خپرېږي او د ډي این ای DNA یوه برخه پرې کوی اود موتیشن سبب (لامل) ګرځي (Deletion and point mutation). په ۲۰۰۴ م کال کې دغه څیړني د روسیې په سل ګونو مسلکي کارګرانوباندې تر سره شوي چې د یورال غرونو په سیمه کې د هستوي وسلو دجوړولو په دستگاه MAYAK کې د ۱۹۴۸ م کال څخه تر ۱۹۷۲ م کال پورې په کار بوخت وو. درې دیرش کاله وروسته دنوموړو کارګرو څخه ګڼ شمیر د سږي سرطان په ناروغۍ اخته شوه. کله چې دسرطان په ناروغۍ اخته مسلکي کارګرود سږو څخه د نسجونوموني د بیوپسي (Biopsy) په کړنلاره سره را وه ایستل شوي نودهیستولوژي پلټنو په ډاګه کړه چې د نهم کروموزوم په P16 جین کې، یو ځانګړی موتیشن تر سره شوی وو. دې خوا دا جوته ده چې د P16 جین دتومور دمخنیوي په موخه، یو ډیر اړین جین تشکیلوی (Tumor suppressor gene) او دوه ډوله پروتین جوړوی، لکه P16 او P14ARF. نوموړی پروتین د یوې حجرې د ویشتوب کړنلاره ترڅارنې او کنترول لاندې نیسي. نو که چیرته د P16 جین نیمګړی شي نویوه حجره (ژونکه) کولای شي، چې په خپل سر کې شمیره ډیرښت ومومي اوپه پایله کې د سرطان او یا نورو ناروغیو سبب (لامل) وګرځي. دسرطان په ناروغۍ اخته ټولو مسلکي کارګرو کې د P16 جین غیر فعال شوی وو، داځکه چې په نوموړي جین کې د پلوتونیم الفا وړانگو په واسطه داسي بیو کیمیاو تعامل تر سره شوی وو، چې په پایله کې دپروتین ها یډروجن اتومونه د یوه میتول ګروپ په تشکیلولو سره دخپل مرکب څخه بیل شوی وو. نوموړې کیمیاوي پروسه د میتولیشن (Methylation) په نامه سره یادېږي.

په ۸۱ الف شکل کې د P16 جین د میتولیشن ډیرښت کړنلاره د پلوتونیم الفا وړانگو انرژي ډوز په تابع سره ښودل شوې ده. د څیړنو نتيجي په ډاګه کړه، چې هغه مسلکي کارګران چې د هستوي وسلو په دستگاه کې یې کار کړی وو د هغو کنترول کارګرانو په پرتله چې په یوه داسي ډول دستگاه کې یې کار نه کولو لږ څه څلور ځله ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته دي.



۸۱ الف شکل: د نهم کروموزوم په p16 جين کې د ميتوليشن (Methylation) بيوکيمياوي تعامل دپلوتونيم الفا وړانگو انژي دوز په تابع سره سم سيخ ډيربنت مومي. دغه څيرنه دروسي يورال سيمي په هغو مسلکي کارگروتر سره شوې ده چې د هستوي وسلو په يوه دستگاه Mayak کې يې د ۱۹۴۸ څخه تر ۱۹۷۲ م کاله پورې په کار بوخت وو او ۱۹۶۶ څخه تر ۱۹۹۱ م کالونو په منځ کې يانې لږ څه ۱۸ کاله وروسته د سبري ادينوکارسينوم په ناروغۍ اخته شول. دغومسلکي کارگروته په منځنۍ توگه د ددوه پنځوس سانتي گري څخه تر يو سلودرې ډيرش سانتي گري وړانگې رسيدلې وې. د بيلگي په ډول دالفا وړانگو تر پينځه لس سانتي گري (1-15 cGy) پورې د ميتوليشن کړنلاره لږ څه يونيم حل واره د هغو کنترول کارگرو په پرتله چې وړانگې ورته نه وې رسيدلې (0 cGy) پورته ځي (77).


په ۸۲- شکل کې د يوه امريکايي ساينس پوه روبرت ډېل Robert Del Tredici دتجربوپايله بنودل شوې ده، چې په ځينو بيزوگانو او مورکانو باندې يې تر سره کړې دي. نوموړئ شکل دا په ډاگه کوي، چې ديوې بيزو په سبري کې دپلوتونيم دالفا وړانگې يوه ذره د اته څلوېښت ساعتو په موده کې په زرگونو حجرې تخریب کړې دي چې په پايله کې ديوه تورستوري او يا تور داغ په څير مالوم کيږي.



۸۲- شکل: نوموړئ شکل ديوې بيزو (Monky) دسبري دنسجونوتخریب کچه راښيي چې پينځه سوه واره ديوه ميکروسکوپ په مرسته غټ شوې او دالفا وړانگو د زيان په واسطه منځ ته راغلې دی.

(Robert Del Tredici, At Work in the Fields of the Bomb [1987], plate 39; photographed at Lawrence Radiation Laboratory, Berkeley, California, 9-20-82)

* **پوښتنه:** نن ورځ د جگړو په ډگر کې په پراخه کچه داسې وسلې کارول کيږي چې د يورانيم U-238 څخه جوړې دي. که فرض کړو چې په يوه نوموړي پيښه کې د چاپيريال يوه سيمه په راډيو اکتيو يورانيم ککړه شوې وي او اوسيدونکو ته دتنفس له لارې پنځوس بېکاريل 50 Bq اکتيويتي دسبروحجروته ورسېږي، نو په نسجونو کې دالفا وړانگې جذب شوې انرژي ډگرې Gy په واحد څومره اټکل کيږي؟



* **حل:** څرنگه چې د یورانیم U-238 څخه دخپرېدونکو الفا وړانګو انرژي لږ څه پینځه میگا الکترون ولټه قیمت لري ($E = 5 \text{ MeV}$) اونوموړې ټوله انرژي د لږڅه دیرشو مایکرومتره په واټن $30\mu\text{m}$ کې، چې د سبري د یوې حجرې د قطر سره برابره ده، دلاسه ورکوي نو دګرې دتعریف څخه په ګټې اخیستلو سره لرو چې: یو ګرې مساوي ده په سبرو کې جذب شوې انرژي E ضرب اکتیویټي A تقسیم په یو کیلو ګرام نسجونو .

$$D = \frac{E \times A}{M}$$

دنوموړې موخې لپاره په لومړي پړاو کې دسبري یوې حجرې کتله $\text{Mass} = M$ د هغې کثافت ρ ضرب د حجم Volume څخه تر لاسه کوو. داځکه چې کثافت ρ مساوي دي له حاصل تقسیم دکتلي اوحجم ($\rho = \text{mass/volume}$) نوپخپله کتله مساوي ده له حاصل ضرب د حجم او کثاف یا په بل عبارت $(M = \rho \times V)$.


څرنگه چې د سبري کثافت مساوي ده له صفر عشریه درې ګرام پرسانتی مترمکعب $\rho = 0,3 \text{ g/cm}^3$ نو کله چې دحجرې قطر $30\mu\text{m}$ په طاقت ددرې ونیسو نو د حجرې حجم لاس ته راځي $V = (30\mu\text{m})^3$.
 دتعریف سره سم د حجرې کتله مساوي ده له :

$$\text{کثافت ضرب حجم} = \text{کتله} = M = (\rho \times V)$$

$$\begin{aligned} (\rho \times V) &= M = 0,3 \text{ g/cm}^3 \times (30 \mu\text{m})^3 \\ 0,3 \text{ g/cm}^3 \times (30\mu\text{m}) \times (30\mu\text{m}) \times (30\mu\text{m}) &= 0,3 \text{ g/cm}^3 \times (30)^3 \times (10^{-4} \text{ cm})^3 \\ 0,3 \text{ g/cm}^3 \times (30)^3 \times (10^{-4} \text{ cm})^3 &= 8100 \text{ g/cm}^3 \times 10^{-12} \text{ cm}^3 = 8,1 \times 10^{-9} \text{ g} \end{aligned}$$

پورتني شمیرنه رابښي چې د سبري یوې حجرې کتله لږ څه اته نانو ګرام قیمت لري.

څرنگه چې یو بېکاریل داسې تعریف شوی، چې ګڼه په یوه ثانيه کې یوه هسته چوي، نو په دې اساس د یورانیم یو بېکاریل اکتیویټي په دې مانا چې په یوه ثانيه کې دالفا یوه ذره چې انرژي یې پینځه مېگا الکترون ولټه ده خپرېږي او دغه ټوله انرژي بیا په دیرشو مایکرومتره واټن نسجونو کې $30\mu\text{m}$ کې جذب کیږي . پنځو س بېکاریل په دې مانا چې په یوه ثانيه کې پنځوس هستې چوي او پنځوس الفا ذرې خپروي ($A = 50 \text{ Bq}$). داسانتیا لپاره لومړۍ پینځه مېگا الکترون ولټه انرژي دنړیوال واحدنوسیستم SI-Units په بنسټ دالکترون ولټه څخه په ژول اړوو.



$$1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{Joule}$$

$$5\text{MeV} = 5 \times 10^6 \text{ eV} = 5 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19} \text{J} = 8 \times 10^{-13} \text{J}$$

د سېري په ډيرشومايکرومتر نسجونو کې جذب شوي انرژي D مساوي ده له:

$$D = \frac{A \times E}{m} = \frac{50 \text{Bq} \times 5 \text{MeV}}{8,1 \times 10^{-9} \text{g}} = \frac{50 \times s^{-1} \times 8 \times 10^{-13} \text{J}}{8,1 \times 10^{-12} \text{kg}} = \frac{400 \times 10^{-13} \text{J}}{8,1 \times 10^{-12} \text{kg}} = 0,5 \times 10^{-11} \times 10^{12} \text{Gy/s}$$

$$D = 5 \text{Gy/s}$$

$$D = 5 \text{Gy/s}$$

*** ځواب:** د سېري په يوه حجره (ژونکه) او يوه ثانيه کې پينځه گړې او په يوه دقيقه کې درې سوه گړې جذب کېږي. دمقايسې لپاره د يادولو وړ ده چې که يوازې شل گړې په يوه وار ټول بدن ته ورسېږي نو څو ساعته وروسته د مرگ سبب (لامل) گرزي.


*** پوښتنه:** يو مسلکي کارگر د يوه کال په موده کې لږځه يونيم مليون بېکارېل $1,4 \times 10^6 \text{ Bq}$ راديو اکتیو سو ډيم Sodium-22 د خوراک او يوسلو شل بېکارېل 120 Bq پلوتونيم Plutonium 239- د چاپيريال څخه تنفس کړې دی. ددغه کارگر په بدن کې داغيزمن انرژي ډوز اندازه څومره ده؟

*** حل:** څرنگه چې د يوه کارگر لپاره د خوراک له لارې د سوډيم راديو اکتیو عنصر کلنۍ لورلېمېت $ALI = 7 \times 10^6$ اود تنفس له لارې د پلوتونيم راديو اکتیو عنصر کلنۍ لورلېمېت درې سوه بېکارېل 300 Bq ټاکل شوی دی نو لروچي:

$$\frac{1,4 \times 10^6 \text{ Bq}}{7 \times 10^6 \text{ Bq}} + \frac{120 \text{ Bq}}{300 \text{ Bq}} = 0,2 + 0,4 = 0,6$$

څرنگه چې د يوه کارگر د ټول بدن لپاره داغيزمن ډوز کلنۍ لورلېمېت د نړيوال کميسيون له خوا شل ملي سيورت 20 mSv ټاکل شوی، نو هغه ډوز چې د راديو اکتیو موادو د تنفس او خوراک له لارې مسلکي کارگر ته ور رسېږي، دنوموړي لېمېت يوازې لاندنۍ برخه تشکيلوي.

*** ځواب:** دولس ملي سيورت : $0,6 \times 20 \text{ mSv} = 12 \text{ mSv}$



*** پوښتنه:** دځمکې لاندې په طبیعي ډول سره ځینې رادیو اکتیو عنصرونه شته دي چې دطبیعي وړانگو یوه غټه سرچینه جوړوي. دغه رادیو اکتیو عنصرونه لکه یورانیم U-238، پوتانییم K-40 او رادیوم Ra-226 دالفا، بېتا او ګاما وړانګې خپروي او دېش لپاره دخطریو طبیعي منبع شمیرل کیږي. دروغتیا په تړاو تر ټولوخطرناک د رادون غاز Rn-222 دی، چې د رادیوم دتجزې په پایله کې آزادکيږي او دالفا وړانګې خپروي. نوموړی غازپه کورونوکې دننه راټولیږي او همدارنګه په ازاده هوا کې او د څښلو اوبوکې هم پیدا کیږي. درادون غاز اکتیویټي په یو مترمکعب کې دځمکې پرمخ او هر هیواد کې توپیر لري. د بېلګه په ډول په جرمني کې په منځنۍ توګه سره په یوه مترمکعب هواکې د رادون غاز اکتیویټي څلویښت بېکارېل ده ($A = 40 \text{ Bq/m}^3$). دورانګو نه دځان ساتنې نړیوال کمیسیون ICRP دریاضي موډلونوپه اساس یو ثابت اړوونکی ضریب $f = 11$ تر لاسه شوی چې د یوه کال ($\text{Annual} = a$) په موده کې د یو بېکارېل اکتیویټي او یو مترمکعب هواڅخه یوولس مایکروسیورت انرژي ډوز خپریږي. څرنگه چې دالفا وړانګو کوالیټي فکتور $Q = 20$ شل اټکل شوې دی، نو دڅلویښت بېکارېل اکتیویټي او دیوه کال په موده کې دتنفس دلاري د اوسېدونکو سږو ته په لاندې کچه انرژي D ډوز رسېږي.

$$D = A \times Q \times f = 40 \frac{\text{Bq}}{\text{m}^3} \times 20 \times 11 \frac{\mu\text{Sv}}{a \times \text{Bq} \times \text{m}^{-3}} = 8,8 \frac{\text{mSv}}{a}$$

*** ځواب:** دجرمني هېواد په ځینو کورونو کې لږڅه نهه ملي سیورت انرژي ډوز په یوه کال کې خلکو ته د رادون غاز دتنفس څخه سږو ته رسېږي.

دویم: دپوستکي او تماس له لارې (Contamination)


که چیرته بدن پوستکي د یورانیم وسلوپه رادیواکتیف ګرد ککړ شي اویاکومه ذره یې په پوستکي کې خښه پاتې شي، نوکیدای شي چې د طبیعي وړانګو په پرتله لس ځله زیاتي وړانګې په یوه ورځ کې پوستکي ته ورسېږي. په دغه ډول پېښه کې د پوستکي ناروغي احتمال ډیرزیات اټکل کیږي.

دیورانیم وسلو هغه سرګولی چې دځمکې پرمخ پرتې وي او کوچنیان ورسره لوبې کوي د پوستکي لپاره خورا زیات خطر لري. داځکه چې د یو ساعت څخه وروسته یې معادل ډوز د یوملي سیورت څخه تر دوه ملي سیورت پورې رسېږي.

هغه سرګولی چې په ځمکه کې خښې پرتې وي او چاودلې نه وي د هرچا لپاره تر ټولونه زیات دخطر سرچینه تشکیلوي او باید په فني ډول د مینځه یووړلې شي.

که چیرته د بدن پوستکي په داسې یوه رادیو اکتیو عنصر ککړ (Contamination) شي، چې دالفا وړانګې خپروي، نو دالفا وړانګې نه شي کولای چې د بدن د پوستکي څخه تیرې شي، خو د هغه پوستکي کوچنی برخي ته تر څو ګري Gray پور وړانګې رسېږي.

دیورانیم هغه سرګولی چې دځمکې پرمخ اویا د ځمکې لاندې خښې پاتې شوې وي، هیڅ کله په لاس کې وه نه نیول شي.



دېوي نورمال سرگولي چې چاودلې نه وي او ورسره تماس پيداشي نو په يوه ساعت کې دوه ملي سيورت انرژي (2 mSv per hour) د بدن پوستکي ته رسېږي. نوموړی قيمت دعام ولس ديوه کال لور ليمت څخه دوه ځله لوړ دی .

*** پوښتنه :** د يوې هستوي ازموينې په پايله کې چاپيريال ته د ايودين J-131 راديو اکتیو مواد هرې خواته شيندل کيږي. که چېرته د يوه اوسيدونکي د پوستکي يو سانتي متر مربع 1 cm^2 سطحه، دنوموړو موادو په يو مېگا بېکارېل اکتیويټي 1MBq ککړاوپه پوستکي کې ننوځي، اوکه په فني توگه دپوستکي څخه ليري نه شي او دنل لپاره هلته پټ پاتې شي، نو دانرژي ډوز به يې داوردې مودې لپاره څومره وي؟

د ايودين راديواکتيو عنصر بېټاورانگي خپروي چې فزيکي نيمايي وخت $T_{1/2}$ يې اته ورځې يانې يوسلو دوه نوي ساعته ($T_{1/2}=192 \text{ h}$) اټکل شوی دی. دنوموړي عنصر لپاره د اړوونکي ضريب h_a قيمت لږڅه $h_a = 1,2 \mu\text{Sv cm}^2 \text{ h}^{-1} \text{ Bq}^{-1}$ ټاکل شوی دی .

*** حل:** کله چې دانرژي ډوز قدرت dD/dt انتگرال د وخت ډيپل يا صفر نه تر لايتناهي پورې ونيسو، نو تر هغه مودې پورې چې نوموړی عنصر راديو اکتیوخاصيت ولري، انرژي ډوز D يې دلاندني فرمول څخه تر لاسه کيږي (23) .

$$D = \int_0^{\infty} \dot{D} dt = 1,44 \times T_{1/2} \times h_a \times \frac{A}{F} = 1,44 \times 192 \text{ h} \times 1,2 \frac{\mu \text{ Sv cm}^2}{\text{hBq}} \times \frac{10^6 \text{ Bq}}{1 \text{ cm}^2} = 332 \text{ Sv}$$


په پورتنۍ معادله کې h_a داکتيويتي A اوانرژي ډوز D تر منځ يو اړوونکی ضريب دی کله چې يو سانتي متر مربع سطحه $A = 1 \text{ cm}^2$ په يو بېکاريل Bq ککړه شوي وي.

*** ځواب:** د پام وړ خبره خو داده چې په نوموړي بېلگه کې دايودين راديو اکتیو عنصر بېټا وړانگې دتصور نه زيات يانې درې سوه دوه ديرش سيورت (332 Sv) انرژي ډوزد پوستکي په يو سانتي متر مربع کې خپروي.

درېم: د خوراک او څښاک له لارې (Ingestion)

هغه راديواکتيف مواد چې دخوراک او يا څښاک له لارې بدن ته ننوځي، د نوي په سل نه زيات ۹۰٪ د نس له لارې بيرته وځي، نو له دې کبله يې د زيان کچه ټيټه اټکل کيږي.

دخوراک او څښاک له لارې دورانگومعادل انرژي ډوز H په واحد دملي سيورت په ثانيه (mSv/s) دلاندنی معادلي څخه تر لاسه کيږي. په دغه معادله کې دخوراکي موادو اکتیويټي په واحد د بېکاريل پر کيلوگرام بايد مخکې اندازه شوي وي تر څو وکولای شو د معادل ډوزکچه مالومه کړو.



معادل دوز = دېوز ضريب (mSv/Bq) × دخوراکي موادو اکتیویټي (Bq/Kg)


$$H \text{ (mSv s}^{-1}\text{)} = \text{Dose factor (mSv Bq}^{-1}\text{)} \times \text{Activity of ingestion (Bq /Kg)}$$

دپلو تونیم Pu^{239} رادیو اکتیو ایزوتوپ په لوړه کچه په هډوکو کې جذب کیږي او د انجېسشن دوز ضریب یې مساوي دی له: $\text{Dose factor} = 2,2 \cdot 10^{-4} \text{ mSv/Bq}$

دتنفس له لارې		دپوستکي ککړ کیدل
دپوستکي له لارې		رادیو اکتیو مواد سږو ته ننوځي
بهرنې وړانګې لکه دالفا، بېتا، گاما اونیوترون وړانګې		د معدې او کلمو له لارې

۸۳- شکل: دچاپیریال څخه دیورانیم و سلورادیو اکتیو مواد دتنفس، خوراک او پوستکي له لارې بدن ته ننوتلای شي. نوموړې رادیو اکتیف گرد یا اېروزل (Aerosol) دالفا، بېتا او گاما خطر لرونکي وړانګې خپروي.

کله چې دچاپیریال څخه دتنفس، دخوراک، څښاک او یا دپوستکي دلارې رادیو اکتیو مواد دسږي بدن ته ورننوځي نود هغوي دبیوشیمي متابولیزم سره سم د بدن په مختلفو غړو کې وېشل کیږي چې په ۸۳ شکل کې ښودل شوي دي. تجربو ښودلې ده چې یورادیو اکتیو عنصر د یوه نه رادیو اکتیو عنصر څخه د متابولیزم په اړوند هېڅ توپیر نه لري. د بدن ځینې غړي شته چې ټاکلي عنصرونه په خپلو نسجونو کې دنورو عنصرونو په پرتله ډیر جذب کوي داځکه چې د خپلې دندې د سرته رسولو لپاره هماغومره ورته اړتیا لري. د بېلګه په ډول ایوډین J-129 او J-131 په تایراید کې، سټرونسیم Sr-90 رادیوم Ra-226 پلوتونیم Pu-239 په هډوکو کې او یورانیم U-233 او رادون Rn-222 په سږو کې په خورا لوړه کچه



جذب کيږي. نوموړي راديو اکتیو عنصرونه د هغوي د بیا لوژیکي او فزیکي نیم عمر سره سم د خوړوڅخه رانیولې ترډیرو کالونو پورې په بدن کې پاتې کیدای شي. نوموړي مواد په دغه ټوله موده کې راديو اکتیو وړانګې د بدن په نسجونو کې خپروي چې د سرطان ناروغۍ د منځ ته راتلو احتمال ور سره سم سیخ تړون لري. دا ځکه چې د سرطان ناروغۍ د منځ ته راتلو موده د شلو کالو څخه تر پنځوس کالو پورې وخت نیسي .

* **پوښتنه:** یو بزګر چې وزن یې لږ څه اويا کیلو ګرام 70 Kg دی د چاپیریال څخه دخوراک له لارې د بدن په هریوه کیلوګرام نسجونو کې د یورانیم عنصر U-238 سل بېکارېل مخصوصه اکتیویټي (100Bq/kg) جذب کړی دی. یورانیم چې یو راديو اکتیو عنصر دی د الفا هستوي وړانګې خپروي چې حرکي انرژي یې لږ څه پینځه میگا الکترون ولټه ده (5 MeV). نوموړی عنصر اويا په سل په هډ وکو او دیرش په سل په نسجونو کې جذب کيږي. نوموړی عنصر د بزګرتول بدن او یوه کیلو ګرام ته دوړانګو څومره انرژي ډوز د یوه کال په موده کې رسوي؟

* **حل:** دانرژي ډوز قدرت د تعریف سره سم د بدن په یوه کیلوګرام نسجونو او یوه ثانیه کې جذب شوې انرژي مساوي ده له (dD/dt) چې واحد یې ګري په ثانیه ده (Gy/s) .
په لومړي پړاو کې پینځه میگا الکترون ولټه انرژي په واحد د جول $J = \text{Joule}$ اړوو نو لرو چې.

$$1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J} \text{ او پینځه میگا الکترون ولټه لپاره لیکو چې:}$$

$$5 \text{ MeV} = 5 \times 10^6 \text{ eV} = 5 \times 10^6 \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ J} = 8 \times 10^{-13} \text{ J}$$


سل بیکارېل اکتیویټي دا مانا لري چې په هره یوه ثانیه کې دیورانیم سل هستی تجزیه کيږي او خپله ټوله انرژي یانې پینځه میگا الکترون ولټه په یوه کیلوګرام نسجونو کې جذب کيږي. نو په یوه کیلو ګرام نسجونو کې دانرژي ډوز قدرت مساوي دی له:

$$dD/dt = (100 \text{ Bq/Kg}) \times (8 \times 10^{-13} \text{ J}) = 8 \times 10^{-11} \text{ J/Kg s} = 8 \times 10^{-11} \text{ Gy/s}$$


څرنګه چې یو ګري یانې یو ژول جذب شوې انرژي په یوه کیلو ګرام ماده کې ($1\text{Gy} = 1\text{J/kg}$) ده او په یادولو چې (انرژي ډوز = ډوز قدرت ضرب وخت) او دبلي خواو منو چې یو کال د لږ څه دوه دیرش ملیونو ثانیو سره مساوي دی ($a = 3,2 \times 10^7 \text{ s}$) نو په یوه کال او یو کیلو ګرام نسجونو کې د انرژي ډوز کچه مساوي ده له:

$$D = 8 \times 10^{-11} \text{ Gy/s} \times 3,2 \times 10^7 \text{ s} = 2,56 \times 10^{-3} \text{ Gy}$$

$$D = 2,6 \text{ mili Gray}$$




*** ځواب:** د بزرگړو یو کیلو ګرام نسجونو ته په یوه کال کې لږ څه دوه نیم ملي ګري (2,5 mGy) انرژي ډوز او ټول بدن ته یې یو سلو پینځه اویا ملي ګري ($70 \times 2,5 = 175 \text{ mGy}$) انرژي ډوز رسېږي. دغه انرژي ډوز د طبیعي وړانګو په پرتله لږ څه پینځه اتا ځله لوړه ده.



۸۴- شکل: د بدن په غړو کې راديو اکتیو ایزوټوپونه یو شان نه بلکه په توپیر سره جذب کېږي. د بېلګه په ډول سټرونسیم Sr-90 او پلوتونیم Pu-239 په هډوکو او ایوډین J-131 په تایرایډ او یورانیم دوه سوه درې دیرش U-233 ، کریپتون پینځه اتیا Krypton-85 او رادون دوه سوه دوه ویشت Rn-222 په سږو کې په لوړه کچه جذب کېږي.


هغه راديو اکتیو مواد چې بدن ته ورننځي دهغوي معادل انرژي ډوز د تجربو په اساس نه شي ټاکل کېدای بلکه یواځې د ریاضي موډلونو په بنسټ تر لاسه کېدای شي. په دغه ډول موډلونو کې د راديو اکتیو موادو فزیکي خواص لکه دوړانګو انرژي، دوړانګو ډول، فزیکي نیمایي عمر او بیالوژیکي نیمایي عمر په پام کې نیول کېږي. د بدن په ننه کې د الفا او بېټا وړانګو خطر د ګاما وړانګو په پرتله ډیر زیات دی داځکه چې الفا او بېټا وړانګې په ډیر لږ واټن کې خپله ټوله انرژي په نسجونو کې دلاسه ورکوي او له دې کبله دهغوي ځایز انرژي ډوز هم ډیر لوړ قیمت لري.



په داسې حال کې چې د گاما وړانگې د یوې خوادنسجونو سره دالفا او بیتا وړانگو په پرتله دومره ډیر غبرگون نه کوي، او دېلي خوا د بدن د ننه څخه بهرته هم راو تللای شي. همدا لامل دی چې یواځې د گاما وړانگې د بدن څخه به هم په آسانی سره د یوه دېدیکتور Detector په مرسته سره اندازه کېدای شي.

د وړانگو دوز او اغیزې ترمنځ اړیکې (Dose-effect relation)

نوموړې اړیکې دا په گوته کوي چې که د وړانگو انرژي دوز کچه مخ په زیاتیدو شي، نو په پایله کې د ټول بدن او یا د بدن په هریوه غړکې د وړانگو بیالوژیکي، کلینیکي او فزیکي ناوړه اغیزې په څه ډول بدلون کوي. په ۸۵- شکل کې د وړانگو اندازه په وا حد د سیورت او غبرگون اړیکې د ستو خاصیتک Stochastic effects او نه ستو خاصیتک Deterministic effects اغیزو لپاره بنودل شوي دي.




۸۵- شکل: په عمودي محور کې د پیداشو سرطان ناروغیو شمیر او په افقي محور کې د ایونایز کوونکو وړانگو د انرژي دوز د ستو خاصیتک (کین اړخ منحنی) او نه ستو خاصیتک پاتولوژي اغیزې (بني اړخ منحنی) لپاره بنودل شوي دي (7).

۱- ستو خاصیتک اغیزې لکه: موتیش او د سرطان ناروغی

۲- نه ستو خاصیتک یا ټاکونکي رومبي اغیزې لکه:

نېکروزې (Necrosis)، د پوستکي التهاب او سوررنګ اخیستل (Erythema)، داوبستانو توپېدل، قی کول (لوستل)، د وینې په جوړښت کې بدلون اونور



د وړانگو ستوخاصتیک یا تصادفي اغيزي (Stochastic effects)


نوموړی زیان د وړانگو یوه نابابره او تصادفي (per chance) اغیزه گڼل کیږي چې اټکل یې یوازې د احصائیو (شمیرنو) په بنسټ ولاړدی. دا په دې مانا چې څوک وړاند وینه نه شي کولای چې گوندي دایونایزکونکو وړانگو په اساس به چا ته او کله زیان ورسیري او یا به وه نه رسیري. همدارنگه دنوموړي اغيزي د زړر یا ناروغۍ کچه د وړانگود انرژي پوزاندازي تابع نه ده، خو دزیان پېښیدلو احتمال او فریکونسي یې دانرژي پوز سره سم سیخ اړیکې لري. داپه دې مانا، چې د وړانگوستوخاصتیک زیان یوه احتمالي او تصادفي پېښه ده. څرنگه چې د وړانگو هغه کچه چې نوموړی زیان منځ ته راولي هم څر گند نه ده، نو له دې کبله د نوموړي اغيزي لپاره د پوز لیمیت یا سرحد کچه هم نه شي ټاکل کیدای.

د بېلگه په ډول ددې احتمال شته دی چې په ډیره ټیټه کچه انرژي پوز چې قیمت یې دصفر نه تر دوه سوه ملي سیورت پورې رسیري (0-200 mSv)، هم کولای شي، چې په راتلونکي وخت کې یوبیالوژیکي او پاتالوژیکي بدلون په نسجونو کې مېنځ ته راولي. د تیوري له مخې لکه د الفا وړانگو یوه ذره او یا یو فوتون هم کولای شي، چې په بدني حجرو Somatic cell او یا جنسي حجرو Genetic cell کې دومره بدلون یا موتېشن راولي، چې په پایله کې ډیر کاله وروسته په همغه نسل او یا په راتلونکو نسلونو کې دسرطان ناروغۍ سبب(لامل) وگرځي. خوتول کارپوهان په پوره باورسره ویلای شي، چې د وړانگو ستوخاصتیک اغيزي یوازې هغه وخت بې زړه گڼل کیدای شي، چې د وړانگو انرژي پوز صفر قیمت ولري، یانې یوچاته هیڅ وړانگي وه نه رسیري. د وړانگوستوخاصتیک زړرجني اغيزي لاندې خواص لري:

- په ډیره ټیټه کچه انرژي پوز (0-200 mSv) یانې د صفر نه تر دوه سوه ملي سیورت په لیمیت کې د وړانگو نوموړي زیان پېښیدلو احتمال ډیردی.
- د وړانگو انرژي پوز لپاره کوم ټاکلی لیمېت یا سرحد نه لري خو په دې اړیکه کې موتېشن منځ ته راوستلای شي او له دې کبله د بدن نیمگړی حجرې او یا د جین نیمگړی حجرې جوړیږي. په پایله کې د سرطان ناروغي په اوسني نسل او یا په راتلونکي نسل کې منځ ته راتلای شي
- د زیان پېښیدل یې یوه ناڅاپه او په تصادفي توگه منځ ته راځي او له دې کبله یې وړاند وینه نه شي کېد لای.
- د زیان درجه یې د وړانگودانرژي پوز تابع نه ده، خو دپېښیدلو احتمال او فریکونسي یې دانرژي پوز سره سم سیخ اړیکې لري

* **بېلگه:** د بدن حجرو ستوخاصتیک وروستی زړرلکه دویني سرطان (Leukaemie) چې دناروغۍ پېښیدلو لوړه کچه یې لږ څه اته کاله وروسته ده اود کانسر (cancer) نورې ناروغۍ لکه دسبري، د تایراید او دسیني سرطان اونور چې دپېښیدلو لوړه کچه یې لږ څه شل نه تر دیرش کاله وروسته منځ ته راځي.

* **بېلگه:** د جنېتیک ستوخاصتیک وروستی زړر چې دموتېشن په پایله کې ارثي ناروغي لکه دمعیوبو ماشومانو زیږیدل او یا نورې ناروغۍ منځ ته راځي.




دورانگونه ستوخاصتيک اغېزي (Non-stochastic effects)	دورانگوستوخاصتيک اغېزي (Stochastic effects)
د بدن نسجونو او غړو ته زیان رسېږي	د سرطان ناروغۍ لامل ګرځي
په ډیره کمه موده کې لکه ورځې یا اونۍ څخه وروسته منځ ته راځي	د پرمختګ او غټېدلو ګړنلاره یې یوه ټاکلۍ اوږده موده لري (Latent time) او ډیرکالونه وخت نیسي ترڅو پیژندل شي
دناروغۍ سختوالي او زیان کچه د انرژي ډوز سره سم سیخ زیاتېږي	د پېښېدلو احتمال یې د انرژي ډوز سره سم سیخ ډیرېږي
د دورانگو انرژي ډوز یو ټاکلۍ لېمیت لري. د وړانگو زیان هغه وخت را منځ ته کیږي چې دنوموړي لېمیت څخه واورې	دورانگو انرژي ډوز لپاره کوم لېمیت نه لري. دا په دې مانا چې په ډیره ټیټه کچه وړانګې هم کولای شي چې بدن ته زیان ورسوي.
هغه وخت منځ ته راځي چې دورانگو انرژي ډوز یو ټاکلۍ برید لکه یو سیورت څخه واورې	د پېښېدلو احتمال یې د صفر او دوه سوه ملي سیورت انرژي ډوز کې اټکل کیږي
دورانگو انرژي ډوز لېمیت د یوه ټاکلي قیمت څخه را ټیټول د نه ستوخاصتيک زړر مخ نیوي کوي	دورانگو انرژي ډوز قیمت را ټیټول یوازې د زړر یا تخریب احتمال امکانات کموي

۳۳- جدول: دورانگو ستو خاصتيک (Stochastic) او نه ستو خاصتيک یا ډېټر مینیسټیک (Deterministic) زیان توپیر ښودل شوی دی.

دورانگو ستوخاصتيک ناوړه زړر په لاندې ډول بیان کولای شو:

- د حجرې دې اېن اې DNA ته زیان رسېږي خو حجره (ژونکه) خپله دنده په بشپړ توګه سر ته رسولای شي.
- د لږ څه دوه سوه پنځوس ملي سیورت نه په ښکته اندازه ډوز کې منځ ته راځي (250 mSv).
- دوینې سرطان او د بدن د غړو سرطان سبب (لامل) ګرځي
- د انرژي ډوز لېمیت یې څرګند نه دی. دا په دې مانا چې په ډیره ټیټه کچه وړانګې او یا یوه نیمګړې حجره (ژونکه) هم د سرطان ناروغي سبب (لامل) کېدای شي
- هغه چاته چې وړانګې رسېدلې وي دهغوي څخه په احسا ئیوي توګه ځینې کسان ناروغ کیږي



تجربو بنودلې ده چې د بدن يوه غړي په کتله کې جذب شوې راديو اکتیو یتي (Activity = A) او د معادل انرژي ډوز D تر منځ لاندنۍ اړیکې اعتبار لري

$$D = F \times A \times \frac{T_{eff}}{T_{1/2}}$$

په پورتنۍ معادله کې د F توري ته دډوز فکتور ویل کیږي چې واحد یې یو مایکرو کیوري په یو کیلو ګرام (μCi/kg) نسجونو کې ټاکل شوی دی. په نوموړې معادله کې T_{eff} اغیزمن نیمایي وخت او $T_{1/2}$ فزیکي نیمایي وخت دی چې په خپل وارسره په ورځو d = day او کالونو y = year سره بنودل کیږي. د یو لړ مهمو راديو اکتیو موادولپاره د نړیوال کمیسیون (ICPRU-60) په څېړونه کې دډوز فکتور قیمتونه خپور شوي دي.


دوړانګونه ستوخاصتیک اغیزې (Non-stochastic effects)

دوړانګو نه ستوخاصتیک او یا په بل عبارت سره دوړانګو ټاکونکي Deterministic effects ناوړه اغیزې یوه احساسیوي پېښه نه ده، بلکه هغه وخت منځ ته راځي چې د انرژي ډوز قیمت دیوه ټاکلي لیمیت یا سرحد څخه واوړي، نو بیا ددې پړاوڅخه وروسته د پاتولوژي اغیزو په پایله کې د ناروغۍ د سختوالي کچه د انرژي ډوز سره سم سیخ پورته ځي. د بېلګه په ډول د پوستکي لپاره دغه کچه لږ څه شپږ ګري (6Gy) څرګنده شوې ده. دنوموړې اغیزې بېلګه عبارت دي له:


۱- د پوستکي سوروالی (Erythem)

۲- دسترګو د لید کمښت (Cataract).

په ۸۶- شکل کې د وړانګو ناوړه اغیزې د سترګو په کسي (Lens) باندې بنودل شوې دي.



۸۶- شکل: په پا سني شکل کې د یوې روغې سترګې کسي (Lense) د رڼا وړانګې داسې راغونډوي چې د سترګې په څټ پوستکي (Retina) په یوه ټکي باندې فوکس شي. په لاندنۍ شکل کې د کاتارکټ په ناروغۍ (Cataract) اخته شوې سترګه شودل شوې ده چې دیوې خوا درڼا وړانګې په سم ډول نه



شي را غونډولاي او دېلي خوا ځيني وړانگي گرد سره نه تيروي او هلته جذب کيږي (27). دسترگو کسي لپاره کلنۍ انرژي ډولور ليميت يو سلوپينخوس ملي سيورته ($150 \text{ mSv} = 0,15 \text{ Sv}$) ټاکل شوی دی. که چيرته د نوموړي بريد څخه دورانگو انرژي ډوز کچه اوږي نو د سترگو کاتاراکټ ناروغۍ احتمال ډير دی.


که چيرته په يوه وار د بدن لس سانتي متر مربع پوستکي ته تر شپږ گري څخه پورته نه بلکه بنکته انرژي ډوز ورسيري نو کومه کلينيکي ناوړه اغيزه نه څرگنديږي. خو کله چې د انرژي ډوز کچه شپږ گري سره مساوي او يا پورته شوه نو د پوستکي رنگ په لوموړي پړاوکې سور گرځي (Erythem) او که دنوموړي قيمت څخه ډير اوږي نو وروسته پوستکي سوځي او په پياوړ يا نکروز (Necrosis) باندې بدليږي. دورانگو نه ستوخاستيک ناوړه اغيزې په لاندې ډول لنډولاي شو:

- ▶ کله چې دانرژي ډوز په لږ وخت کې د يوه ټاکلي کچې څخه پورته شي د بېلگه په ډول لکه دوه سوه پنځوس ملي سيورت (250 mSv) نودورانگو ناروغي منځ ته راځي
- ▶ دناروغۍ سختوالي درجه د انرژي ډوز سره سم سيخ پورته ځي
- ▶ يوه تصادفي پيښه نه ده بلکه مخ ترمخه يې دزررکچه اټکل کولاي شو. د بېلگه په ډول که سلو تنوته يو سيورت وړانگي ورسيري نو پنځه تنه د سرطان په ناروغۍ مړه کيږي ($5\% \text{ per Sv}$) او په سلوکې د يوه تن $1\% \text{ per Sv}$ جنسي حجروو سخت ته تاوان رسيږي.

نښيز (Summary)

▶ په يوه حجره (ژونکه) کې دورانگو ناوړه بيا لوژيکي اغيزې په لاندې ډول دي



- * په کروموزومو کې د موتيشن منځ ته راوستل (chromosomal aberration)
- * د سرطان ناروغۍ را پارول (Induction)
- * په بدني حجرو کې د موتيشن راپارول (induction of somatic mutation)
- * د معيوبو ماشومانو کيدل
- * دحجري ځان وژني راپارول (induction of cell killing)
- * د بدن دفاع سيستم (Immune system) کمزوری کول
- * دورانگو ناروغيو منځ ته راوستل
- * نا ځايي اغيزې د لږ څه دوه سوه پنځوس ملي سيورت ($<250 \text{ mSv}$) نه بنکته پيښيږي
- * غير نا ځايي اغيزې يانې نه ستوخاستيک اغيزې لکه دورانگوناروغۍ په پوره با وړ سره هغه وخت منځ ته راځي کله چې د وړانگو کچه دوه سوه پنځوس ملي سيورت نه پورته شي. ($>250 \text{ mSv}$)



موتیشن (Mutation)

ترتولو ناوره اغیزه چې راتلونکي نسل ته یې هم دخطر احتمال شته دی هغه وخت پیښیږي کله چې دیورانایوم ایونایزکونکي وړانګې د بدن په حجرو ولګیږي اودهغوی په هسته کې د کروموزومو په جوړښت او شمیر کې بدلون را وړي. داسې ډول بدلون ته موتیشن ویل کیږي. په ۸۷- شکل کې د کروموزومو داسې هراړ خیز بدلون ښودل شوی دی.

دمرکز نه وتلی سرچپه کروموزوم	دمرکز نه وتلي حلقه	گرده حلقه او یوه ټوټه	لاندنۍ برخه یې پري ده	دیوه عادي کروموزوم شکل
ددو کروموزومو تر منځ متناظر بدلون	دوه مرکزه کروموزوم او یوه پري شوي برخه		دوه نورمال کروموزوم	


Intrachromosomale Änderungen	normal	terminale Deletion	interstitielle Deletion	zentrischer Ring und Fragment	azentrischer Ring	peri-zentrische Inversion
						
Interchromosomale Änderungen	normal		dizentrisches Chromosom und Fragment		symmetrischer Austausch	
						

۸۷- شکل: د موتیشن (Mutation) هر اړخیز ډولونه : د شکل پاسنۍ برخه دیوه کروموزوم په څنډ و او د شکل لاندنۍ برخه ددو کروموزومو په ننه کې بدلون رابښي (7).

سوماتیک او جنېټیک موتیشن (Somatic and genetic Mutation)

دایونایزکونکو وړانګوزیان په دوه ډوله ویشل کیږي چې یوې د سوماتیک زیان یا بدني زیان او بل یې د جنېټیک زیان په نامه سره یادېږي.

الف - سوماتیک موتیشن: هغه ډول زیان ته وايي، چې دورانګوناوړه اغیزې یې ژر او یا ورسته په هغه چا کې لیدل کیږي، چې وړانګې یې د بدن حجرو (Somatic cell) ته رسیدلي وي. په داسې حال کې چې دهغه راتلونکي نسل د کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. سوماتیکي زیان په دوه ډوله دی.



۱- سوماتیک ژر وړانی:

هغه زیان ته ویل کیږي چې ناوړه اغیزې یې ژړاو سمدلاسه لیدل کیږي. د بېلگه په ډول د دوسو ملي سیورت نه تر دری سوو ملي سیورته پورې (200-300 mSv) ایونایز کوونکې وړانګې د وینې په جوړښت کې سمدلاسه بدلون راولي. څومره چې د معادل ډوز اندازه زیاته وي، په هماغه کچه وړانې او زیان هم زیات وي. بشر ته دنوموړې وړانې کچه د بدن په رڼا شوې برخه او د یو چا په عمر پورې اړه لري. په ځوانانو او کوچنیانو کې دورانګو سوماتیک وړانې د لویانو په پرتله ډیردی. دورانګو ژرورانی دادي:

لکه استفراق، نس ناستی (اسهال)، سرګرزیدل او د وینې سپینو کرویاتو لکه د لمفوڅوتو (Lymphocytes) شمیر را ښکته کیدل اوداسې نور.

په ۸۸- شکل کې دورانګو ژر ناوړه اغیزې د سپینو کرویاتو موتیشن په کړنلاره سره ثابت کولای شو. نوموړو حجرو په کروموزومو کې د یوه مرکزي ځای دوه مرکزونه (Dicentric chromosom) لیدل کیږي چې درنا میکروسکوپ په مرسته سره په اسانۍ سره ازمویل کیدای شي.






Fig. 10: Dicentric chromosomal aberrations (full arrows) and acentric fragments in the metaphase of a lymphocyte (empty arrows), 52 h after irradiation in the G₀-phase with 3 Gy X-ray

۸۸- شکل: کله چې د میتا فاز Phase G₀ په پړاو کې سپینو کرویاتو ته درې ګري اکسریز 3 Gy ورکړل شي نود لومفوسیت (Lymphocyte) په کروموزومو کې د دوه مرکزونو موتیشن Dicentric chromosomal aberration منځ ته راځي (تور ویکتورونه) او ځینې کروموزومونه بیا په ټوټو بدلېږي acentric fragments (سپین ویکتورونه) (22).





۸۹- شکل: په پاس عکس کې دنورمال کروموزومو د مېټا فاز Metaphse جوړښت ښودل شوی چې هيڅ ډول موتیشن پکې نه لیدل کیږي. په لاندني عکس کې همدغو کروموزومو ته ډاکسیریزلرڅه دوه گري انرژي ورکړ شوي ده او پیژندل کیږي چې په یوه کروموزوم کې دوه پلازمینې موتیشن (Dicentric Mutation) پیداشوئ او د یوه بل کروموزوم څخه یوه برخه پرې شوې ده (Deletion). نوموړي موتیشن په اوږدو تور وېکټورونو باندې ښودل شويدي (22).

۲- سوماتیک وروستی ورانی: هغه زیان ته ویل کیږي چې ناوړه اغیزې یې څو کاله وروسته لیدل کیږي. سوماتیکي ورانی د ډیرې مودې یا نې کالونو څخه وروسته هم منځ ته را تلای شي. د بېلگه په ډول د اندامو شندوالی، د سترگو نور وړ کیدل، د پوستکي سور کیدل، د اوښتانو بایلل، د سږي فیبروز (fibrosis) په نسجونو کې د سورېو منځ ته راتلل، د نسجونو پرسیدل (Ulceration)، اوداسې نور په غیر سرطاني سوماتیکي زیان کې شمیرل کیږي.

ب - جنېټیک یا ارثي موتیشن:

هغه ډول زیان ته وايي چې دورانگونو ناوړه اغیزې د بدن جنسي حجرو ته رسېږي او له دې کبله دنوموړي موتیشن زیان هغه چاته چې وړانگې ورسیدلې وې دهغه په راتلونکو نسلو کې هم لیدل کېږي. دایونایزکونکو وړانگو نوموړي موتیشن ناوړه اغیزې ډیر داندینښني وړدي. داځکه چې دیوې ټولنې لپاره د خطر یوه لویه سرچینه ګرزیدلای شي. ارثي سوماتیک موتیشن دورانگو ستوخاستیک ناوړه اغیزو څخه شمیرل کیږي. دورانگو ستو خاستیک او نه ستوخاستیک موتیشن چې د هر چا د ژوند په اوږدو کې منځ ته راتلای شي تر ډیره موده پورې پټ پاتې وي او په تصادفي ډول دیوه روغ سږي په عادي کنټرول کولو کې رابرسیره او وپیژندل شي.


په ۹۰ شکل کې دورانگو جنټیک موتیشن ښودل شوی دی، چې د یوویشتم کروموزوم ترې زومی (Trisomie 21) ناروغي سبب (لامل) ګرزیدلای دی. په دغه ډول موتیشن کې، د بدن په ټولو حجرو کې یوویشتم کروموزوم **دیوې** جوړې په ځای درې واره پیدا کیږي.




۹۰- شکل: په پورتنی شکل کې دوه ویشته جوړه کروموزومونه د هغوي د غټوالي سره سم په پرلپسې عددونو (شمیره) لیکل شوي دي. دایونایزکونکو وړانګو جنېټیک موتیشن ددې سبب (لامل) ګرځي چې د بدن په حجرو کې یوویشتم کروموزوم ددو کروموزوموپه ځای درې ځله منځ ته راځي. دغه ډول ناروغي د تریزومي (Trisomie 21) په نامه سره یادېږي (27).

تجربو وښودله چې په کروموزومو کې د موتیشن شمیر، دورانګو انرژي ډوز سره تړاو لري. د بېلګه په ډول ددې این اې DNA غبرګ هیلکس دواړو مزو پرې کیدل د وړانګو ډوز سره سم سیخ او دنوموړي هیلکس یوه مزي پرې کیدل د انرژي ډوز د مربع سره متناسب دی.

په ۹۱- شکل کې د انرژي ډوز او په یوه حجره (ژونکه) کې د موتیشن شمیر ښودل شوي دي (23).




۹۱- شکل: دانسان دویني په لومفوسیت (Lymphocytes) کې دکوبالټ شپېته Co-60 کاما وړانګو غبرګون ښودل شوی دی. نوموړې وړانګې د کروموزومو په ډي این اې کې موتیشن منځ ته راولي. د ګراف په افقي محور کې دانرژي ډوز په واحد ګري Gy او عمودي محور کې د موتیشن شمیر شودل شوی دی (26).




ډبل انرژي ډوز (Dobbling dosis)

نوموړې هغه اندازه ډوز ته وايي چې په هماغه کچه او شمير سره موتېشن منځ ته راولي لکه څومره چې په طبيعي او ناڅاپه (spontaneous) توگه سره منځ ته راځي. دانسان لپاره دموتېشن ډبل ډوز قيمت صفر عشاريه شپږ گري (0,6 Gy) ټاکل شوی دی. دنوموړې اړېکې دواحد اندازه ته دموتېشن ډبل ډوز وايي چې د هر ژوند سوري لپاره ځانگړی قيمت لري.

د انسان لپاره د موتېشن ډبل انرژي ډوز (0,6 Gy) ددې سبب (لامل) گرځيدلای شي چې ناوړه اغيزه يې په راتلونکو نسلونوکې هم منځ ته راشي. د بېلگه په ډول سل ملي سيورت معادل انرژي ډوز په يو مليون نوو پيداشو مابنومانو کې شپږ په لس زرو کې جنېتيکي زيان ليدل کيږي (28).



په لومړي پړاو کې دځينو مخصوصو انزايمو په مرسته سره، کيدای شي چې د نوموړو حجرو دغه نيمگړتيا بېرته د منځه لاړه شي. که چيرته دغه حجرې دايونايږکو نکو وړانګود اغيزې بر سيره دنورو زهرجنو کيمياوي موادولکه:



✎ بنځول (Benzol)، دواگانو (Cytostatica)، دلمرماورای بنفش وړانګې، میکروبونو، سګرټ ځکولو، وایرسونو (Viruses) تر اغیزې لاندې راشي، نو کیدای شي چې د نوموړو ګڼو فکټورونو د حاصل ضرب په پایله کې دومره زرمې شي، چې دبیا جوړیدلو احتمال یې ډیر کم وي. نو په یوه داسې حالت کې د کروموزومو په دنده کې، دیونا څرګنده کود نمبر په فعال کیدوسره دغه ناروغه اویا نیمګړې حجره (ژونکه) دځان مرګي لاره ټاکي او په بیالوژیکي ډول ځان وژنه (Apoptosis) تر سره کوي.

✎ که چیرته د بدن یوه نیمګړې حجره (ژونکه) د ټاکلو انزایمو په مرسته سره یا داچې بیرته پوره جوړه نه شي او نیمګړې پاتې شي، اود ځان مرګي لاره هم غوره نه کړي، اود ددفاع سیستم له خوا د یوې بیکاره حجرې په صفت وه نه پیژندل شي، نو په پایله کې دسرطان په حجره (ژونکه) بدلېږي.


✎ دیوې سرطان حجرې او د یوې روغې عادي حجرې ترمنځ توپیر دادی، چې دسرطان ناروغه حجره (ژونکه) په خپل سر او بې شمیره پرلپسې ویشل (Mitosis) کيږي، چې په پایله کې یې حجم دومره غټ کيږي، چې دشاوخواپه اعصابو او رګونوباندې فشار راولي.

په داسې حال کې چې یوه روغه رمته حجره (ژونکه) وروسته له تقریبا ډیرشو ویشونو څخه ډیريږي او اضافه نه ویشل کيږي خو دسرطان ناروغۍ یوه حجره بې شمیره ډیريږي. تجربونودلې ده، چې دسرطان حجره (ژونکه) په لوړه کچه تیزابي مواد تولیدوي چې په پایله کې زیات ازاد کیمیاوي رادیکال منځ ته راځي. بل داچې د میکروسکوپ په مرسته سره دسرطان حجرې د کروموزومونیمګرتیا او موتیشن، لکه د دوه پلازمیني کروموزومود شمیرزیاتوالی او یا د کروموزومو دیوې برخې کمښت په ډیر ښکاره ډول تشخیص (پیژندل) کیدای شي. دسرطان ناروغۍ په پرمخ تللي پړاو کې دیوې خواناروغ ته درد پیدا کيږي او دبلې خوا دشاوخواغړي خپله دنده په سمه توګه سرته نه شي رسولای (6).

ډي این اي (DNA=Deoxyribonucleic acid) او دورانګو غبرګون

دانسان د بدن په هره یوه حجره (ژونکه) کې ښېر څلویښت کروموزومونه (chromosomes) پراته دي چې په هغوي کې د جنېټیک ټول مواد او ارثي مالومات خوندي پروت دي. دکروموزوموتر ټولو یوه مهمه برخه د ډي این اي. (DNA=Deoxyribonucleic acid) مالیکول جوړوي، چې د ډي اکسي ریبونوکلیوټېډ Deoxyribonucleotide تاوشوي غبرګ مزي (Double helix) څخه جوړدی او په ۹۲ شکل کې ښودل شوی دی. دنوموړي غبرګ تاوشوي مزي نوکلیوټید ددرېوبرخو یانې دنايتروجن باز (base)، دشکر یابوري اوفوسفات ګروپ څخه جوړدی. دنايتروجن باز عبارت دي له:

✎ ادېنین (A=Adenin) یا ګوانین (G=Guanin) یاسیتوزین (C=Cytosine) یا تیومین (T=Thymine) اویا اوراسیل (U=Uracil). د ډي این اي. غبرګ تاو شوی تار بازي لکه ادېنین، ګوانین، سیتوزین، تیومین او اوراسیل دهایدروجن مرکباتو په مرسته دیوه بل سره تړل شوي دي.



د انسان ډي اين اي (DNA) دوه متره اوږده او دوه نانومتره (د يوه متر يوه ميلياردمه برخه) پند دي. په ۲۰۰۱ م کال کې دانسان جنېټيک کود راوسپنېده، يانې رابرسيره شواو څرگنده شوه چې لږڅه ديرش ذره (30 000) جين لري.


د ايونايښکونکو وړانگو غبرگون د بدن حجرو سره هغه وخت ډير ناوړه پايله لري، کله چې دکروموزوموپه ډي اين اي. (DNA) باندې ولگيږي. دا ځکه چې د يوې حجري د ژوند ټول جنېټيک مالومات په ډي اين اي. ماليکول کې خوندي ساتل شوي دي.

په ۹۲ شکل کې د ډي اين اي. په بازو او دبوري په ماليکول باندې دهستوي او الکتروميغناطيسي وړانگوهر اړخيزې ناوړه اغيزې ښودل شوې دي.

لومړۍ: د ډي اين اي د يوه تاوشوي تار پری کيدلو شمير دورانگو دوز مربع سره متناسب دی.
دويم: د ډي اين اي دواړو تاوشوو تارونو پری کيدلو شمير دورانگو دوز سره سم سيخ متناسب دی.
درېم: هغه کيمياوي اړيکي چې هر ډول پروتين او د ډي اين اي. ماليکول غبرگ تارونه د يوه بل سره تړي، دمنځه وړل کيږي.

که چېرته د بدن يوې حجري ډي اين اي. ته دايونايښکونکو وړانگو يو گري ډوز 1Gy ورسپري، نوپه پايله کې لاندنۍ بدلون په يوه حجره کې منځ ته راځي:

- * د زرو څخه تر دوه زرو (1000- 2000) بازو مرکباتو کې بدلون
- * د پينځه سوو څخه تر زرو پورې (500 – 1000) د يوه تاوشوي مزي يا هېلکس پری کيدل تر سره کيږي. (Single strand break)
- * د لږڅه پنځوسو (50) غبرگ تاوشوو مزو يا هېلکس پری کيدل (Double strand break)




	د ډي اين اي. ديوه مزي پرې کول د ډي اين اي. بازو ته زيان رسول د ډي اين اي. بورې يا شکر ته زيان رسول د ډي اين اي. تاوشوي غبرگ تارونه پرې کول د ډي اين اي. اي بازو بایلل د ډي اين اي. غبرگ تاو شوو تارونو ته هر اړخيز زيان رسول

۹۲- شکل: په ډي اين اي. (DNA) باندې د ايوناييزکونکو وړانگو هر اړخيزه ناوړه اغيزې.
 ۱- د پروتين مرکباتو دمنځه وړل ۲- د بازو (Base) ازادول اونيمگرې کول، د غبرگ تاوشوي اويا د يوه تار يانې هېلکس helix پرې کول اونور (9)

نن ورځ په نړيواله کچه د ساينس پوهانوله خوا دوه ډوله موډلونه وړاندې شوي دي چې په ډي اين اي. (DNA) باندې د ايوناييزکونکو وړانگو هر اړخيزې ناوړه اغيزې په گوته کوي. په ۹۳ شکل کې دواړه موډلونه ښودل شوي دي.

➤ **لومړي موډل:** کله چې يوه ايوناييز کونکې ذره په ډي اين اي. (DNA) باندې ولگيږي، نود تيريډلو په ترڅ کې، يوه برخه انرژي د لاسه و رکوي، چې په پايله کې د ډي اين اي. (DNA) دواړه غبرگ تاو شوي مزي په يوه وار سره سمد لاسه پرې کوي (Double strand breaks). په نوموړي موډل کې د غبرگ پرې شوو ډي اين اي. (DNA) شمير N د وړانگو انرژي ډوز (αD) سره سم سيخ متناسب دی.

➤ **دويم موډل:** کله چې دوه ايوناييز کونکې ذرې چې د يوه او بل سره کوم تړاو نه لري، او په ځانگړي ډول سره په ډي اين اي. (DNA) باندې ولگيږي، نو کيدای شي چې په هر يوه هيلېکس (Helix) دومره انرژي انتقال کړي، چې په پايله کې غبرگ تاو شوي مزي پرې شي. په دغه موډل کې د غبرگ پرې شوو ډي اين اي. (DNA) شمير N د وړانگو انرژي ډوز د مربع (βD^2) سره سم سيخ متناسب دی.




په يوه حجره (ژونکه) کې د غبرگ پرې شوو ډي اين اي. (DNA) منځنۍ شمير N ، چې د وړانگو انرژي ډوز D د غبرگون په پايله کې منځ ته راځي، د لاندني معادلې څخه تر لاسه کولای شو.

$$N = \alpha D + \beta D^2$$

په پورتنۍ معادله کې دالفا α اوبېتا β توري د وړانگو په واسطه د حجرې په چاپيريال کې د کيمياوي رادیکالو او هلته د جذب شوي انرژي په څرنگوالي او ویشتوب پورې تړاو لري.


تجربو ښودلې ده چې که ايوناي زکونکي وړانگي د بدن روغي حجرې د ډي اين اي. (DNA) په ماليکولو باندې ولگيږي او دهغه دواړه غبرگ تاوشوي مزي (Double helix) پرې کړي نو په ډير احتمال سره د سرطان حجرې د منځ ته راتلو سبب (لامل) کېدای شي.



۹۳- شکل: په شي اړخ کې د الفا دوه ذرې او په کيڼ اړخ کې دالفا يوه ذره د کروموزوموپه ډي اين اي. (DNA) باندې لگيږي او دهغه غبرگ مزي (Double- Strand break) پرې کوي (73).

دالفا وړانگو ناوړه اغيزې دادي چې د ډي اين اي. غبرگ تاوشوي مزي پرې کوي، او له دې کبله يا داچې همغه حجره (ژونکه) دمنځه ځي، او يا داچې ژوندي پاتې کيږي او خپل ویشتوب ته پايښت ورکوي، خو نيمگړتيا يې د موتېشن په څيرنا سمه پاتې کيږي. که څه هم نوموړې حجرې دځينو مخصوصو انزايمو Enzyme له خوا په زياته کچه بيرته جوړيږي خو بيا هم هغه ځيني کم شمير، چې بيرته نا سمې پاتې کيږي په ډير احتمال سره په اوږده موده کې دسرطان په حجرو بدلېږي.


د بېلگه په توگه د څلورو ساعتونوپه موده کې د ډي اين اي. ددوه زرو پرې شوو هېلکس يوه مزي څخه يې، اوه نوي په سلوکې ۹۷٪ بيرته جوړيږي. اوسنيو څيړنو په ډاگه کړې ده چې داسې نيمگړي يا په بل عبارت موتېشن شوي حجرې چې دسرطان ناروغي ورنه پيدا کيږي يو علت دادی چې نوموړي



حجرې دويشتوب هغه نورمال اود پيدايښت په ترڅ کې ټاکل شوی جنېټيک کود پروگرام هيروي، او په خپل سرويشتوب يانې ميتوز پروسې ته دوام ورکوي. په عادي توگه په نورمال حجرو کې دويشتوب يا دميتوز پروسه د همغه غړي دکارکولو او اړتيا سره سم د يوه ټاکلي پروگرام او کنترول لاندې سرته رسيزي. دې خوا د بدن ددفاع سيستم هره يوه نيمگړې حجره (ژونکه) ددېنېن په بڼه پيژندلای شي نو له دې کبله يې د ټاکلوحجرو لکه ماکرو فاک (Macrophages) په مرسته سره له مېنځه وړي. که چيرته د کروموزومويو تار دورانگو په تشعشع يا ځليدو سره پرې شي نو په بدن کې ځينې ميکانيزم لکه بيرته جوړونکي انزايم اوټاکلي پروټين شته دي، چې د دې اين اي. ديوه مزي څخه مالومات کاپي کړي اوپه پرې شوي مزي يې وښلوي، او د يوه داسې جنېټيک ټکنالوژي په مرسته سره نوموړې نيمگړتيا بيرته له مېنځه يوسي. خوکله چې د کروموزومو دواړه مزي په هر سبب (لامل) که هم وي، يو ځل پرې شول، نو دبيرته پوره جوړيدلو احتمال يې ډير کم دی، او کيدای شي چې وروسته له ډيرو کالونو څخه دغه حجره (ژونکه) دسرطان په حجره (ژونکه) بدله شي. که فرض کړو چې دغه زرړي د موتيشن په بڼه سره د بدن جنسي حجروته ور سيري، نو دراتلونکي نسل د ماشومانو د بدن په هره يوه حجره (ژونکه) کې دغه نيمگړتيا منځ ته راتلای شي. دا په دی مانا چې که يو چاته هستوی وړانگې په ډيره ټيټه کچه هم رسيدلی وي، د بېلگه په ډول د څو ملي سيورت په شاوخوا کې، خو بيا يې هم دې احتمال شته دی چې اولادونه يې معيوب او ناروغه نړی ته راشي. دبېلگه په ډول دسترگونشتوالی، تريزومي يوويشت، په کپړۍ کې داوبوزياتوالی، داندامونوشتوالی اود وينې سرطان او نوری ناروغۍ. څيړنو وښودله چې د دې اين اي. ديو تار پرې کيدلوشميردمعادل انرژي اندازې په مربع او د غبرگ مزي پرې کيدل دمعادل انرژي اندازې سره سم سيخ تړاو لري.

د بدن په يوه رڼا شوي حجره (ژونکه) کې ديوگرې (1 Gy) زيان شمير او ډولونه	
5000 damages	دهرې يوې حجرې په دې ان اي (DNA) کې لږ څه پينځه زره هر اړخيز زيانونه منځ ته راځي.
4000 single strand breaks	ددې اين اي (DNA) څلوروزريوه مزي پرې کيدل
500 base damages	ددې اين اي (DNA) پينځه سوه بازو لکه گوانين، اډنين ... ته زيان رسيدل
40 Double strand break)	ددې اين اي (DNA) څلوېښتو غبرگو مزيو پرې کيدل
10^6 cell annihilation	د يو مليون حجرو د منځه تلل
150 proteins damage	ددې ان اي (DNA) په يوسلوپنځوس پروټينو کې بدلون

۳۴- جدول: په يوه حجره (ژونکه) کې د وړانگو يوگرې (1Gy) دزيان شمير او ډولونه ښودل شوي دي(7).



د حجرې پروگرام شوي ځان وژنه (Apoptosis)

د حجرې په ډي اين اي (DNA) کې ځينې پروگرام شوي جنېټيک کوډ ميکانيزم شته دي، چې دهغې په اساس يوه حجره (ژونکه) کولای شي خپل ځان پخپله مرکري. دغې کړنلارې ته، ځان مرگي يا اپوپتوز (Apoptosis) وايي، چې په ۹۴ شکل کې ښودل شوې ده. نوموړې کړنلاره د حجرې له خوا د خطر د ژغورلو او د نور زيان دمخ نيولوپه موخه يوه احتياطي لاره ده، ترڅو کولای شي يوازې دروغو (سالمو) حجروپه کارکولو سره يو غړی خپله دنده په سمه توگه سرته ورسوي.

➡ يوه حجره (ژونکه) دخپل ځان وژني (Apoptosis) په هکله هغه وخت پريکړه کوي کله چې دغه حجره (ژونکه) دايونايژکونکو وړانگو دزررپه پايله کې بيرته نه شي جوړيدلای او نيمگړې پاتې شي.


➡ يوه حجره (ژونکه) خپله دنده که علت يې هر څه هم وي په صحيح او سمه توگه سر ته نه شي تر سره کولای. د بېلگه په توگه کله چې يوه حجره (ژونکه) ډير عمر ولري او زړه شوې وي او کار نه شي کولای، نوپه داسې يو حالت کې يو پروگرام شوي ځان وژنه تر سره کوي.



۹۴- شکل: ديوې حجرې دځان وژني (Apoptosis) درې پړاونه اود تجزيې کړنلاره شودل شوې ده.


که چيرته دايونايژکونکو وړانگو دزررپه پايله کې، د بېلگه په ډول د سپينو کروياتو او يا د بدن يوه بل غړي ډير شمير حجرې دځان وژني په اساس د مينځه لاړې شي، او پرځای يې نورې نوې حجرې را پيدا نه شي، نو يوې خوا د بدن هغه غړی خپله دنده په سم او بشپړه توگه سرته نه شي رسولای، او د بلې خوا د سري د دفاع سيستم کمزوری کيږي او په پايله کې ددې امکانات هم زيات کيږي چې سري په هر راز ناروغېو اخته شي.

اپوپتوز يوناني لغت (ويي) دی او apo په مانا د ليري کيدل او پتوزيس ptosis غورځيدل مانا ورکوي. لکه چې دمنې په موسم کې د نوڅخه پانې راغورځي، په همدې مفهوم اپوپتوز مانا ورکوي.




د ډي اين اي. (DNA) نيمگړو برخو بيرته جوړول

په ۹۵ شکل کې بنودل شوي ده چې څرنگه د يوه ټاکلي انزايم (DNA-Polymerase) په مرسته سره د کروموزومو ډي. اين. اي. DNA غبرگ پرې شوي هليکس (Double strand break) او د بازو نيمگړتيا (Base damage) بيرته جوړيږي.



۹۵- شکل: الف-1a: د ډي. اين. اي. DNA بازو (Base damage) زيان منه برخه د يوه ټاکلي انزايم گلوکوسيلازي (Glycosylase) په مرسته سره را ايستل کيږي. د ډي. اين. اي. DNA څټ ته راوتلي برخه پرې کيږي او تېنه شوې برخه يې په پولي مېرازي انزايم (Polymerase) بشپړ ډک کيږي.

ب- 1b: د بازو Base زيانمنه او راوتلی اضافه کتله د اوليگونوکليوتوتيدو (Oligonucleotide) په گډون په ټول اوږدوالي کې ليري کيږي. د ډي اين اي DNA دمخامخ تاوشوي مزي يا نې ستراند Strand يو نوي ترکيب کاپي کول تر سره کيږي.



ج- 1c: د یوه غبرگ مزي دواړه پرې شوي برخې بیرته داسې سره تړل کيږي چې دیوه اخرنی څوکه د بلې اخرنې څوکې سره خوله په خوله یوځای شي.

د- 1d: د یوه غبرگ مزي دواړه پرې شوي برخې دیوه نه زیان من شوي او **هومولوگ یانې ورته مالیکول** په مرسته سره بیرته جوړیږي.

په نطفه (Embryo) کې دورانګوناوره اغیزې

په ماشومانو کې دورانګو ناوره اغیزې د لویانو (بالغو) په پرتله لږ څه دوه برابره زیاتې اټکل کيږي. دا ځکه چې په ماشومانو کې د حجرو ویش (Mitosis) کړنلاره لا هم پایښت لري. دورانګو زیان په تیره بیا هغو ماینومانو ته، چې دمور په نس کې وي، نور هم زیات دي، چې په لومړي وخت کې ورته دامبریو (Embryo) نطفه او بیا وروسته د فیتوس (Fetus) په نامه یادېږي. یو ماشوم چې لا د مور په نس کې وي دورانګوناوره اغیزې په دې پورې هم اړه لري، چې کوچنې د څوورځودې او هغه ته په کومه کچه انرژي پوز رسیدلې ده. په دې اړوند درې پړاونه د یادولو وړ دي.

👉 بلاستوګینېزېس (Blastogenesis):

نوموړې هغه وخت ته ویل کيږي، چې ماشوم د مور په نطفه (جنین) کې د زایګوت (Zygote) په څیر سترېږي او د **نهوورځو (0-9d)** عمر ولري. څرنگه چې په دې موده کې دورانګو خطر د امبریو لپاره خورازیات دی نو یا دا چې ماشوم ژوندی پاتې کيږي، او یا مړ کيږي. دا په دې مانا چې دورانګوپه واسطه د امبریو حجرې دومره زیانمنې شوي دي، چې ماشوم ترې مړ کيږي او یا دا چې دومره ډیر زړور ته نه دې رسیدلی او ماشوم ژوندی پاتې کيږي او یو نورمال هلک ورڅخه پیدا کيږي.


نوموړې قانون ته د شتون اویا نه شتون قانون ویل کيږي. هغه تجربې چې په مورګانو تر سره شوي دي، په ډاګه کوي، چې لږ څه پنځوس ملي سیورټ (0,05 Sv) وړانګې هم د مړینې سبب (لامل) ګرزیدلای شي. که په دې لسو ورځو کې امبریو ته د سل ملي سیورټ (100 mSv) نه پورته وړانګې ورسیږي، نو په پایله کې نطفه خپل ژوند دلاسه ورکوي.

👉 اورګانوګینېزېس (Organogenesis):

نوموړې هغه وخت دی چې د لسمې ورځې څخه پیل کيږي او تر دوه څلویښتمې ورځې پورې (10-42) رسیږي. په دغه موده کې د امبریو حجرې په توپیر لرونکو نسجونو بدلیږي چې په پایله کې ورڅخه غړي منځ ته راځي. په نوموړي وخت کې دورانګو خطر د امبریو لپاره دومره زیات نه دی، چې ګڼه ومري، خود بدن غړي یې نیمګړي پاتې کیدای شي.

👉 فېټوګینېزېس (Fetogenesis):

نوموړې هغه وخت دی چې د درې څلویښتمې ورځې څخه د فېټوس تر زیږیدنې ورځې پورې رسیږي. دورانګوناوره اغیزې د غرونیمګرتیا سبب (لامل) کیدای شي. لکه د ماغزو کوچنیتوب، سکېلیټ نیمګړتیا، دسترګو کوچنیوالی (Microphthalmus) اونور.



فیتوگېنېزيس (Fetogenesis)	اورگانوگېنېزيس (Organogenesis)	بلاستوگېنېزيس (Blastogenesis)
		


۹۶- شکل: په نوموړي شکل کې د ماشوم د ستریدلو درې پړاونه ښودل شوي دي، چې دورانګو په مقابل کې په توپیر سره حساسیت ښيي. په ۳۵ جدول کې د یوه ماشوم لپاره د وړانګود خطرکچه اټکل شوې ده، کله چې ماشوم لا د مور په نس کې وي. د پیدایښت څخه تر درې څلویښت ورځو پورې ورته امبریو (Embryo) یا نطفه او پاتې موده یا نې تر زیږیدلو پورې د فیتوس (Fetus) په نامه یادېږي.

دورانګو تیراتوګېن اغیزې (Teratogene effects)

دورانګوتیراتوګین اغیزې هغو ناوروکلینیکي اغیزو ته ویل کېږي چې د مور په نس کې، یانې لا نه زیږیدلي ماشوم ته رسېږي. نوموړې اغیزې عبارت دي له:

- * د ماشوم **مړینه** د زیږیدلو تر مخه (Prenatal) او یا د زیږیدلو څخه ورسته (Neonatal)
- * د بدن غړو نیمګړتیا (Malformation) خو په تیره بیا د عصبي سیستم زړرمن کیدل
- * د ماشوم د ستریدلو پروسه د نورمال ماشوم په پرتله په ټیټه درېزې او یا ډیره ورو پرمخ ځي، خو په غړو کې نیمګړتیا منځ ته نه راځي.
- * ماشوم نورمال غټ کېږي او کومه نیمګړتیا نه لري.



☠ **دمور په نس کې د یوه ماشوم (Emryo) جنسي حجرې د بالغو کسانو په پرتله دورانګوپه مقابل کې لس ځله ډیر حساسیت ښيي.** دورانګو نه د ساتنې نړیوال سازمان (ICRP) ټول دوه ځانومیندو ته، ددې سپارښتنه کوي، چې ډاکسریز عکس اخیستلو په موخه، په پام کې ولري، تر څو د حاملګۍ یانې (دوه ځانه) کیدلو په لومړیو لسو ورځو کې (Menstruation cycle)، دهغوی رحم (Uterus) ته په هیڅ کچه نوموړې وړانګې وه نه رسېږي. نوموړی قانون د لسو ورځو قانون په نامه سره نامتو شوی دی.



د ماشوم د غټیدلو موده	کلینیکي عیب لرونکي ډولونه	د ډوز پورتنی لېمېټ	د خطر ضریب
تر لسو ورځو پورې	مړینه	100 mSv سل ملي سیورت	0,1%/mSv
د لسو ورځو څخه تر اتو اونډو پورې	د سکېلېټ کوچنیوالی هایډروسېفالوس Hydrocephalus د سر کوچنیوالی Microcephaly کوچني سترګي Microphthalmus د سترګو نشتوالی Anophthalmus	100 mSv سل ملي سیورت	0,05%/mSv
د اتو څخه تر پینځه لسو اونډو پورې	لنډ اندامونه اولنډ سکېلېټ شنډ کیدل، د جسم توازن بایلل او دنورو غړو نیمګړتیا درې په سل د ذکاوت تناسب ټکو کمښت Intelligence quotient = IQ	300 mSv درې سوه ملي سیورت	0,04%/mSv
د شپاړسو څخه تر پینځه ویشټو اونډو پورې	د غاښونو، سترګو، د ښځینه تیواو د عصبي سیستم عیناکه کیدل یو په سل د ذکاوت تناسب کمښت Intelligence quotient = IQ	300 mSv درې سوه ملي سیورت	0,01 %
		لېمېټ نه لري	1% IQ/mSv

۳۵- جدول: په نطفه (Embryo) کې دورانګو ناوره اغیزې ښودل شوې دي.


په ۹۶-الف شکل کې دورانګو ناوره اغیزې د ماشوم د پیدایښت ورځې څخه د زیریدلو تر ورځې پورې ښودل شوې دي. دغه ناوره اغیزې په دې پورې اړه لري، چې د مور په نس کې ماشوم ته د حاملګۍ یانې میندواري کې په کومه موده او په څومره کچه وړانګې رسېدلي دي. د بېلګې په ډول که چیرته د پیدایښت په لومړیونو ورځو (Blastogenese) کې ماشوم ته یواځې څو ملي سیورته وړانګې ورسېږي نو دده د مړینې سبب (لامل) ګرځي. کله چې ماشوم ته د لسو ورځو څخه تر شپیتو ورځو په موده کې تر پنځوس ملي سیورته څخه پورته وړانګې ورسېږي نو دا چې ماشوم د زیریدلو څخه وروسته مړ کیږي (Neonatal) او یا دده په غړو کې نیمګړتیا منځ ته راځي.



۹۶- الف شکل: په ماشوم باندې دورانگو ناوړه اغيزې کثرت، لکه د ماشوم مړینه او یا د ماشوم دغرو نیمګړتیا دپیدایښت د ورځې څخه د ماشوم تر زیږیدلو ورځې پورې ښودل شوي دي (7).

پایله اولنډیز

- یوه حجره په میتوز او G2-Phase پړاو کې دایونایزکونکو وړانگو په مقابل کې ډیر حساسیت لري.
- یوه حجره د G1-Phase په پړاو کې دایونایزکونکو وړانگو په مقابل کې کم حساسیت لري
- یوه حجره د S-Phase په پړاو کې دایونایزکونکو وړانگو په مقابل کې تر ټولو لږ حساسیت لري دا په دې مانا چې مقاومت یې زیات دي.
- دنسجونو په رڼا کېدوسره په لومړي پړاو کې او په ګڼ شمیر حجرو کې ددی این ای DNA یو تار Single strand break پری کیږي خو د مخا مخ ورته دویم تار څخه د کاپی کولو په کړنلاره سره ډیر زیږیدل جوړیږي
- که د حجرو په رڼا کېدوسره ددی این ای DNA دواړه غبرګ تا رونه پری شي نو په پایله کې یا دا چې دغه حجره مري، او یا دا چې په کروموزومو کې موتیشن منځ ته راځي او وروسته له لږ څه پینځه نه تر دیرشو کالو پورې ډیر احتمال شته چې د سرطان په حجره واوړي. دا ځکه چې دنورمال حجري په پرتله بې شمیره اوبې کنټروله ډیرښت مومي
- په کروموزومو کې دموتیشن شمیر دورانگو دانژي دوز سره دخطیز مربع یوه تابع تشکیلوي
- دویني په لمفوسیت Lymphocytes کې ددوه مرکزونو موتیشن Dicentric mutation شمیر اټکل هغه بیالوژیکي تګلاره ده، چې ټول بدن ته دوررسیدلو وړانګوانژي دوز تر لاسه کیدای شي. په نوموړي کړنلاره کې سړی کولای شي چې تر پینځه ویشټ سانتی ګري ټیټه 25 cGy کچه وړانګو اغيزې وپېژندل شي اواندازه شي.
- څرنګه چې په رڼا شوو دي این ای DNA کې د بي ځایه شوو موتیشن ناسمي Translocation aberrations ډیر ثابت شکل لري، اوحجرو ته دومره زیان نه رسوي چې مري شي، نو له دې کبله تر ډیرو کالونو وروسته هم ددغي بیالوژیکي تګلارې په مرسته سره بدن ته دورانګوانژي دوز ټاکل کیدای شي.



پوښتنې (Questions):

۱-۱۱ په رادیوبیولوژي کې LD_{50} یو داسې لنډیز دی چې دورانګو انرژي دوز هغه اندازه رابښي چې:

الف: ټولې رڼا شوې حجرې مړې کوي - **ب:** نیمایي رڼا شوې حجرې مړې کوي

ج: نیمایي رڼا شوې حجرې په پینځو سو ورځو کې مړې کوي

د: پینځوسمه برخه رڼا شوې حجرې مړې کوي

۲-۱۱ دیوې حجرې ویشلوب په کرڼلاره کې (Cell cycle) لکه G_0 ; G_1 ; S ; G_2 ; Mitosis کوم یو

پړاو دورانګو پمقابل کې تر ټولونورو ډیر حساسیت څرګندوی؟

۳-۱۱ د بدن کوم یو ه غړی حجرې لکه (دهیوکوماغزو حجرې، لومفاید نسجونو حجرې،

د اعصابو حجرې، د پوستکي حجرې، سپرما تید حجرې) دورانګو پمقابل کې تر ټولو ډیر حساسیت

ښيي؟

۴-۱۱ که چېرته د یوچاتول بدن په یو ګري $1Gy$ وړانګو رڼا شي نو ددې خطرڅومره دي چې

د دهوکوپه ماغزو کې به د سرطان ناروغي راپارول شي اود وړانګو دغه ناوړه اغیزه څه

نومیري؟

الف: ستو خاستیک یا نی تصادفي پیښه - **ب:** نه ستو خاستیک پیښه

ج: ترافیکي پیښه - **د:** هستوي پیښه

۵-۱۱ د سترګو د کاتاراکټ ناروغي هغه مهال منځ ته راځي چې دورانګو انرژي دوز کچه د

لاندې لیمیت څخه پورته شي .

الف: شپږ سیورت - **ب:** لس سیورت - **ج:** پینځلس سیورت - **د:** یو سلوپینځوس ملی

سیورت

۶-۱۱ د عام ولس لپاره کلني لور انرژي دوز لیمیت د نړیوال کمیسیون ICRP له خوا څومره ټاکل

شوئ دی؟

الف: یو ملی سیورت - **ب:** لس ملی سیورت - **ج:** سل ملی سیورت - **د:** یو سیورت

۷-۱۱ که یوه ځانګړې حجره (ژونکه) په یو ګري رڼا شي نو څه ډول زیانونه او په څومره شمیرد دي

این اي


DNA دواړه تارونه او یو تار پرې کولای شي؟

۸-۱۱ دورانګو تصادفي Stochastic ناوړه اغیزې کومې دي؟

۹-۱۱ دورانګو ټاکونکي Deterministic ناوړه اغیزې کومې دي؟

۱۰-۱۱ که یو ماشوم دمور په نس کې وي او د سل ملی سیورته څخه پورته وړانګې ورته ورسیري نو

کوم ډول ناروغي او یا معیوب غړي منځ ته راتلای شي



دوولسم څپرکی

دورانگو ناروغی سپندروم (Radiation sickness syndrome)


دورانگو ناروغي ټولو هغو ناروغيو ته ويل كيږي، چې د ايونايزکونکو وړانگو په واسطه هغوخلکو ته، چې وړانگې ورسيدلي وي پيدا كيږي. د بېلگه په ډول کله چې د يوچا ټول بدن ته ددوه گري نه پورته وړانگې ورسيري، نو لومړي نېني (علامې) يې لکه خواه بديدل، قی کول، نس ناسته، کمزورتيا او نور پيل كيږي.

دورانگود زيان په تراوتاريخي پيښوته لنډه کتنه:

کله چې په ۱۸۹۵ م کال کې ډاکسريز (X-Rays) رابر سپره (کشف) شوي نويو کال وروسته دنوموړو وړانگو زيان دروغتيا په تراوڅرگند شو. په ۱۸۹۶ م کال کې درونتگن د ستگاه د پلورلوپه موخه د بريښنا يو امريکايي انجینر اليو تامسن Elihu Thomson خپله دنده پيل کړه، چې په همدې اړوند د نوموړي انجینر لاس د اکسريز X-ray injury د رڼا کولوپه اساس ټپي او وسوځيده.

په ۱۸۹۶ م کال کې کله چې د بريښنا په څانگه کې يو وتلي امريکايي مخترع انجینرتوماس الوا اديسن (Thomas Alva Edison) د فلوريسنس اکسريز څراغ fluorescent X-ray lamp په جوړولو او څيړنو بوخت وو، نو دهغه د فابريکې ډير کارکوونکي ناروغ شول. د بېلگه په ډول د اديسن يو مرستيال کلارينس ډالي Clarence Dally د اکسريز ناوړه اغيزو څخه دومره زرمين شو، چې د سراوښتان يې دلase ورکړه، اودلا سونو پوستکي يې دومره ټپي شوه، چې د اولسر ناروغی (ulcer) له کبله ژورسوري او پياوار (Necrose) پکې منځ ته راغی. په ۱۹۰۴ م کال کې د اديسن نوموړی مرستيال د سرطان په ناروغی مړ شو.

په ۹۷ شکل کې د ايونايزکونکو وړانگوناوره اغيزې ښودل شوي دي، چې د يوه مسلکي کارگرچپ لاس ته دايريديم Iridium-192 راډيو اکتیو ايزوټوپ سره دخو دقيقو تماس په پايله، او د شلو ورځو څخه وروسته ليدل كيږي. دلاس اورغوی برخه (Palm) لږ څه لس ځايه ټټاکي لري اوسورنگه سو ځيدلی دی (Erythema).




۹۷- شکل: دراديواکتيو ايزوتوپ ايريديم Iridium-192 وړانگو د يوه مسلکي کارگر لاس ورغوی (Palm) سوځولی او تناکي (Blister) يې منځ ته راوړې دي(40) .

تجربو وښودله چې که د ښپږ گري 6 Gy په اندازه وړانگې په يووارسره د ځان په پوستکي ولگيري، نو زرر يې دومره زيات دی، چې ديوې ورځې څخه وروسته يې کلينيکي نښې څرگنديږي، او دپوستکي رنگ سورکړي. څلورورځې وروسته دپوستکي ددرميس (Dermis) په پټ کې رگونه دومره زيان مومي چې هلته دميتوزکړنلاره په ټپه دريږي اوپه دې اساس دپوستکي پاسنۍ برخه په نوو حجرونه عوض کيږي (Reproduction). بر سیره پردې دوينو جريان دالتهاب له کبله هلته گرند ئ کيږي او په پايله کې هلته ډيره وینه راغونديږي، چې د پوستکي رنگ سور گرځوي. دغه ډول پيښه د ايروتم (Erythem) په نوم ياديږي.

د بدن په پوستکي باندې د وړانگو کلينيکي زيان لکه د پوستکي سورکيدل، سوځيدل، پرسيدل، شين رنگه نونيول (Pus) اوالتهاب، يوه ډيره اړينه او پخوانۍ بيالوژيکي ډوزيمتري کړنلاره تشکيلوي چې تر نن ورځ پورې دنوموړو وړانگو دخطر وړاند وینه اوناروغيو پيژندلوپه اړوند د نورو تگلارو، لکه کيمياوي ډوزيمتري او فزيکي ډوزيمتري په څنگ کې ورڅخه گټه پورته کيږي.

په ۳۶ جدول کې د بدن يوې برخې، لکه د يوه لاس هراړ خيز کلينيکي زيان پرمختگ د وخت په تابع سره ښودل شوی دی، کله چې لاس ته په يوه وار سره د ديرش گري (30 Gy) څخه پورته اکسريز وړانگې ور سيږي.




دورانگو کلینیکي زیان پر مختگ	وخت
د لاس پوستکي التهاب اوسور کیدل	د څلیر ویشتنو ساعتونو څخه وروسته
د پوستکي پرسوب او دنسجونو تر منځ اوبو غونډیدل	څو ورځې وروسته
التهاب او نو نیول (Pus)	دوه اونۍ وروسته
د پوستکي پر سوب نور هم غټیږي او بیا د پوستکي لومړۍ پټ له منځه ځي	دری اونۍ وروسته
د پوستکي یو بل لاندني پټ زیان پیل کیږي	لس اونۍ وروسته
د پوستکي ټول اپیتیل Epithel پرسیري او د سرطان په ناروغۍ اوږي	څلیروینست اونۍ وروسته
د لاس پرې کول Amputation	د دولسو میاشتو نه وروسته

په ۳۶- جدول : د بدن یوې برخې لکه د یوه لاس کلینیکي زیان پرمختگ د وخت په تابع سره بنودل شوی دی، کله چې په یوه وار سره لږ څه دیرش گری 30 Gy اکسریزورته ورسیري (23)

دورانگو ناروغي هغه وخت نړۍ ته په رښتیا سره په ثبوت ورسیدله، کله چې په ۱۹۴۵ م کال کې دجاپان هیروشیما (Hiroshima) او ناگازاکی (Nagasaki) شارونوباندې داتوم دوه بمونه واچول شول، او بیا وروسته په زرگونوخلک دورانگو دناوړه اغیزو له کبله ناروغ او ځیني مړه شول. په ۱۹۴۵ م کال داگست میاشت په شپږمه نیټه، لومړئ اتوم بم، چې دچاودنې انرژي یې لږ څه پینځه لس کیلو ټنه تي این ټي (15kt TNT) دهیروشیما او دوهم اتوم بم په نهم داگست ۱۹۴۵ م کال، چې دچاودنې انرژي یې لږ څه یووینست کیلو ټنه تي این ټي (21 kt TNT) وه دناگازاکی په ښار باندې وغورځیدل.


تر ۱۹۹۰ م کال پورې د هیروشیما درې سوه پنځوس زرو او سیدونکوڅخه، یو سلوشل ذره او سیدونکې مړه شوه. دهغوي څخه لږ څه اته زره او سیدونکي د سرطان ناروغۍ له کبله خپل ژوند دلاسه ورکړ (8). نوموړې هستوي چاودنه دځمکې دپاسه په اتموسفیرکې تر سره شوه اوچاپیریال یې په رادیو اکتیوموادو، لکه سیزسم Cs-137، شټرونسیم Sr-90، څیرکونیم Zr-95، اوتریسیم Tritium ککړکړ. یو داسې رادیو اکتیوگرډ یا رادیواکتیو اوریځ، چې رادیو اکتیومواد ولري، د فال اوت Fall out په نامه سره یادېږي. تر نن ورځ پورې لږ څه څلور سوه شل دځمکې دپاسه اویوزردځمکې لاندې هستوي ازمویني تر سره شوي دي. د ۱۹۴۵ کال څخه راپدې خو تر نن ورځ پورې دنړۍ هریوه وگړي ته دنوموړوازموینوپه پایله کې، څلور ملي سیورت وړانگې رسیدلي دي. داسې اټکل کیږي، چې د نیټي کچې وړانگونواړه اغیزو له کبله، کوم چې دهستوي ازموینو، هستوي بټۍ او هستوي وسلو د استعمال سره تړاو لري د سرطان ناروغیو شمیرپه ټوله نړۍ کې لږ څه لس په سلوکې ډیر شوی دی. همدا سبب وه چې د ۱۹۸۰ م کال څخه راپدې خوا، دنړۍ هغو هیوادونو، چې هستوي قدرت لري، په دې پریکړه وکړه، چې نور به دځمکې دپاسه هستوي ازمویني نه تر سره کوي.



۹۸- شکل: په ۱۹۴۵ م کال د اگست میاشتې په شپږمه نیټه دنړې په تاریخ کې لومړۍ اتوم بم د چاودنې په ترڅ کې ښودل شوی دی، چې د جاپان هیروشيما (Hiroshima) په ښار باندې د امریکا واکمنو له خوا واچول شو، او د کوچني هلک (Little Boy) نوم په ایښی وه. دنوموړي اتوم بم څخه یو رادیو اکتیو گرد دځمکې اتموسفیر ته پورته شو او رادیو اکتیوتوتې یې بیا بیرته دځمکې پرمخ راولویدې، چې په پایله کې دنږدې ټول چاپیریال په رادیو اکتیو موادو ګرځېدو (۲۹).

داتوم بم دچاودنې ټوله انرژي چاپیریال ته په لاندنیو فزیکي تګلارو سره خپره شوه:

- * **لومړۍ:** پنځوس په سلو کې د فشار څپو (Blast 50 %)
- * **دویم:** پینځه دیرش په سلو کې د تودوخې په څیر (Heat 35%)
- * **دریم:** پینځه لس په سلو کې د رادیو اکتیو موادو او دایونایزکونکو وړانګو لکه ګاما، الفا، بېټا او نیوترون ذرو په څیر (Radiation 15%)
- * **د لومړي اتوم بم د چاودنې انرژي پینځه لس ذره ټنه تي ان تي (15 kt TNT) او دویم اتوم بم دچاودنې انرژي لږڅه دوه ویشت ټنه تي ان تي (22 kt TNT) اټکل کیږي. یو ټن یانې یو زر کیلوګرام تي ان تي د لږ څه څلور ګیکا ژول سره یو شان دی. نو د لومړي اتوم بم انرژي د یو ګرام کتلې څخه تر لاسه شوه**
- * **دپلازمینې منځنۍ برخې (Isocenter) څخه په پینځه سوه متره واټن کې پینځه دیرش ګري ګاما وړانګې (35 Gy) اوشپږګري نیوترون وړانګې (6 Gy) اندازه شوې دي. د پلازمینې څخه دوه کیلومتره لیرې شاوخوا او سیدونکوته لږ څه سل ملي ګري (0,1Gy) وړانګې ورسیدلې.**



راديو اکتیو ککرتیا (Radioactive contamination)

راديو اکتیو ککرتیا هغه وخت منځ ته راځي کله چې راديو اکتیو مواد، دهستوي بټۍ چاودنې په پېښه کې، داتوم بم چاودنې، دطبي آلاتو چاودنې او هستوي ازموینو په پایله کې چاپیریال ته خپور شي. نوموړي مواد بیا د خلکو په بدن او یاد چاپیریال په یوه شي، لکه خوراکي شیان، نباتات، حیوانات، ځمکه، تعمیرونه، اوبه، هوا او نورو ته ورننځي او یا ورباندې نښلي. هغه څوک چې د بدن سطحه او یا کالي یې، په راديو اکتیو موادو ککړ وي، کولای شي چې نور خلک او شیان هم د تماس له لارې ککړ کړي. که دچا بدن ته دننه راديو اکتیو مواد ورننوتلي وي، نو پخپله دغه سړی دیوې راديو اکتیو سرچینې په ډول وړانګې خپروي، اونور و خلکو ته زیان رسوي.

دراديو اکتیو ککرتیا لیرې کول (Radioactive decontamination)

که چیرته د چاپیریال شیان لکه هوا، اوبه، ځمکه، نباتات، ځنگلونه، خوراکي شیان او یا هغه څوک چې بدن او یا کالي یې په راديو اکتیو موادو ککړ شوي وي، نودنوموړو موادو، پاکولو، کمولو او یا بیخي لیرې کولو کړنلارې ته دیکونټامینیشن ویل کیږي. د هوا او اوبو ککرتیا د ټاکلو فیلټرونو او د غاز ماسکو Mask په مرسته سره کمولای او یا یې مخنیوی کولای شو. څرنگه چې وړانګې په سترګونه لیدل کیږي، او نه یې بوی ځي، اونه په لاس حس کیږي، نو په هغه سیمه کې چې یوه هستوي ازموینه ترسره شوي وي، خلک دورانګو د خطر څخه بې خبره پاتې کیږي، اوراديو اکتیو موادنه شي پیژندلای. دراديو اکتیو ککرتیا دمخنیوي او یا د پاکولو لپاره لاندنۍ کړنلاره ترسره شي.

که لومړۍ: د ککړ شوي سیمې څخه سمدلاسه ووځه او په یوه نږدې تعمیر کې ځان خوندي کړه

که دویم: د ځان څخه ککړ شوي کالي وباسه او په یوه پلاستيکي کڅوړه کې یې پټ کړه او بیا یې د ځان څخه په لیرې واټن کې کشیرده تر څو تاته وړانګې در وه نه رسیږي.

که دریم: د بدن هغه برخې چې په راديو اکتیو موادو ککړې وي، د تمبو اوبو او صابون په مرسته سره ومینځل شي او ډیر پام وشي چې د بدن پاتې اوباکې برخې ککړې نه شي.


که څلورم: که چیرته راديو اکتیو مواد تنفس شوي وي او یا د خوراک او څښاک د لارې بدن ته ورننوتلي وي نود ټاکلو طبي آلاتو لکه ټول بدن کونټر (Total body counter) په مرسته سره باید اندازه شي.

که پینځم: دراديو اکتیو موادو لیرې کولو کړنلاره تر هغه وخته پورې پرمخ ولاړه شي تر څو د بدن په یوه سانتي متر مربع سطحه کې د ککرتیا کچه دلس بیکاریل 10 Bq/cm^2 څخه راټیټه شي.

دګاونډ یو هیوادونو هستوي ازموینې



دهستوي ازموینو لړۍ د ۱۹۴۵ م کال څخه راپدې خوا تر نن ورځې پورې دنړۍ ځینو هیوادونو لکه امریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه او چین له خوا همداسې روانه ده. دنوموړو پېښو هیوادو په څنګ کې، دوه نور هیوادونه هم دهستوي ځواکونو په ډول ډګر ته راووتل. دبیلګې په ډول دافغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو یانې هندوستان او پاکستان پرلپسې هستوي ازموینې او سیالۍ دیادولو وړ دي.



د هندوستان هستوي ازمويښي:

په ۱۹۷۴ م کال دمای میاشتي په اتلسمه نیټه هندوستان خپله لومړۍ امپلوزیون ډوله (Implosion design) پلوتونیم هستوي ازمويښه دبودادزیریدني په ورځ ترسره شوه. دهند واکدارانو دغه ازمويښه د دیوي پلمي په توگه، دسولي په موخه او د **خندا کوونکي بودا** „Smiling Buddha“ په نامه سره **وونوموله**. دنوموړې هستوي چاودنې قدرت لږ څه پینځه لس کیلوټن ټي این ټي 15 kilotons TNT اټکل کيږي او د راجستان ولایت په یوه دښته اودځمکې لاندې په یوه سل کیلو متره ژورڅاه (Shaft) کې تر سره شوه. دغه سوري دریگ په مرسته تر خوله پورې ډک شو او بیا دسمتو (Cement) په اچولوسره کلک بندشو(91).



په ۱۹۹۸ م کال کې دپاکستان لومړنۍ هستوي ازمويښه دبلوچستان چاغای په سیمه د راز غره Ras koh په ننه یوه سورنگ کې ترسره شوه چې رادیو اکتیو گرد یې په پورتنۍ شکل کې په سپین رنگ سره لیدل کيږي.





Figure 2.103. The rubble chimney formed after collapse of the cavity in a deep underground nuclear detonation.


په ۱۹۷۴ م کال کې د هندوستان لومړنۍ هستوي ازمويښه د راجستان په سیمه اودځمکې لاندې تر سره شوه چې دځمکې مخ ته یې هم رادیو اکتیو مواد راووتل او یو غټ څوکیلومتره سوري منځ ته راغی.

د پاکستان هستوي ازمويښي:


په ۱۹۹۸ م کال دمای میاشتي په اته ویشتمه نیټه، پاکستان په دې بریالۍ شو چې پرلپسې پینځه هستوي ازمويښي دبلوچستان چاغای ولایت (Chagai) دکامباران غره (Koh kambaran) د ننه په یوه ایل بڼه L-shaped او یو کیلو متر اوږده سورنگ (تونل) کې تر سره کړي. نوموړې سیمه دافغانستان دپولي څخه لږ څه پنځوس کیلو متره لیرې پرته ده. څرنګه چې نوموړې هستوي ازمويښي ، دلږ څه پینځه



ريښتر سکیل (5 Richter scale) په کچه دځمکې زلزلې زيگنالونه (seismic signal) توليد کړه، نو په شاوخوا هيوادونو کې هم د زايښمو گراف په مرسته سره اندازه شوه. د زلزلودغه زيگنالونه په ډاگه کوي، چې دهستوي چاودنوتوله قوه لږ څه څلوېښت کيلوتنه تي اين تي (40 Kilotons TNT) اټکل کيږي. ريښتر سکیل يوځانگړی عدد(شميره) دی چې دځمکې زلزلې څخه ازاده شوې انرژي کچه رابښي. دځمکې لاندې هستوي ازموينه کې د څوملي ثانيوپه ترڅ کې په لوړه درجه تودوخې اولوړه کچه فشار منځ ته راځي، چې په پايله کې دچاودنې په نږدې شاوخواکې ټول شيان لکه ډبرې، شگه او خاورې ويلې کيږي او په غازاوري. د چاودنې په شاوخوا کې مواد، د زورورې شوک څپې (Shock wave) په قوه سره، هرې خواته شيندل کيږي، او يو غټ گرد سوري منځ ته راځي. دڅوساعتونوڅخه وروسته دڅاه په لاندنۍ برخه کې (Cavity Chimney) يوه هنداره ډوله ځليدونکې ويلې شوې لاوا Lava راټوليږي. دشوک څپې دومره قوه لري، چې دڅاه په لاندې برخه کې په لوړه کچه توليدشوی تودوخې او فشار، دڅاه پورته خواته لږدوي، او له دې کبله دچاودنې په اخير پړاو کې، دڅاه سر برخې ته يانې د ځمکې مخ ته هم ډيرراديو اکتیومواد راشيندل کيږي. په پايله کې دځمکې پر مخ، يو غټ سوري منځ ته راځي، چې د کراتر Crater په نامه سره ياديږي. دنوموړي سوري غټوالی، د هستوي چاودنې په قوه، او دڅاه په ژوروالي پورې اړه لري. دبيلگي په ډول که چيرته پنځوس کيلو ټنه (50 kilotonn) زوروره چاودنه په يوه اوه سوه متره ژور څاه کې تر سره شي نو د ځمکې پرمخ به يوسوري يانې کراتر منځ ته راولي چې قطري لږ څه دوه سوه متره غټوالی لري دځمکې لاندې هستوي ازموينې په ترڅ کې نيوترونه او گاما وړانگې خپريږي، چې هستوي تعاملونه ترسره کوي، او په پايله کې لږڅه درې سوه راديواکتیو ايزوټوپونه په مصنوعي توگه منځ ته راځي، او دالفې، بيتا او گاما وړانگې خپروي. دبيلگي په ډول لکه پلوتونيم Pu^{239} ، کريپټون Kr^{85} ، ايودين I^{128} ، کسينون Xe^{136} ، نيپټونيم Np^{239} ، سټرونسيم Sr^{90} ، سيزيم Cs^{130} ، څيرکونيم Zr^{95} ، باريم Ba^{140} ، موليبدن Mo^{99} ، تيلور Te^{134} اونور(91). هغه راديو نوکلید، چې دويلې کيدلو ټکی يې دلږڅه يوولس سوه درجې سانتي گراد ($1130^{\circ}C$) څخه ښکته وي لکه ايودين، سيزيم او د کريپټون او کسينون غاز دکيندل شوي څاه دبيخ څخه پورته خواته خوځيږي، او بيا دځمکې مخ او هواته راوځي. هغه توليد شوي راديو نوکلید، چې د غاز شکل نه لري، لکه څيرکونيم، نيپټونيم او پلوتونيم د لاوا سره Lava گډيږي او بيا دځمکې لاندې اوبوته لاره پيدا کوي. نو هغه څوک چې ديوې هستوي ازموينې ته ورنږدې ژوندکوي، داوبو او د تنفس له لارې نوموړې راديواکتیو مواد بدن ته رانيولای شي.



- شکل: دځمکې لاندې هستوي چاودنه کې ددې اړتيا ليدل کيږي، چې چاوديدونکي مواد ډير ژورپه يوه څاه کې کيښودل شي، او بيا د څاه تشه برخه په فني توگه ډکه او خوله يې وټرل شي. په نوموړي شکل کې ديوه کيلو ټن (1 Kiloton) زورورې چاودنې اغيزې لکه د ځمکې پر مخ د يوه سوري يانې کراتر Crater منځ ته راتلل، دڅاه ژوروالي په واحد د فېټ (feet) ښودل شوې ده. دبيلگي په ډول ديو کيلو ټن لسمه برخه (0,1 Kiloton) زورورچاوديدونکي موادهم بايد چې لږڅه په دوه سوه ډيرش فېټ




ژورخاه کي ځای په ځای کړو ترڅو دځمکې مخ ته (Ground surface) راديو اکتیو مواد ازاد نه شي او دځمکې لاندې خوندي پاتې شي.

همدارنگه د سولې په لاره کي هم د اټوم انرژي څخه دگټې اخیستلو په موخه ، بشر د ایونایزکونکو وړانگو دخطر څخه ځان نه شي ژغورلای. د بېلگه په ډول کله چي په ۲۶ داپریل ۱۹۸۶ م کال په چرنوبیل کي د هستوي بټۍ د چاودلو پېښه وشوه، نو په پایله کي په زرگونو خلک د وړانگو په ناروغۍ اخته شول. د بېلگي په ډول په ۹۸ شکل کي دیوه معیوب ماشوم د هایدروسیفالوس ناروغي ښودل شوي ده.




۹۸-الف شکل: په پورتنی شکل کي د بیلگي په ډول دیوه ماشوم عیب لرونکی غړی لکه داوبو سر هایدروسیفالوس Hydrocephalus او د ستون فقرات مېنېنژیوم (Meninigeom) ښه ډوله پړسوب (Benigner tumor) ښودل شوی دی(۸۹).




۹۸- ب شکل: د جاپان خلکو په راتلونکي نسل کي د اټوم بم د وړانگو وروستی جینیټیک ناوړه اغیزې لکه دسرکپړۍ هډوکو او مخ معیوب ډولونه ښودل شوي دي.

په ۳۷ جدول کي دروغتیا په تراودلوړې او ټیټې کچي اغیزمن دوزکلینیکي اغیزې اوناوړوغۍ بیان شوي دي. کله چي ایونایزکونکي وړانگي په بدن ولگيږي، نوپه لومړیو پېښو نه تر پېنځه لسو دقیقو په موده کي، لومړنۍ اغیزې لکه لوستل (استفراق)، خواه بدیدل، د بدن حجروڅخه داوبو ضایع کیدل، خولي کیدل او نورپیل کيږي. په نوموړي جدول کي د وړانگو ناروغۍ کلینیکي اغیزې دانرژي دوز داندازې سره سم ښودل شوي دي کله چي ټول بدن ته په یوه وارسره ورسيږي.



دورانګو اغيزمن ډوز اندازه	دورانګو ناروغۍ کلينيکي سيمپتومونه يا نښانې
د صفر نه تر دوه سوه ملي سيورته پورې (0-200 mSv)	د ژوند په اوږدو کې د دې احتمال شته دی چې وروستی پېښې لکه سرطان او جنېټيک اوسوماتيک موټېشن منځ ته راشي. د موټېشن بېالوژيکي اغيزې په لومړي وخت کې ثبوت کېدای شي
د دوه سوه ملي سيورته نه تر پېنځه سوه ملي سيورته پورې (200-500 mSv)	کلينيکي سيمپتومونه سمدلاسه نه شي پېژندل کېدای خو په کروموزومو کې د موټېشن بېالوژيکي اغيزې ثبوت کېدای شي. د وينې په جوړښت کې بدلون لکه د ليمفوڅوټو او نيوتروفيل کمښت او د وروستۍ ناوره پېښو احتمال پورته ځي
د نيم سيورته څخه تر يوه سيورته پورې (0.5-1 Sv)	د دوی نه تر درې اونۍ وروسته د وينې په جوړښت کې بدلون، لږ څه د پوستکي سوروالی، خواګرزېدنه، لوستل (استفراق)، په وينه کې د سپينو کروياتو شمير کمښت، ستوماني، کمزورتيا
د دوو سيورته نه تر دوه سيورته پورې (1-2 Sv)	په وينه کې د سپينو او هم سرو کروياتو شمير په لوړه کچه کمښت مومي او دبېرته روغوالي کرښه يې ډير وخت نيسي د هډوکو په مازغوکي ناوره اغيزې، لوستل (استفراق)، خواګرزېدنه، په زياته کچه د ځان کمزورتيا او په سلو کې شل مړينه، د سترگو د ليد کمښت (Cataract)، د سرو کروياتو کمښت anemia، د وينې سرطان، د کوچنيانو د هډوکو په تپه سترديد او د سرو کپړۍ کوچنيوالي Microcephaly
د دوه نه تر څلور سيورته پورې (2-4 Sv)	د دريو نه تر پېنځه ورځې وروسته د وينې په جوړښت کې زيات بدلون، لوستل (استفراق)، خوا بدي، نس ناسته (احسال)، دستوني درد، درنګ سپينووالی، د وزن بايلل، دروغتيا په تړاو زياته کمزورتيا، د ساري ناروغيو زياتوالی، ديرش نه تر پنځوس په سلو کې مړينه
د څلور نه تر شپږ سيورته پورې (4-6 Sv)	د اوښتانو توپدل، د اشتها کمښت، په پوستکي کې سره رنگه خالونه منځ ته راځي داځکه چې تر پوستکي لاندې رگونه چوي او وينه د باندې راوځي، تبه لرل، دستوني التهاب، لوستل، خوا بدي، نس ناسته (احسال)، د وينې په جوړښت کې زيات بدلون، د هاضمې سيستم خرابوالی، د ساري ناروغيو زياتوالی، د وينې استفراق، د پنځوس نه زيات په سلو کې مړينه
د شپږ نه تر اته سيورته پورې (6-8 Sv)	پاس يادشوي سيمپتومونه نور هم پياوړي کيږي او د ديرشو ورځو څخه وروسته سل په سل کې مړينه.

۳۸ جدول: دورانګو کلينيکي نښې يانې سيمپتومونه (Clinical symptoms) د انرژي ډوز په تابع سره ښودل شوي دي کله چې په يوه وار او دکم وخت لپاره د يوچاټول بدن ته تر اته سيورته پورې وړانګې ورسېږي.



☞ که چیرته دیوچا ټول بدن او په یو وار سره ډورانگو په څلورنیم گری (4,5 Gy) رڼا شي، نو پا یله یې داسې اټکل کیږي، چې د سلو څخه پنځوس په سل کې 50% رڼا شوي کسان به، ددیرشو ورځو 30 days په موده کې مړه شي. نوموړی مطلب د یوه ریاضي لنډ فرمول په مرسته داسې لیکل کیږي (**Letal dosis = LD50/30**)

☞ هغه حرارتي انرژي چې یو کیلو گرام اوبو ته ورکړه شي، تر څو د تودوخي درجه یې د سانتی گراد یوې درجې 1°C په اندازه سره پورته بوزي د $4,2 \times 10^3 \text{J/kg}$ سره مساوي ده، نو کله چې څلورنیم گری وړانگې په نسجونو باندې ولگيږي، د تودوخي درجه یې یوازې یو په زرمه برخه پورته ځي ($0,001^{\circ}\text{C} \sim 4,5\text{Gy}/4,2 \times 10^3 \text{J/Kg}$). نوموړې بېلگه په گوته کوي چې په یوه ماده کې د وړانگو په واسطه د تودوخي پورته وړل او د هغې په بنسټ ډورانگو ناوړه اغیزې ټاکل، کومه غوره او اغیزمنه فزیکي کړلارې نه شي کیدلای.


په رڼا شوو نسجونو کې هیستولوژیکي بدلون



کله چې د بدن غړي په ایونایزکونکو وړانگو رڼا شي، نو د هغوی په نسجونو کې بیخي ژور هیستوپاتولوژیک (Histopathologic) او مورفولوژیک (Morphologic) بدلون منځ ته راځي. د بیلگې په ډول لکه:


- * د نسجونو وراستوالی، مراویټوب او پیاوړکیدل لکه نیکروسیس (Necrosis)
- * دویني رگونه (Vessels) ارت کیږي (Dilatation) او په حجرو کې دومره زیان منځ ته راځي چې خپله دنده نه شي تر سره کولای.
- * درگونو دیوالونه پرسیږي او اوبه ځانته رانیسي (Edema) او په پایله کې د گاونډیو اوڅرمه حجرو تر منځ اړیکې شلیږي.
- * د حجرو هستې (Cell nuclei) د نورمال حالت نه غټیږي او غشا یانې میمبران (Membran) یې پرې کیږي.




۹۸- ج شکل: کین اړخ ته نورمال او بڼي اړخ ته رڼا شوي حجرې ښودل شوي دي (IAEA)



	د نړۍ کولمه jejunum د بيوپسي Biopsy يوه هيستولوژي بڼه ښودل شوې ده چې وړانگې ورته نه دي رسيدلي. په دغ شکل کې دنوموړي غړي يوه روغه پرې شوې برخه ښودل شوې ده
	د نړۍ کولمه jejunum د بيوپسي Biopsy د پورتنۍ شکل هيستولوژي بڼه ددرملنې په موخه د لږڅه لس گړې رڼا کولو څخه وروسته ښودل شوې ده او ښکاره بدلون پکې ليدل کيږي. د بېلگه په ډول د کریپټ Crypt ډيرې ځانگړي تر منځ چاک يانې وت ډک شوې او هلته ځانگړي ويلوس Villus منځ ته راغلي دي.





نه رڼا شوي عادي حجرې Normal Cell	رڼا شوي حجرې Irradiated Cells
	

۹۹- شکل: د پورتنۍ شکل په ښي اړخ کې د ایونایزکونکو وړانگو په واسطه رڼا شوې او کین اړخ کې نه رڼا شوې نورمال یانې عادي حجرې هیستولوژي ښه ښودل شوې ده (40).

دوینې په جوړښت کې کلینیکي بدلون

د بدن دوینې په جوړښت کې لاندنۍ کلینیکي بدلون لیدل کیږي، کله چې درې گری (3 Gray) وړانګې ورته ورسېږي



- * ترلږ څه شلو وروځو پورې کومه کلینیکي ناروغي نه ښکاري
- * د شلو وروځو څخه وروسته دوینې کمښت منځ ته راځي او دوینې ترانسفوزیون (Blood Transfusion) ته اړتیا ده.
- * د لږڅه دیر شوو ورځو څخه وروسته د بدن دفاع سیستم په فعالیت پیل کوي او زیار باسي چې د وینې نیمګړتیا بیرته پوره کړي
- * د هېموګلوبین کمښت
- * د ریټیکیلو سیتو شمیر لږڅه ثابت پاتې کیږي
- * د نیوټروفیل (Neutrophils) کرویاتو شمیر سمدلاسه د شپږو زرو څخه تر شل زرو پورې پورته ځي او بیا د اتو ساعتو څخه وروسته په کمښت پیل کوي او د دیر شوو ورځو څخه صفرته رسېږي
- * لومفو سیت (Lymphocytes) سمدلاسه د پینځو زرو څخه تر یو زر پورې کمښت مومي او د اتو ساعتو څخه وروسته بیا ثابت پاتې کیږي



۱۰۰- شکل: د بدن د وینې په جوړښت کې کلینیکي پورتنۍ بدلون لیدل کېږي کله چې درې ګري (3Gray) وړانګې ورته ورسېږي. په عمودي محور کې د وینې په یوه مکعب ملي متر حجم کې د سرو کرویاتو او سپینو کرویاتو شمیر او په افقي محور کې وخت په واحد دورځو (DAYS) او ساعتونو (HOURS) پر لیکه شوی دی (40).




۱۰۱- شکل: دورانګو سیندروم (Radiationsyndrom) د بدن په پوستکي کې یو ژور سورۍ او پرهار منځ ته راوستی دی (40)



۱۰۱- الف شکل: د ۱۹۴۵ څخه تر ۱۹۹۸ م کال پورې دنړۍ ځينو هیوادونو هستوي ازموینو شمیر د کالونوپه تابع سره بنودل شوي دي. ډیر مسلکي کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان ډیرې ناروغۍ د هستوي ازموینو سره تړاو لري (91)

پوښتنې (Questions):

- ۱-۱۲ په کلینیکي تړاو LD50/30 لنډیز څه مانا لري؟
- ۲-۱۲ په کوم کال کې دروغتیا په تړاو دورانګوناوره لومړنۍ اغیزې وپېژندل شوې او د سرطان ناروغي د منځ ته راتلو سبب وګرځېدې؟
- ۳-۱۲ دورانګو سیندروم څه ته وايي؟
- ۴-۱۲ کله چې دیوچا بدن په وړانګو رڼا شي نو په وینه کې کوم بدلون منځ ته راځي؟
- ۵-۱۲ په کومه کچه وړانګې د مرګ سبب ګرځي؟
- ۶-۱۲ په رڼا شوو نسجونو کې کوم هیستولوژي بدلون منځ ته راځي؟
- ۷-۱۲ هایدرو سیفالوس او مینینګیوم څه ډول تومور ته ویل کیږي؟
- ۸-۱۲ په کومه کچه وړانګې چې د لاس پوستکي ته په یوه وار ورسېږي نو د التهاب او سوررنګ Erythem سبب (لامل) ګرځي؟
- ۹-۱۲ په کوم کال کې د لومړي ځل لپاره دورانګو ناوره اغیزې لکه سرطان ناروغي وپېژندل شوه؟



اوومه برخه

ديارلسم څپرکی


دورانگو نه ساتنه

(Radiation Protection)

سريزه

کله چې په ۱۸۹۵ م کال کې د کونراډ رونتگن (Roentgen) له خوا ډاکسريز (X-Rays) چې مانا يې ناڅرگنده وړانگې او په ۱۸۹۶ م کال کې طبيعي راډيو اکتیويټي د بیکاريل (Becquerel) له خوا کشف شوې، نوساینس پوها نو ډیر زردا مالومات تر لاسه کړ، چې ګڼه ایونایزکونکې وړانگې نه یوازې داچې دناروغیو ډیپنډلو او درملنې په موخه ګټورې اغیزې لري، خوکه چېرې دنوموړو وړانگو سره په پاملرنه او غورسره سم چلن وه نه شي، نود ګټې په ځای د بدن نسجونو ته ډیر زیان هم رسولای شي. په دی اړوند ډیرې ناوړه پېښې هم ترسره شوې دي، لکه دچرنوبیل هستوي بټۍ چاودنه، دهستوي وسلوپه ازموینه کې چاپیریال ته اذاشوي راډیونکلید، داتوم بم د کارولوپه پایله کې د چاپیریال ککړتیا اونوردیادولو وړ دي.

په دې اړوند یوه ژوندۍ تاریخي بېلګه د یادولو وړ ده. په ۱۹۳۲ م کال کې د ماري کیوري لورچې نوم یې ایرېني ژولیت کیوري (Irene Joliot Curie) وه په لابراتوار کې د خپلې مور سره یوځای تجربې ترسره کولې. په دې ترڅ کې ایرېني ژولیت کیوري د بې پروایۍ له کبله یوبوټل وچاودیده، چې په هغه کې د پولونیم Polonium 210 نمونه خوندي شوې وه. دکیوري لور د پولونیم راډیو اکتیو غازتنفس کړو. په ۱۹۵۶ م کال کې ایرېني ژولیت کیوري د وینې سرطان (Leukemia) د ناروغۍ له کبله مړه شوه. نوموړې پېښې په ډاګه کړه چې د پولونیم راډیو اکتیو عنصر دسرطان ناروغي راپاروي. دغه پېښه دورانگو ستوخاصتیک یانې احسايوي اغیزې یو وتلې بېلګه کیدای شي.



دورانگو نه ساتنه او ژغورنه دا ما نالري چې داسي لاري چاري او کرنلاري ولټول شي تر څو انسانان، ټول ژوند سوري، څاروي، اود چاپيريال ټول ژوندي او نه ژوندي شيان دايونايژکونکوورانگودبي ځايه زيان او خطرڅخه په امن کي وساتل شي کوم چې د طبيعي او مصنوعي راديو اکتيو سرچينو څخه خپريري.

دورانگو نه ساتنه دژوند په ډيرو برخو لکه درمل پوهنه (طبابت)، راديوبيالوژي، راديوکيمي، هستوي وسلو او هستوي دستگاوپه جوړولوکي ډير مهم رول لوبوي. په دې هکله په هر هيوادکي ځانگړي ملي قوانين ديوي خواوپه نړيواله کچه بيا نورقوانين اوکونونسيون دبلي خوا ټاکل شوي دي، چې دهغوي عملي کول دهر هيواد مهمه دنده گڼل کيري. دبېلگه په ډول:

د نړيوال اتومي انرژي دمنشور (Atomic Energy Act 1958) په لومړي څپرکي کي ليکل شوي دي: دنوموړي سازمان غړي هيوادونه مجبور او مکلف دي چې داتومي انرژي څخه په پوځي برخه کي نه بلکه يوازي دسوله ايز نيت په موخه دژوندانه په مهمو برخو لکه طب،کرهڼه، دبريښنا توليد اوصنعت کي، چې نورې نړي او چاپيريال ته زيان وه نه رسيري، دپرمخ تللي ټکنالوژي په مرسته سره گټه پورته کړي. هر هيواد چې د اتومي انرژي څخه ناوړه پوځي گټه پورته کول غواړي ، د نړيوال بنديزونوسره به مخامخ کيري.


د وړانگو څخه د ځان ساتنې کرنلاره د ټولو مسلکي کسانو لپاره چې په هستوي بټي، هستوي وسلو، هستوي فزيک، راديوفيزيک، راديوپولوژي، راديوټراپي، راديوبيولوژي او درمل پوهنه کي کار کوي خورا مهم رول لوبوي.

د وړانگو د خطر څخه دځان ساتنې په موخه، په نړيواله کچه منل شوي نامتوخيرونکي پوهنيز ټولني منځ ته راغلي، چې هغوي دخپلواوردې مودې اپيډيمولوژي څيړنو (Epidemiological research) او تجربويه پايله کي، د وړانگو ستوخاستک اونه ستوخاستيک ناوړه اغيزوپه رڼا کي دانرژي ډوز لوړه کچه د مسلکي کارکوونکو اودعام ولس لپاره ټاکي، او دهغي سره سم د يو لړ غوره تگلارو او کرنلارو سپارښتنه کوي. دبېلگه په ډول:

* په ۱۹۲۸ م کال کي دهغه وخت راديوپولوژي او راديم ټولني له خوا دورانگو نه دساتنې نړيوال کمسيون (International commission on radiological protection) ICRP منځ ته راغی.

* په ۱۹۵۵ م کال کي دملگرو ملتوداتومي وړانگواغيزو علمي ټولنه چې دنوم لنډيزي په (UNSCEAR) سره ليکل کيري جوړه شوه. United Nation Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

* دنړيوال اتومي انرژي د منشور په دريمه ماده کي (د ساتنې بنسټيز ستاندارد BSS) تر نامه لاندې Basic safety standards دراديو اکتيو موادو سره دچلن هر اړخيزي کرنلاري او تگلاري بيان شوي دي.



دورانگو دخطر څخه د ځان ژغورلونامتو کړنلارې

په ورځني ژوند کې ضرور ده چې هرڅوک دایونایزکونکو وړانګود خطر څخه د ځان ژغورلو په موخه لاندني نامتو کړنلارې او تگلارې په پام کې ونیسي.

لومړۍ- دواټن په پام کې نیول (Distance)

تر خپله وسه باید زیار وه ایستل شي چې دراديو اکتیو سرچینې څخه لیرې واټن ونيول شي. داځکه چې دورانگو انرژي D دواټن r د مربع سره سم معکوسا کمښت مومي.

* **پوښتنه:** دیوې راديو اکتیو سرچینې د انرژي ډوز قدرت D_1 په په یومتر واټن $r_1 = 1m$ او یوه ساعت کې $D_1 = 500 \text{ mSv/h}$ ده. په درې متر واټن $r_2 = 3m$ کې ددغې سرچینې قدرت څومره کمښت مومي؟

* **حل:** د واټن او ډوز قدرت تر منځ لاندې اړیکې شته دي.

$$D_1 \times r_1^2 = D_2 \times r_2^2$$

$$D_2 = \frac{r_1^2 \times D_1}{r_2^2} = \frac{1m^2 \times 500 \text{ mSv/h}}{(3m)^2} = 55,6 \text{ mSv/h}$$


* **ځواب:** په درې متر واټن کې د سرچینې قدرت د پنځو سوو ملي سیورت څخه لږڅه شپږ پنځوس ملي سیورت په ساعت کې کمښت مومي

* **پوښتنه:** دیوې راديو اکتیو سرچینې څخه وړا نګې خپرېږي او شدت یې ($I_1 = 500 \text{ mSv/h}$) په یوه ساعت اوشپږوسانتي مترو کې پینځه سوه ملي سیورته دی. دنوموړې سرچینې شدت I_2 په پینځوس سانتي مترو کې څومره دی؟

* **حل:** که لومړۍ واټن په d_1 او دویم واټن په d_2 سره وښیو نولروچې:

$$I_2 = \frac{I_1}{\left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2} = \frac{500}{\left(\frac{50}{6}\right)^2} = \frac{500}{(833)^2} = 72 \text{ mSv/h}$$

* **ځواب:** دراديو اکتیو سرچینې شدت په پینځوس سانتي متر واټن کې دوه اويا ملي سیورت ته را لوړیږي.



دویم - دوخت په پام کې نیول: (time)

څرنگه چې دورانګو انرژي اندازه D دورانګو دخپريدلو وخت t سره سم سيخ متناسب ده، نو په هغه چاپيريال کې چې راديو اکتیو وړانګې دهوا او يا دځمکې پر مخ ديوي منبع څخه خپريږي، بايد هيڅ څوک تم نه شي او يا په دومره کچه هلته پاتې شي څومره چې ورته اړتيا ليدل کيږي. په اخري حالت کې بايد مخصوص کالي واغوستل شي او د تنفس کولو لپاره هم ځانګړې ماسکونو masks او فلټرونو څخه کار واخيستل شي.

دورانګو انرژي ډوز = وخت $\times$ ډوز قدرت

$$\text{Dose} = \text{Dose Rate} \times \text{Time}$$

$$Sv = (Sv/h) \times h$$

وخت = انرژي ډوز $\div$ ډوز قدرت

ډوز قدرت = انرژي ډوز $\div$ وخت

ددې لپاره چې دورانګو خطر د بدن لپاره کم شي نو په راديو اکتیو چاپيريال کې ډيره لږ موده څومره چې ورته اړتيا وي پاتې شي.


* **پوښتنه:** ديوي سيمي چاپيريال په راديو اکتیوکوبالت موادو ککړ شوی دی، چې قدرت يې په يوه ساعت او يوه متر کې لس ملي سيورت (10 mSv/h) قيمت لري. دڅومره وخت لپاره يو مسلکي کارګر دنوموړې سرچينې په يوه متر واټن کې پاتې کېدلای شي، ترڅو هغه ته دورانګوتاکل شوی کلنی لوړ ليميت څخه ډير انرژي ډوزونه نه رسيږي؟

* **حل:** څرنگه چې ديوه مسلکي کارګر لپاره په ۳۹- جدول کې ديوه کال لپاره لوړ انرژي ډوز ليميت شل ملي سيورت (20 mSv) ټاکل شوی دی نو د پاتې کيدلو وخت t مساوي ده له: کلنی لوړ انرژي ډوز ليميت تقسيم په ډوز قدرت

$$t = \frac{20 \text{ mSv}}{10 \text{ mSv} / h} = 2 h$$


ځواب: مسلکي کارګر بايد ددو ساعتونو څخه ډير په راديو اکتیوموادو ککړه سيمه کې پاتې نه شي.

دریم - څرنگه چې دګاما وړانګو يوي سرچينې د انرژي ډوز قدرت D د يوي مادي د پندوالي d په تابع سره اکسپوننسيال Exponential کمښت مومي، نو ضرور ده چې تل هڅه وښي تر څو خپل ځان ديوه جسم تر شا پټ او خوندي وساتل شي.




$$D = D_0 \times e^{-\mu d}$$


په پورتنۍ معادله کې D_0 د گاما سرچینې دوز قدرت دی کله چې د یوه سړي او سرچینې تر منځ کومه ماده موجوده نه وي او μ په ماده کې د وړانگو د کمزورتیا فکتور دی.



۱۰۳- شکل: د الفا وړانگې د کاغذ یوې پانې او دبېتا وړانگې د سړي د لاس څخه هم نه شي تیرېدلای. په داسې حال کې چې د گاما وړانگې په یوه ماده کې د اکسپونینسیال تابع په ډول کمښت مومي او د لاس، کنکریت او نورو شیانو څخه هم تیرېږي (27).



۱۰۴- شکل: کې بنودل شوي ده چې د یوې مادې لکه کاغذ، لرگی او کنکریت په مرسته سره سړي کولای شي دایونایزکونکو وړانگو څخه ځان وژغوري. د بېلگه په ډول موږ کولای شو چې دالفا وړانگې د کاغذ یوې پانې، بېتا وړانگې د یوه لرگي او د گاما وړانگې د کنکرېت په مرسته سره مخنیوی وکړو. همدارنګه دالفا وړانگې د بدن پوستکي څخه نه شي تیرېدلای خو دبېتا وړانگې د بدن په ننه کې بیخي جذب کیږي او دگاما وړانگې دنورو وړانگو په پرتله بیا نو د بدن څخه هم تیرېدلای شي.



څلورم - تر خپله وسه پورې هڅه وشي چې هر ډول خوراکي او يا دڅښلو شيان چې په راديو اکتیو موادو کې شوي وي، بدن ته لاره پيدا نه کړي او مخ نيوی يې و شي.


پينځم - په يوه راديو اکتیو چاپيريال کې خورل، څښل، سگرت څکول او دراديو اکتیو موادو سره تماس لکه په لاس کې نيول ټول منع دي.

شپږم - هغه مسلکي اونه مسلکي کارکوونکي چې په راديو اکتیو چاپيريال کې په کار بوخت وي لږ څه يوواريه يوه کال کې دورانگوڅخه دځان ساتنې په هکله نوي مالومات او زده کړه ورکړه شي. همدارنگه داسې لارې چارې او سربستې ونيول شي، چې يوکارگر ته دنړيوال سازمان (ICRP) له خوا دورانگو کلنی منل شوي کچې څخه، زياتې وړانگې وه نه رسيري. دنوموړې موخې لپاره دورانگو اندازه کولوفزيکي آلي وکارول شي.

اووم- د الارا پرنسيپ (As low as reasonably achievable = ALARA)

په اوسني وخت کې گڼ شمير پيژندل شوي بيورياضي موډلونه دا مني، چې ايوناييزکونکې وړانگې که هر څومره په ټيټه کچه او اندازه هم وي خوبيا هم د سرطان ناروغي دراپارولو او منځ ته را تلو د خطر سرچينه کيد لاي شي. داځکه چې لا تر اوسه ددې سپينوی نه دې شوی چې په ډيره ټيټه کچه وړانگې د بېلگې په ډول لکه د يو ملي سيورت څخه تر دوه سوه ملي سيورته پورې بې خطر دي. دا په دې مانا چې ددې احتمال هم شته دی چې که دالفا وړانگو يوه ذره په يوه حجره (ژونکه) ولگيري او موتیشن منځ ته راولي، نو په پايله کې د سرطان ناروغي منځ ته راوستلای شي. نړيوال هغه مسلکي پوهان چې د نوموړې تگ لارې په هکله سره په يوه خوله دي دغه ډول تيوري ته د **سم سېخ اونه لېمېټ لرونکې تيوري ويل** کيږي. له دې کبله نړيوال ټول نامتو پيژندل شوي کميسيونونه لکه دورانگو نه دځان ساتلو نړيوال کميسيون (ICRP)، داتومي انرژۍ نړيوال سازمان (IAEA)، اودروغتيا نړيوال کميسيون (WHO) دنړۍ ټولو هيوادونو ته په ټينگه سره دا سپارښتنه کوي، چې د هر اړخيزو سربستو او تجربو په مرسته سره تر خپله وسه پورې هڅه و شي، چې دورانگو اندازه دومره ټيټه وساتل شي څومره چې ديوې خوا ورته اړتيا ليدل کيږي او دبلې خوا امکان ولري. دورانگو نه دځان ساتنې نړيوال کميسيون (ICRP) نوموړې سپارښتنه د **الارا پرنسيپ (As low as reasonably achievable = ALARA)** په نامه سره کارولې ده. څرنگه چې نن ورځ د الارا پرنسيپ دهر هيواد په ملي قانون کې رسمي ځای نيولی دی، نو له دې کبله يې پلي کول د هر هيواد لپاره يوه قانوني دنده گڼل کيږي.

د الارا پرنسيپ په بنسټ دافغانستان دولتي چارواکو يوه ملي او نړيواله دنده گڼل کيږي چې سمدلاسه داسې لارې چارې ولټوي، چې نور د هيواد چاپيريال د يورانيم په راديو اکتیو موادو، بېالوژيکي موادو، کيمياوي موادو کې نه شي. دنوموړو موادو د اندازه کولو په موخه دچاپيريال ساتلو (Environment protection) يوځانگړی پروگرام او پروژه پرانيستل شي




اووم: ټولې هغه سیمې چې په رادیو اکتیو موادو ککړ شوي وي، د رادیواکتیوسرچینې دخطر پیژندلو نښه په پام کې ونیول شي چې په ۱۰۵ شکل کې ښودل شوې ده.




۱۰۵- **شکل:** درادیو اکتیو سرچینې د خطر پیژندلو ټاکلې علامه په ټولو هغو ځایونو کې باید په کار و اچول شي چې هلته چاپیریال په رادیو اکتیو موادو ککړ شوی وي.

په ۱۰۶ شکل کې دورانگو نه دځان ساتنې په موخه درې نامتو کړنلارې لکه واټن (Distance)، درنا کیدلوموده (Irradiation time)، اودسرچینې په شاوخوا کې د یوه دیوال (Shielding) جوړول ښودل شوي دي.



۱۰۶- **شکل:** دایونایزکونکو وړانگو دخطر څخه دځان ساتلو درې نامتو قانونونه یا کړنلارې ښودل شوي دي.




👉 **پایله:** په رادیو اکتیو ککړ شوي سیمه کې د تم کیدلو وخت داړتیا نه ډیر وړه نه ټاکل شي، په لیرې واټن کې دریدل اود یوه شي په خټ کې ځان خوندي ساتل او نور دورانگوزیان کموي.

په ۳۹ جدول کې د عام ولس او همدارنگه دهغو کسانو لپاره چې دخپل مسلک په اساس دراديو اکتیو موادو سره کار کوي او وړانگې ورته رسیږي؛ دیوه کال په موده کې تر ټولو لوړ اغیزمن انرژي ډوز H_{eff} سرحد یا لیمېت اندازه دنړیوال کمیسیونو لکه (UNSCEAR) او ICRP له خوا ټاکل شوې دي چې دنړې هر هیواد دنده داده چې دغه سپارښتنه په پام کې ونیسي او په ورځني ژوند کې یې پلي کړي.

دعام ولس لپاره	دمسلکي کارگرو لپاره	د بدن غړي نوم
1 mSv یو ملي سیورت	20 mSv شل ملي سیورت	ټول بدن ته دانرژي ډوز لوړ لیمیت وړانگې
15 mSv پینځه لس ملي سیورت	150 mSv یوسلو پنځوس ملي سیورت	سترگو ته دانرژي ډوز لوړ لیمیت وړانگې
50 mSv پنځوس ملي سیورت	500 mSv پینځه سوه ملي سیورت	پوستکې ته دانرژي ډوز لوړ لیمیت وړانگې
1 mSv یو ملي سیورت	1 mSv یو ملي سیورت	دمور په نس یا نی رحم (زیلانځ) کې ماشوم ته دانرژي ډوز لوړ لیمیت وړانگې دنهومیاشتو په موده کې
5 mSv پینځه ملي سیورت	50 mSv پنځوس ملي سیورت	دهډوکو سره ماغزه، جنسي غدې
50 mSv پینځوس ملي سیورت	500 mSv پینځه سوه ملي سیورت	لاسونه، پښې او پوستکي
30 mSv دیرش ملي سیورت	300 mSv دری سوه ملي سیورت	دهډوکو پوستکي او ټايرايډ
13 mSv دیارلس ملي سیورت		په دریو میاشتو کې د حاملدارویاني دوه ځانونڅود خپټي برخي ته دانرژي ډوز لوړ لیمیت وړانگې

۳۹- جدول: د عام ولس او مسلکي کارگرو لپاره د وړانگو لوړه کلنۍ اغیزمن انرژي ډوز اندازه چې دنړیوال کمیسیون ICRP له خوا یې سپارښتنه شوې ده (17).

هغه بنځي چې خپلوماشومانو ته شدي ورکوي، اجازه نه لري چې په یوه داسي سیمه یا ځای کې تم شي یا کار وکړي، چې هلته د خوراک، څښاک او تنفس له لاري رادیو اکتیو مواد شتون وي او بدن ته ورننځي. **دمور په نس یا نی رحم کې ماشوم ته دانرژي ډوز لوړ لیمیت وړانگې دنهومیاشتو په موده کې دیو ملي سیورت څخه وانه وړي.**




* **پوښتنه:** په رادیولوژي کې د اکسریز څخه دساتنې په موخه دیوه فلزي دیوال څخه کار اخیستل کیږي چې نیما یې ارزښت پنډوالی یې $HVL = 5 \text{ mm}$ پینځه ملي متره او ټول پنډوالی یې دوه اینچه ($2 \text{ inches} = 25,4 \text{ cm}$) دی. که چیرته ددیوال په مخ باندې په یوه ساعت کې دورانگوشتد سل رونتگن 100 R ولگيږي نو ددیوال په څټ اړخ کې دورانگوشتد په واحد رونتگن په یوه ساعت کې مالوم کړی؟

* **حل:**


$$I = I_0 e^{-\frac{0,693 \times}{HVL}} = 100 e^{-\frac{0,693 (2 \text{ inches}) (25,4 \text{ mm} / \text{inch})}{5 \text{ mm}}}$$

$$I = 100 e^{-7,04} = 100(0,000876) = 0,088 \text{ R} / h = 88 \text{ mR} / h$$

* **ځواب:** اته اتیا ملي رونتگن وړانگې اویا په بل عبارت یوازې نهه په سلو کې ددیوال څخه تیريږي.



۱۰۶-الف شکل: طبي کارپوهان دیوه فلزي دیوال په مرسته سره خپل ځان د رادیواکتیو سرچینې لکه په رادیو اکتیو موادو د چاپیریال ککړتیا او یا لکه د اکسریز ماشین څخه ځان ژغورلای شي. بر سیره په دې ضرور ده چې د وړانگواندازه کولو په موخه د یوه رونتگن فیلم $X \text{ ray film badge}$ څخه کار واخلستل شي چې د بدن په پورتنۍ برخه کې تومبل شوی وي (88)



دورانگوڅه دځان ساتنې سیمې (Radiation Protection areas)

دورانگوڅه دځان سا تني نړيوال کمېسيون (ICRP) دهغومسلکي کارکونکولپاره چې په يوه راډيو اکتیوچاپیریال او راډيو اکتیوموادو سره په کارونوبوخت وي اوورانگي ورته رسيږي، دري ډوله سيمي ټاکلي دي. نوموړي سازمان په دې اړوند ټولومسلکي کارکونکوته سپارښتنه کوي چې په دغوسيموکي دانرژي ټاکل شوي لوړ ليميت په پام کې ونيسي. دورانگوڅه دځان ساتنې سيمي په ټاکلونښو اوډ راډيو اکتیو سرچيني په سمبول لکه ☸ جوت کښل شوي وي او په ۱۰۶ ب شکل کې ښودل شوي دي.

کھ لومړۍ: دښديز سيمه (Closed area)


دښديز سيمه يا ترلې سيمه هغې سيمي ته ويل کيږي چې هيڅ يوه مسلکي کارکونکي ته اجازه نه شته چې هلته کاروکړي. داځکه چې په نوموړې سيمه کې ديوې راډيواکتیوسرچيني انرژي ډوزپه يوه ساعت کې، له دري ملي سيورت څخه پورته وي ($\text{Dose rate} > 3 \text{ mSv/h}$) او له دې کبله دښديزسيمي په نامه سره ياديږي.

کھ دويم: دکنترول سيمه (Controlled area)


دکنترول سيمه هغې سيمي ته وايي چې هلته ديوې راډيو اکتیوسرچيني انرژي ډوز په يوه کال کې دشيپر ملي سيورت څخه لوړقيمت ولري ($\text{Dose rate} > 6 \text{ mSv}$). هغه څوک چې په نوموړې سيمه کې کارکوي بايدچې دټاکلوالو لکه دفيلم ډوزيمتر په مرسته سره هغوی ته د وررسيدلو وړانگوکچه اندازه شي. برسیره پر دې دغه ډله مسلکي کسان بايد چې هرکال په خپل ځان يوه طبي پلټنه تر سره کړي تر څودورانگودزيان کچه او يا په بدن کې دراديو اکتیو موادو شته والی مخکې ترمخه مالوم شي.

کھ دريم: دځارنې سيمه (Supervised area)

دځارنې سيمه دورانگوڅه سيمه ده چې هلته مسلکي کارکونکوته په يوه کال کې ديوه ملي سيورت ($\text{Dose rate} > 1 \text{ mSv}$) څخه ډيري وړانگي رسيږي.



۱۰۶ ب شکل : په يوه چاپیریال کې دورانگو څخه دځان ساتنې سيمي ښودل شوي دي.



پوښتنې (Questions)

۱۳-۱ څلور نامتوکړنلارې په گوته کړی چې دورانگو دخطر څخه دځان ژغورنې په تړاو خورا اړین دي؟

۱۳-۲ دعام ولس لپاره د وړانګوانرژي ډوز کلني لوړلیمیت(حد) دنړیوال سازمان ICRP له خوا څومره ټاکل شوی دی؟


۱۳-۳ دورانګو د شدت کمښت د یوې مادې نیمایي پندوالی HVL شمیر n په تابع سره دلاندني فرمول له مخې تر لاسه کیږي. $(1/2)^n$ دنوموړې مادې څومره شمیرنیمایي پندوالی په کارۍ د تر څو دورانګوشدت د لومړنۍ شدت په پرتله یو په شپاړسمه 1/16 برخه را ټیټ کړي؟

۱۳-۴ یو ماشوم ته چې دمورپه نس کې وي دورانګو لوړ انرژي لېمېټ څومره دی؟


الف: لس ملي سیورت، **ب:** یو ملي سیورت، **ج:** سل ملي سیورت، **د:** پینځوس ملي سیورت

۱۳-۵ دالارا پرنسیپ ALARA څه ډول سپارښتنه ده چې دنړیوال کمسیون ICRP له خوا وړاندې شوې ده اود هر هیواد لپاره د یوه قانون په ډول منل شوې ده.

۱۳-۶ یوه زراعتي ځمکه چې په رادیو اکتیوايزوتوپ سیزم Cs-137 موادو ککړه شوې او اکتیویټي یې یوکیلو بیکاریل 1kBq ده دخوراک له لارې د یوې مرغۍ بدن ته و رننوتلي دي او رادیو اکتیو وړانګې خپروي. دلاندني شکل په مرسته سره مالومه کړئ چې که دوه نورې مرغۍ په خپل وارسره په نیم متر او یومتر واټن کې لیرې ناستې وي نو هغوی ته څومره انرژي ډوز رسیري؟ دکاما ثابت د سیزیم لپاره مساوي ده له: $\Gamma_H = 88 \mu\text{Sv m}^2\text{GBq}^{-1}$



۱۰۶- **ب شکل:** دکین اړخ یوه مرغۍ دخوراک له لارې رادیواکتیو موادځان ته رانیولي دي اوله دې کبله وړانګې خپروي او په پایله کې دوه ګاونډۍ مرغۍ هم د خطر سره مخامخ کوي.



اتمه برخه

څوارلسم څپرکی

د طبیعي وړانگو سرچینې


(Natural radiation sources)

طبیعي وړانګې عبارت له هغو وړانګو څخه دي چې په طبیعت او چاپیریال کې تل او دځمکې په هرځای کې موجودې دي. انسانان، څلورپېښي او نباتات د ژوند په ټوله موده کې دنوموړې وړانګې تر ناوړه اغیزې لاندې پریوتې دي، چې د ډیرو ناروغيو لکه د سرطان ناروغۍ د پیدا کېدلو سبب (لامل) ګڼل کېږي. د طبیعي وړانګو سرچینې په لاندې ډول سره ویشلای شو.

لومړۍ: کازمېکي وړانګې (Cosmic rays)

کازمیکي وړانګې کیهاني وړانګې دي چې د فضا څخه لکه لمر، کهکشان (Milchstrasse) او دنوروستورویاني ګالاکسي (Galaxy) څخه راځي او د پروتونو، الفا ذرو، الکترونو او درندو هستو څخه جوړې شوې دي. کله چې نوموړې وړانګې او ذرې د ځمکې په اتموسفیر باندې و لګېږي، نو هلته د لږ څه پینځه ویشت کیلومترو په ارتفاع کې د هوا د مالېکولو سره هستوي تعاملات تر سره کوي چې په پایله کې نورې هستوي ذرې په تیره بیا لکه میون (Meon)، پیون (Peon)، نیوترون او الکترونه منځ ته راځي. کله چې فضا ته ساینس پوهان په فضايي بیړۍ کې سفرکوي، نو باید چې د هغې د کاپسل جوړښت دومره کلک وټاکل شي، چې دنوموړو لوړانرژي وړانګو لکه لس په طاقت د یوویښت الکترون ولټه (10^{21} eV) د خطر څخه خوندي وساتل شي. داځکه چې تجربو وښودله چې د فضايي بیړۍ په کاپسل یانې باندنۍ سطحه کې دنوموړو زرو د لګیدلو په پایله کې، لږ څه لس زره ګری په یوه ساعت کې ($10\ 000$ Gy/h) انرژي ډوز تو لید کېږي. په داسې حال کې چې که ټول بدن ته په یو وار سره شل ګری ورسیږي نو سمدلاسه مړی شو.

د بېلګه په ډول که څوک په الوتکه کې د لندن څخه تر نیویارک پورې یو ځل تګ او راتګ وکړي، نو هغه ته لږ څه سل مایکرو سیورټ ($100\mu\text{Sv}$) انرژي ډوز رسیږي.




دوهم: دځمکي لاندې وړانگې (Terrestrial radiation)


نوموړې هغه وړانگې دي چې دکاینات (Universum) د پیدایښت سره یوځای د ملیاردونو کالونو څخه راپدې خوا په ځمکه کې شتون لري اودرادیو اکتیو طبیعي عنصرولکه توریم Th-232، یورانیم U-238 او پوتاسیم K-40 څخه دځمکې مخ او چاپیریال ته خپریږي. نوموړي رادیو اکتیو طبیعي رادیونوکلید دځمکې د لاندې په معدني ډبرو اوخاورو کې په غیر متجانس ډول وېشل شويدي او دتجزیې په مختلفو پړاونو کې هستوي وړانگې تر هغه موده پورې خپروي تر څوچې په اخیرکې په ثابتویاني مستقرو عنصرونو واوړي. د روغتیا په تړاو ترټولوخطرناک وړانگې درادون غاز (Radon) د یادولو وړ دی چې دیورانیم رادیو اکتیو عنصر دتجزیې په سلسله کې په ځمکه کې پیدا کیږي او بیا په تیره بیا دکورونو په تکلویو کې راټولیری. دنوموړي رادیواکتیو غاز څخه دالفاورانگې خپریږي چې اکتیویتي یې دځمکې په ځینو برخو کې د لس زره بېکارېل څخه هم په متر مکعب هوا کې (10kBq/m^3) اوړي. داسې اټکل کیږي چې دسرطان ناروغۍ لس په سل کې اصلي علت همدغه د رادون غازگڼل کیږي. په نړۍ کې طبیعي وړانگوکچه تر ټولوزیات په هندوستان کېرالا څلوېښت ملي سیورت (40 mSv)، ایران رامزار څلورسوه پنځوس ملي سیورت (450 mSv) او برازیل کې دوه سوه ملي سیورت (200 mSv) په یوه کال کې اندازه شوي ده.

دریم: دصنعت سره تړلي وړانگې

نوموړې هغه وړانگې دي چې داوسني تمدن او پرمختګ سره یوځای نوې رامنځ ته شوي اودروغتیا په تړاو دبشر لپاره ناوړه وروستۍ اغیزې لري. د بېلګه په ډول لکه دهستوي انرژي څخه په اتومي بټۍ یا ریکټورونو کې کاراخیستل چې بریښنا ترې تولید یږي، او همدارنګه د هستوي وسلوپه جوړولو، هستوي آزموینو تر سره کولو، په تیره بیا په درمل پوهنه کې دناروغيو په پیژندلو او درملنه کې خورا زیات په کار اچول کیږي.



۱۰۷- شکل: د وړانگو سلیزه برخه چې عام ولس ته په یوه کال کې دمصنوعي او طبیعي وړانگو د سرچینو څخه وررسیږي. د بېلګه په ډول درادون غاز ۵۵٪، دننه وړانگې ۱۱٪، کازمیکي وړانگې ۸٪، دځمکې لاندې وړانگې ۸٪، هستوي طب، ۴٪، په طب کې داکسیریزاستعمال ۱۱٪.





په ٤٠ جدول کې د طبیعي اومصنوعي وړانګودانرژي ډوز په واحد دملي سیورت بنودل شوي دي چې دټولو مجموعه په یوه کال کې لږڅه درې نیم ملي سیورت ته رسیږي.

په یوه کال کې طبیعي اومصنوعي وړانګو انرژي ډوز	
لومړۍ: د طبیعي سرچینو وړانګې	
کازمیکي وړانګې	0,3 mSv
دځمکې لاندې وړانګې	0.5 mSv
درادون نجیب رادیواکتیو غاز تنفس کول	1,0 mSv
دخوراک او څښاک دلارې په بدن کې جذب شوي رادیواکتیو عنصرونه	0,3 mSv
دویم: د مصنوعي سرچینو وړانګې	
په درمل پوهنه کې درادیواکتیو موادو استعمال	1,5 mSv
ډاکسریزیکس اخیستل	0,04 mSv
اوه ساعته په الوتکه کې الوتنه	0,05 mSv
پیلوټ یانې دالوتکې چلونکي ته په یوه کال کې کازمیکي وړانګې	2 mSv per year
دچرنوبیل په کنترول سیمه کې اوسیدونکي وګړي	10 mSv per year
هستوي بټۍ په چاپیریال کې	0,01 mSv
د چرنوبیل هستوي پیښه	0,02 mSv
هستوي ازموینې	0,01 mSv
دصنعت په نورو برخو کې درادیو اکتیو موادو هر اړخیز استعمال	0,02 mSv
دطبیعي وړانګوتول انرژي ډوز	3,7 mSv

٤٠ جدول: طبیعي اومصنوعي وړانګوسرچینې بنودل شوي دي.

دبېلګه په ډول لکه کازمیکي وړانګې (Cosmic rays) ، دهستوي وسلو وړانګې (Nuclear weapons) ، دهستوي بټۍ وړانګې (Nuclear power plants) ، دهستوي ازموینو وړانګې (Nuclear tests) ، د ناروغیو په پیژندنه کې ډاکسریزالي (Medical X Rays) ، دځمکې لاندې طبیعي رادیو اکتیو عنصرانو لکه یورانیم ، پوتاشیم، رادون غاز وړانګې (Buried radioactive waste) دتلویزیون وړانګې اونوروسرچینو وړانګې (26).



۱۰۸- شکل: دطبیعی اومصنوعي سرچینو څخه وړانګې خپرېږي او بدن په رڼا کیږي .

پوښتنې (Questions):


۱-۱۴ دطبیعی وړانګې څه ډول وړانګې دي او دکومه ځایه راځي؟

۲-۱۴ دطبیعی وړانګو کچه په منځني ډول او دځمکې پر مخ څومره اټکل شوې ده؟

۳-۱۴ د روغتیا په تړاو دطبیعی وړانګو ترټولوخطرناکه سرچینه کومه دي؟

۴-۱۴ په کومه کچه احتمال شته دی چې دطبیعی وړانګو څخه د سرطان ناروغی منځ ته راشي؟

۵-۱۴ دطبیعی وړانګوپه تړاو سم سیخ اوسرحد نه لرونکي تیوري LNT څه ډول وړاند وینه کوي؟



نهمه برخه

پینځلسم څپرکی


دسرطان خطر احتمال اټکل

(Estimating the risk of cancer Probability)

سرېزه

دسرطان ناروغۍ د منځ ته راتلوا احتمال او دخطر اټکلو کچه د لومړي ځل لپاره د دوهمې نړیوالې جګړې یانې ۱۹۴۵ م کال په جاپان باندې د اټوم بم د چاودنې په پایله کې دهغو ناروغو کسانو د شمیرنې په بنسټ محاسبه کېږي، چې ځینې یې تر اووه پورې ژوندي پاتې دي او هغوی ته د دوه سوه پنځوس ملي سیورټ (250 mSv) نه پورته وړانګې او یا په بل عبارت دطبیعي وړانګوپه پرتله سل ځله ډیرې وړانګې رسېدلې وي. دهغوی څخه ډیر کسان دلسو کالو په موده کې یانې ۱۹۴۵ څخه تر ۱۹۵۵ م کال پورې د وینې په سرطان اخته شول. خو هغوکسانو ته چې ددوه سوه پنځوس ملي سیورټ څخه لږ وړانګې رسېدلې وې، یوه داسې کلینیکي ناروغي او یا نورې ناوړه اغیزې چې ګڼه سم سیخ یې دورانګو سره تړاو درلودلای نه شوه ثبوت کیدلای. دورانګو نوموړې کچه د ټیټې انرژۍ لیول په نامه سره ونومول شوه. د بیلګې په ډول که وغواړو چې دلس ملي سیورټ 10 mSv وړانګو ناوړه اغیزې لکه دسرطان ناروغي او یا په کروموزومو کې موتیشن په رېښتوني او دقیق ډول مالوم کړو نو ددې موخې لپاره په ملیونو وګړو باندې دسرطان ناروغۍ دمنځ ته راتلوه هکله یوه احصایوي، اپیدیميولوژیکي اوږد مهاله څیړنو (Epidemiological studies) ته اړتیا لیدل کېږي.

نن ورځ دورانګود لورې کچې انرژي ډوز د خطر په اړوند پوره مالومات تر لاسه شوي دي کوم چې د اټوم بم دچاودنې، دچرنوبیل هستوي پیښې او د هستوي وسلو دکارولو په پایله کې چاپیریال ته خپرې شوي دي. خو دورانګود ټیټې کچې انرژي ډوز لکه دغریب شوي یورانیم وړانګې، دهستوي بټۍ څخه چاپیریال ته اژادشوي وړانګې، په درمل پوهنه اوصنعت کې د رادیو اکتیو ایزوټوپونو کارولو ناوړه اغیزو په هکله ډیر لږ مالومات شته دي. دا ځکه چې دټیټې کچې وړانګواغیزه یوه ستوخاصتیک او یا په بل عبارت دچانس Chance یوه تصادفي بیالوژیکي پیښه ګڼل کېږي او سم دلاسه یې د کلینیکي زیان سپینوږی د تجربو له مخې نه شي کیدلای. دا په دې مانا چې د ټیټې کچې انرژي ډوز ناوړه اغیزې ډیر کالونه وروسته منځ ته راځي. همدا سبب (لامل) دی چې نن ورځ د ټیټې کچې وړانګو ناوړه اغیزو



احتمال په هکله دخو ډوله تيوري مودلونو څخه کار اخيستل کيږي او پايله يې داده چې په دې اړوند ځانگړو هان په خپل منځ کې هم په يوه خوله نه دي .

په دې اړوند د معادل انرژي ډوز ليميت لوړه او ټيټه کچه يا اندازه په دوه برخو وېشل کيږي .

لومړئ - دلوري کچې اغيزمن ډوز (High level radiation)

دورانگونوموري اغيزمن ډوز هغه برخه تشکيلوي چې تجربو په بنسټ يې دروغتيا په تړاو د وړانگو زيان په ثبوت رسيدلې دي. دنوموري اغيزمن ډوز کچه دوه سوه ملي سيورت نه پيل کيږي او ترسل گونو سيورت پورې رسيږي يانې پورته سرحد نه لري ($> 200 \text{ mSv}$).

دويم - دټيټې کچې اغيزمن ډوز (Low level radiation)


دويمه کچه هغه اندازه وړانگې تشکيلوي چې د اغيزمن ډوزقيمت يې د دوه سوه ملي سيورت څخه رابنکته تر صفره پورې رسيږي ($0- 200 \text{ mSv}$). که څه هم په نوموري اندازه اغيزمن ډوز په بدن کې ناوړه اغيزې پريږدي خو د تجربو له مخې يې ثبوت (سپينوئ) سمدلاسه نه شي کيدلای بلکه يوازې د رياضي فرض شوو تيوري مودلونو په مرسته سره د وړانگو خطر اټکل او مخ وینه کولای شو. نوموري مودلونه لاندني فزيکي او بيالوژيکي ارقام او پارامتر (Parameter) په پام کې نيسي.

د ايونايزکونکو وړانگو او دسرطان ناروغۍ دمنځ ته راتلواحتمال دنومورو وړانگو په ډول لکه الفا، بيتا او گاما، دورانگو په انرژي، د تشعشع (Irradiation) په موده اوداچې په څومره کچه انرژي د کتلې په يوه واحد کې جذب شوې ده اړه لري. برسیره پردې د نومورو وړانگود خطراحتمال د روغتيا په تړاو په همغه کچه زياتيږي چې هر څومره ډيره موده په بدن کې ديورانيم ايزوتوپ پاتې شي.

په ۱۸۹۶ م کال کې يانې د رونتگن وړانگو دکشف څخه يوکال وروسته د روغتيا په تړاو د ايونايزکونکو وړانگو د خطرکلينيکي ناوړه اغيزې وپېژندل شوې. دنوموري وخت څخه راپدې خوا د وړانگو دخطرکچې اټکل دهغو مالوماتو په بنسټ منځ ته راغلي چې په ورځني ژوند کې دورانگو نه د کار اخيستلو په پايله کې لکه هستوي وسلو، هستوي آزمويو، هستوي بټۍ، درمل پوهنه اونوروبرخو کې تر لاسه شوې دي. دنومورو مالوماتو په بنسټ يو لړ بيالوژيکي اورياضي مودلونه لاس ته راغلي چې دايونايزکونکو وړانگود خطرکچې اټکل تر سره کولای شو. دکتاب په دې څپرکي کې به دنومورو مودلونو په هکله رڼا واچوو. خو مخکې تردي دايونايزکونکو وړانگو هغه سرچينې د يادولو وړ دي چې دسرطان ناروغيو د منځ ته راتلوسبب (لامل) گرزي او احساويو څيړنې لپاره کارول کيږي .


دبيلگې په ډول دخاطر هغه احتمال چې ديو ملي سيورت 1 mSv وړانگو څخه چاته رسيږي دهغه خطر احتمال سره معادل دی لکه چې د سل سگرت ځکولو څخه د سرطان ناروغۍ منځ ته راځي

روغتيا ته د ټيټې کچې انرژي ډوزدخطر احتمال اټکل		
په عادي ژوند کې د خطر احتمال	دورانگوخطر احتمال	اغيزه
د يوزر عام وگړو څخه اوه پينځوس تنه مړه کيږي (57:17000)	د اوولس زرو وگړو څخه يو تن مړ کيږي (1:17000)	ديو ملي سيورت 1 mSv څخه د سرطان ناروغۍ خطر



داتوم بم هستوي وړانګې


په ۱۰۹ شکل کې دهغونارو غانو شمیر ښودل شوی ده چې داتوم بم دورانګوناوره اغيزې په پايله کې د وينې سرطان اودسرطان په نورو ناروغيو باندې اخته شول.



۱۰۹- شکل: په جاپان باندې داتوم بم دناوره اغيزې له مخې دهستوي وړانګو په واسطه په يوه کال کې (Annual = a) د سرطان اضافګې پيداشوو ناروغيو په پايله کې، د مړه شوو خلکو شمير په عمودي محور ($10^{-4}/\text{Sv.a}$) اودتير شووکالونو شمير په افقي محور باندې ښودل شوی دی. نوموړې احصائيه د اوږدې مودې لپاره (1950-1985) په لسو زرو وګړو (10 000 persons) کې تر سره شوي ده چې هغوي د دوه سوه ملي ګري ($0,2\text{Sv}$) څخه پورته انرژي پوزباندې رڼا شوي وو. په نوموړي شکل کې ليدل کيږي چې دوينې سرطان (Leukemia) ناروغي وروسته له لږ څه اوه کالو څخه (1953) ترټولولورياني اعظمي قيمت اخلي. دوينې سرطان ناروغي په توروزغول شولويکو اود سرطان پاتي نوري ناروغي په پري شوو ليکو ښودل شوي دي (74).

د رادون غاز وړانګې


دنړۍ په ډيرو ځايونو کې د ځمکې لاندې راديو اکتیو ډبرې شته دي چې دهغوي څخه وړانګې خپريږي. د بېلګه په ډول درادون غاز radon-222 دراديم Radium-226 دتجزیې په کړنلاره کې منځ ته راځي او بيا د کورونوپه ټکاوېواو لاندې چټ کې راغونډيږي. نوموړی غاز دالفا وړانګې خپروي او دسرطان ناروغي سبب (لامل) ګرځي. درادون راديو اکتیو غاز نيمايي وخت څلور ورځې دی او بيا تجزيه کيږي او په پلونيوم Polonium-218 اوږي. کله چې نوموړی غاز دتنفس له لارې سري ته ورننوځي نو دسرطان دناروغي احتمال يې ډير لوړ اټکل کيږي. اخرنی شميرني ډاډه ډاګه کې کوي چې په امريکا کې درادون دغاز څه دديرش زرو څخه تر اويا زرو کسانو پورې دسري سرطان په ناروغي او يوه کال کې مړه کيږي. که چيرته داوسيدلو دکورونوپه ننه کې د چاپيريال اکتیويټي کچه په يوه ليتر هوا کې د شلوپيکو کيوري 20 pCi/Liter څخه واورې، نو ددې اړتيا ليدل کيږي چې دکوتې هوا په هراړخيزو کړنلارو سره تصفيه شي. د بيلګې په ډول لکه دکريکوپه وازولو سره د بهر نه پاکه هوا راننه ايستل شي.



❗ دیورانیوم کانو(معدنو) څخه وړانګې

یوه سل کلنه شمیرنه د المان، انگلستان او امریکا په هیوادونو کې په هغو کسانو باندې تر سره شوې ده چې د یورا نیم رادیواکتیف عنصر په غرنیو کانو کې یې کارونه کړي وه. په نوموړو کانو کې ددري سوه کاله راپدې خوا دیورانیوم دلاس ته راوستلوپه موخه کارونه روان وو. نوموړو کارکوونکو څخه یې نیمایي کسان د څلویښتوکالو په عمر د سږي سرطان په ناروغۍ مړه شول. وروستۍ څیړنو وښودله چې دغوکارگرانو درادیم (Radium) ایزوټوپ څخه خپريدونکی رادون Radon غاز تنفس کړي وه چې دیورانیم دتجزیې په سلسله کې منځ ته راځي اود الفاخطرنا کې هستوي وړانګې ورڅخه خپریږي.

دبېلګه په ډول ددوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته دالمان په ختیزه سیمه کې دیورانیم په کانو کې په زرگونوکارګروپه یوه غرنۍ سیمه کې په کار بوخت وو. دغه کارگران د سږي ناروغۍ څخه ډیر زیات مړه کیدل. په هغه وخت کې دسږي سرطان ناروغي په المان کې چا نه پیژندله نو له دې کبله دغه رنگ ناروغي د همغه غره په نوم نامتو شوه چې د واوروغر (Schneeberger disease) نومیږي.




۱۱۰- شکل: په عمودي محور کې د جرمني هیواد د یورانیم (Wismut Sachsen) په کان کې د یوسلو شپږ پنځوس زرو (156000) کارکوونکو څخه دهغو کارګرو شمیر شول شوی دی چې څو کاله وروسته (عمودي محور) د سږي سرطان په ناروغۍ اخته شول. لکه چې دپورتنی ګراف څخه څرګندیږي چې د لږ څه شلو څخه تر دیرشوکلونو وروسته، دسږي سرطان ناروغي یو اعظمي قیمت ځانته غوره کوي او لږ څه دوو لس سوه (1200) ته رسیږي. په پورتنی ګراف کې هر یو منحنی دیوه څیړونکي تجربو سره تړاو لري چې نومونه یې په ښي اړخ کې لیکل شويدي(17).

❗ که یو چاته لس سیورت وړانګې (10 Sv) په یوه وارورسیږي نود خطراتمال یې دومره اټکل کیږي، چې په خوړخواو یا اونیوکې دمرینې لاملوګرځي

❗ دیو سیورت وړانګو (1 Sv = 1 J/Kg) دخطراتمال دومره اټکل کیږي چې په راتلونکي وخت کې به د سلورنا شووو وګرو څخه پینځه تنه د سرطان په ناروغۍ اخته شي.

❗ که یو چاته سل ملي سیورت وړانګې (100 mSv) په یوه وارورسیږي نود خطراتمال یې دومره اټکل کیږي، چې په راتلونکي وخت کې به د یوزرنا شووو وګرو څخه پینځه تنه د سرطان په ناروغۍ اخته شي




د چرنوبیل هستوي پيښې وړانګې


په ۱۹۸۶ م کال د پخوانۍ روسي اکراین ukraine په هیواد کې د چرنوبیل هستوي پيښې وچاودله. په نوموړې هستوي پيښه کې د چاپیریال هغواوسیدونکو ته چې د سل ملي سیورت څخه ډیر معادل ډوز رسیدلې وه دسرطان په ناروغي اخته شول. د بېلګه په ډول په اکراین کې دویني سرطان کچه د پخوا په پرتله پینځه ځله او دسرطان نوری ناروغۍ اوه ځله پورته ولاړه. که څه هم سل ملي سیورت د ټیټې کچې وړانګو په ډله کې شمیرل کیږي خو سره دهغې هم دا ډیر ګمان کیږي چې په کوچنیانو کې په دغه کچه وړانګې دویني سرطان ناروغۍ د دوو کالوڅخه تر لسو کالو په موده کې منځ ته راوستله.

دهستوي پيښې چاپیریال وړانګې

په پای کې یوه بله شمیرنه هم دیادولورده، چې د هستوي پيښو په چاپیریال کې درادیواکتیو شکمن غاز ناوړه اغیزې او هراړخیزې ناروغۍ دي، چې زیاتره پر کارګرانو او دهغې سیمې پر اوسیدونکو باندې ترسره شوې دي. نو داسې اټکل کیږي چې هغه کوچنیان چې د هغوی پلارونه په هستوي پيښو کې کارونه کوي دنوروسیمو په پرتله دویني سرطان په ناروغۍ ډیر اخته کیږي.



۱۱۱- شکل: د ۱۹۸۶ م کال یانې د چرنوبیل هستوي پيښې څخه وروسته تر دوه زرم کال پورې د تایراید سرطان ناروغۍ (Thyroid Cancer) کلنۍ شمیرپه عمودي محور او دوخت موده په افقي محور باندې ښودل شوې ده. نوموړی شکل لکه په سپینه روسیه (کین منځني) او اکراین هیواد (شئ منځني) دا په ډاګه کوي چې دتایراید ناروغي په هغو اوسیدونکو کې چې په ۱۹۸۶ م کال کې یې رادیو اکتیو مواد لکه ایوډین (Iodine-131) په تایراید کې جذب کړي وو اوس د سرطان په ناروغي اخته شوي دي. د بېلګه په ډول په نوموړي شکل کې زغول شوی منځني دتایراید ناروغانوکلنۍ شمیرڅرګندوي چې د چرنوبیل پيښې له کبله دپخوا په پرتله مخ په زیا تیدوده. دتایراید هغو ناروغانو شمیر چې په طبیعي ډول یانې د رادیو اکتیو وړانګوپه نشتوالي کې یوه ناڅاپه یا تصادفي ډول او په خپل سر په او سیدونکو کې منځ ته راځي په پرې شوي منځني سره ښودل شوې (29).



د خطر زیاتوا لوالی کچه	د سرطان تمه لرلو پېښو شمیر	د سرطان لیدل شوو پېښو شمیر	د کوچنیانو عمر په کالو	د څیړنې موده	د هستوي بټۍ ځای
1,8 ځله	10,5	19	0 - 14	1961-1980	Sellafield (1947)*
3,2 ځله	1,6	5	0 - 24	1968 1984	Dounreay (1954)*
3,2 ځله	2,1	4	0 - 14	1964-1985	Holy Loch (1961)
1,2 ځله	4,2	5	0 - 14	1964-1985	Faslane (1963)
1,3 ځله	2,3	3	0 - 14	1964-1985	Chaple Cross (62)
1,2 ځله	15,7	19	0 - 14	1964-1985	Hunterston (1963)
1,4 ځله	28,6	41	0 - 14	1972-1985	Aldermaston (1952)# und Burghfield (1962)#



۴۱- جدول: د هستوي بټیو په چاپیریال کې د کوچنیانو د وینې سرطان ډیرښت کچه ښودل شوې ده.

اخذ ځای: (Roman et al Brit. Med. J. 295-: 597-602(1987))

د ناروغیو په پیژندنه کې د اکسریز (X-rays) ګټور استعمال


په ۱۹۲۰ م کال کې یوه پراخه څیړنه د رادیو لوژي درمل پوهانو (Radiologists) په هکله د امریکا په هیواد کې تر شوه، چې هغوی د ناروغیو په پیژندلو کې د اکسریز وړانګو څخه ګټه پورته کوله او لږ څه شل کاله د اکسریز الې سره په کار بوخت وو. د څیړنو پایله په ډاګه کړه چې د رادیولوژي څانګې درمل پوهان دنورو څانګو درمل پوهانو په پرتله لس ځله ډیر د وینې سرطان په ناروغۍ مړه کیدل. د بلې خوا په سلګونو درمل پوهان او ساینس پوهان چې د اکسریز په څیړنو، تکنالوژۍ او پر مختګ کې په کار بوخت وو، دنوموړو وړانګو د زیان له کبله یې لاسونه، پوستکي او د بدن نورې برخې وسوځیدلي. همدا سبب (لامل) وو چې د وړانګو ناروغیو څخه د ژغورنې په موخه د رادیو بیولوژي (Radiobiology) یوه نوې او ځانګړې څانګه منځ ته راغله. که څه هم په اوسني وخت کې د اکسریز آلې تکنالوژي او همدارنګه د کار کولو کړنلارې دهغه وخت په پرتله ډیرې سمې شوې دي، خو د مالومات په موخه د رادیو لوژي یوه درمل پوه بدن ته د اکسریز انرژي ډوز په واکمنۍ لاندې یوځل μGy په ۱۱۱- شکل کې ښودل شوې ده. دغه وړانګې رادیولوژیست ته دیوه ناروغ اکسریز یوځل معاینه کولو او یا عکس اخیستلو په ترڅ کې رسیږي. دبیلګې په توګه د رادیو لوژیست لاسونو ته دوه سوه شپيته مایکرو ګري ($260 \mu\text{Gy}$) اوسرکوپړی ته لږ څه درې سوه مایکرو ګري اکسریز رسیږي ($300 \mu\text{Gy}$).

دیوه ناروغ دسې یوه اکسریز عکس په اخیستلو سره یوملي سیورت (1m Sv)، دپښتورګي اکسریز عکس په اخیستلو تر ډیرشو ملي سیورت (30 mSv)، دسرکوپړی او د شمزۍ اکسریز عکس اخیستل تر څلویښتملي سیورت (40 mSv) پورې بدن ته وړانګې رسیږي.



۱۱۱- شکل: د شلمې پېړۍ په پيل کې ډاکسريز ناوړه اغيزو په پايله کې د راديولوژي خانګې ډيرو ډاکترانو خپل ژوند دلاسه ورکړ. دا ځکه چې د نوموړو وړانګو سره يې دځان ساتلو په تړاو بې پروايي کړې وه. د بېلګه په ډول په نوموړي عکس کې ډاکسريز وړانګې د ناروغۍ د پيژندلو په موخه د راديولوژي ډاکتر ته پخپله هم رسېږي. دا ځکه چې د راديولوژي ډاکتر د وړانګو د خطر څخه د ځان ژغورلو په موخه د سرپوښ فلزي بالاپوش (Pb-Mantle) څخه کار نه دی اخيستی. په کيڼ اړخ عکس کې د راديولوژي درمل پوه بدن ته د ناروغ يوې معاینې په ترڅ کې وررسېدلې اکسريز وړانګې په واحد د مايکروګري μGy بنودل شوي دي. (26)

👉 **پايله:** د پاس ياد شوو شميرنواو بېلګو په پايله کې نن ورځ په نړۍ واله کچه د کار پوهانو تر منځ منل شوې ده، چې ايونايډ کونکې وړانګې که په لوړه او که په ټيټه کچه وي د بدن لپاره ناوړه اغيزې لري. داځکه چې دنوموړو وړانګو اغيزې ستوخاستيک يانې تصادفي پېښې دي اومخ تر مخه يې اټکل نه شي کيدای. د بېلګه په ډول لکه د سرطان ناروغي، د حجرو موتیشن او د بدن د دفاع سيستم کمزورتيا اونور. نوله دې کبله دنوموړو وړانګو د خطر څخه د او سيدونکو او چاپيريال خوندي ساتل د پام څخه وه نه ايستل شي. دنړيوال روغتيا سازمان (WHO) اوداتومي انرژۍ سازمان (IAEA) له خوا په يوه نوې تيوري باندې پريکړه شوې ده چې د هغې په بنسټ د يوې خوا روغتيا ته د ايونايډ کونکو وړانګو د ناوړه اغيزو اټکل مخ وينه تر سره کيږي، اود بلې خوا دنوموړو وړانګو څخه دځان ژغورنې کړنلارې بنودل شوې دي. دغه تيوري د سرحد يا لېمېټ نه لرونکې (Linear Non Threshold Theory = LNT) تيوري په نامه سره ياديږي.



په ۱۱۲ شکل کې دټیټې کچې انرژي ډوزیا نې د صفر نه تر دوه سوه ملي سیورت پورې د ریاضي خومهم موډلونه بنودل شوي دي چې دسرطان ناروغۍ دمنځ ته راتلواحتمال اټکل کوي.

لومړې: سم سیخ لیمیت نه لرونکی تیوري:

(Linear non Threshold Theory = LNT)

د سرحد یا لیمیت نه لرونکې رادیوبیولوژیکي تیوري (Linear non threshold theory= LNT) په ډاگه کوي، چې دورانگو دخطر احتمال که په ټیټه اوکه په لوړه کچه وي شته دی او همدارنگه دهغوي د خطر ضریب دیوه اوبل سره سم سیخ تړاو لري. د بېلگه په ډول نوموړې تیوري دا په گوته کوي چې د تجربو په بنسټ د لوړې کچې وړانگې ($>200 \text{ mSv}$) د خطر ضریب پینځه په سل پر یو سیورت ($0,05/\text{Sv} = 5 \times 10^{-2}/\text{Sv}$) اټکل شوی دی نو همدارنگه نوموړی ضریب د ټیټې کچې وړانگو (<200) لپاره هم د باور او د منلو وړ دی.

نوکه و منو چې د سلوتوڅخه پینځه تنه د سرطان په ناروغۍ اخته کېږي که چیرته دیوې سیمې خلکو ته یوزر ملي سیورت وړانگې ورسېږي. نو پوښتنه دلته داده چې که لس زره تنه په لس ملي سیورت رڼا شي نو بیا به هم پینځه تنه په سلو کې د سرطان په ناروغۍ اخته شي؟

که دورانگو یوه ځانگړې ذره د ډي این اې. (DNA) په یوه مالیکول او د بدن یوې حجرې په هسته ولگېږي، نو ددې احتمال شته دي چې همدا یوه ذره هم د سرطان ناروغۍ د منځ ته راوستلو سبب(لامل) وگرزي. نو داسې ما نا لري چې دسرطان ناروغۍ د منځ ته راتلو احتمال په نوموړي مالیکول باندې د لگیدلوالفا ذرود شمیر سره سم سیخ متنا سب ده. دا په دې مانا چې خومره ډیرې ذرې د ډي این اې. (DNA) په مالیکول ولگېږي نو په همغه کچه یې د زیان احتمال هم زیاتېږي او دهغې سره سم نوموړې کرنلاره دورانگو انرژي ډوز سره سم سیخ تړاو لري.


که چیرته د وړانگو انرژي ډوز په (D) او دهغوي په واسطه راپارول شوې سرطان ناروغي په (y) سره وښیو نو د سرحد یا لیمیت نه لرونکې تیوري معادله په لاندې ډول لیکلای شو.

$$Y = a \times D$$

(Linear non Threshold Theory)

په پاسنۍ معادله کې د اې توری (a) یوه ثابت ده او د وړانگو موتیشن اغیزې سره تړاو لري.

نوموړې تیوري دا په گوته کوي چې دسرطان ناروغۍ دخطر اټکل د معادل ډوز سره یو خطي یانې سم سیخ اړیکې لري او د معادل ډوز هیڅ ټیټه کچه نه شته چې دهغې نه ښکته دهستوي وړانگوناوره اغیزې د پام نه وه ایستل شي .



دا په دې مانا چې که هستوي وړانګې په ډیره ټیټه کچه هم وي د بېلګه په ډول دوه میلی سیورټ چې د طبیعي وړانګو سره برابر قیمت لري دسرطان ناروغۍ د منځ ته راتللو سبب (لامل) کېدای شي. اود وړانګو یو ملي سیورټ دوز د یوه کال په موده کې د بدن په هره یوه حجره (ژونکه) کې یو موتیشن راولي چې بیا بیرته جوړیږي. ددغې تیوري په بنسټ داسې احتمال شته دی چې حتی دالفار وړانګې یوه ذره هم کولای شي چې په یوه حجره (ژونکه) کې دسرطان ناروغۍ منځ ته راولي. همدغه یوه سرطاني حجره (ژونکه) بس ده چې دډیرویشني او نه کنترول کېدونکي کړنلارې په مرسته سره دسرطان ناروغۍ سبب (لامل) وګرځي. دپام وړ خو داده چې د یورانیم یو ګرام سرګولی څخه په یوه دقیقه کې دالفا لږڅه سل ذرې خپریږي.

دویم : سم سیخ مربع تیوري: (Linear Quadratic Theory)

په نوموړې تیوري کې دورانګو انرژي دوز (D) او د هغوي د ناوړو اغیزو (y) تر منځ داسې اړیکې موجودې دي چې یوه برخه یې سم سیخ او بله برخه یې مربع ترم (Therm) یا غړی جوړوي.



$$Y = \alpha D + \beta D^2 \quad (\text{Linear Quadratic Model})$$

په پورتنۍ معادله کې د بیتا β او الفا α توري دوه ثابتې دي چې په خپل وار سره په کروموزومو کې د وړانګو موتیشن اغیزه او د ډي این ای غبرګ سټرانګ Strang یو او یا دواړو تارونو پرې کیدل په پام کې نیسي.

دریم : دورانګو ګټور هورمېزیس موډل (Biopositive Model)

نوموړې موډل په ډاګه کوي چې دورانګود ټیټې کچې انرژي دوز د روغتیا لپاره دزیان پر ځای ګټه رسوي. دا ځکه چې د بدن دفاع سیستم د پخوا په پرتله فعال کوي او د ډیرکار کولوخوا ته یې هڅوي. همدا سبب (لامل) دې چې دنوموړي موډل ډګراف لومړۍ برخه منفي قیمت لري او دا په دې مانا چې ناوړه اغیزې کمښت مومي. ډګراف دغه برخه د هورمېزیس (Hormesis) په نامه سره یادېږي او په دې مانا چې په ټیټه کچه وړانګې لکه د یو ګرې په شاوخوا کې د ناروغۍ په تړاوداند ښیني وړ نه دي بلکه مثبت بیولوژیکي اغیزې لري.

$$Y = \alpha \times D - \beta \times D^{-0.24} \quad (\text{Biopositive Model with Hormesis})$$



۱۱۲- شکل: درياضي څوډوله تيوري موډلونه چي دسرطان ناروغۍ د منځ ته راتلود خطراتکل کوي. په عمودي محورکي دورانگو ناوړه اغيزو احتمال اوپه افقي محور کي دانرژي ډوز چي قيمت يي تر دري گري Gy پوري رسيري رابښي(7).


دپاس نه ښکتي خواته منځني عبارت دی له:

(کونویکس منځني، سم سیخ لیمیت نه لرونکی منځني، سم سیخ مربع منځني، هورمزيس گټورمنځني، لیمیت لرونکي منځني).

دافقي محورپه اوږدو کي موازي کښل شوې کرښي دسرطان ناروغۍ هغه کچه ده چي د طبيعي وړانگودناوړه اغيزو لکه موتیشن په پایله کي او يا دنورونا څرگنده علتونو له کبله يوه ناڅاپه منځ ته راځي او راپارول (Spontaneous mutation) کيري (6).


بایسټېډ راغیزه (Bystander effect)

اوسنئ بيخي نوښت او دباور وړڅيړنو او تجربو په ډاگه کړه (61;62;63) چي د وړانگوانرژي او د هغوي د بیا لوی کي اغيزو ترمنځ (د سرحد يا لیمیت نه لرونکي رادیوبیولوژيکي موډل LNT) چي د سپکو ذرولکه فوتون الکترون او د ټیټي کچي وړانگو (Low Level Radiation) لپاره په کارول کيري د درندو ذرو لکه الفا وړانگي، نیوترون او پروتون لپاره اعتبار نه لري. هغه نړیوال مسلکي پوهان چي نوموړئ موډل LNT تر ډېر ښتني لاندې راولي، او دالفا وړانگو لپاره او په ټیټه کچه وړانگي لکه د یورانیم وسلو وړانگي، طبيعي وړانگي او يا ټولې هغه وړانگي چي انرژي ډوز يي ددوه سوه ملي سیورت نه دلاندې وي، په یوه نوی تيوري ټینگار کوي، چي د **بایسټېډ راغیزه** په نامه سره یادیږي






بایستېد راغیزه Bystander effect په ډاگه کوي چې که درندې ذرې لکه دالفا وړانگې د بدن نسجونو څخه تیریږي، نو په دې ترڅ کې نه یوازې په هغو حجرو کې چې دخپلې لارې په اوږدو کې ور سره سم سیخ غبرگون کوي موتیشن منځ ته راولي، بلکې په نورو شاوخوا گاونډیو حجرو کې چې نوموړې وړانگې ورسره بیخي نه لگيږي، هم زیان رسوي، او په هغوی کې بدلون منځ ته راولي(64). دنوموړي اغیزې پوهیدل په دې ډول تر سره کیږي چې په هغه حجره(ژونکه) کې چې دالفا وړانگې ورته رسیږي یو ډول پروتین ازاډکوي چې د (Cytokines) په نامه سره یادیږي. نوموړي پروتین یو ډول بیا لوژیکی فکتورونه دي چې بیو کیمیاوي زیغنالونه د نوموړو حجرو تړون برخه کې یا د تماس په چاک کې (Gape junction) گاونډیو حجرو ته استوي او د وړانگودناورو اغیزو څخه یې خبروي. بایستېندراغیزه د وړانگويو بیخي نوی ډول زیان په ډاگه کوي چې په دې اړین کې نه پېښیږي بلکې دیوې حجرې څخه وېلې حجرې ته د خبریدلو په بنسټ (Cell to cell communication) منځ ته راځي. په گاونډیو حجرو کې چې وړانگې ورته نه وي رسیدلې دبایستند ر ناوړه اغیزې په لاندې ډول دي. لکه په کروموزومو کې بدلون، موتیشن، دحجرې ځان وژنه، دسرطان په ناروغه حجره(ژونکه) بدلیل اونور.

په ۱۱۳- شکل کې د وړانگو دبایستند راغیزه ښودل شوې ده.




۱۱۳- شکل: د وړانگوبایستېندراغیزه Bystander effect د الفا یوې ذرې لپاره ښودل شوې ده. دالفا یوه ذره د بدن په یوه غړي لگيږي او په هغه ځای کې دنسجونو یوې حجرې ته چې په ای توري A ښوول شوې ده، انرژي ډوز رسوي. په دې ترڅ کې نورو گاونډیو حجرو ته لکه بي B ، سي C، او دي D ته هم زیان رسیږي، په داسې حال کې چې وروستیو حجرو ته هیڅ وړانگې هم رسیدل نه دي.



۱۱۴- شکل: په دغه شکل کې د بدن په حجرو کې دورانگو انرژي پوز اود هغوي داغيزي تر منځ اړيکي (Dose-effect relationship) دپخوانيوکلاسيکي مودلونو (Classical direct effect) او اوسني بيخي نوي بايستندراغيزي لپاره بنودل (Bystander effect) شوي دي. په ټيټه کچه وړانگي لکه دغريب شوي يورانيم وړانگي، ديورانيم دکان وړانگي، طبيعي وړانگي او دهستوي بټي څخه چاپيريال ته وړانگي د بايستندراغيزي يو وتلي بېلگه ده. په يوه کلاسيکي مودل کې کله چې دورانگو کچه پوره لوړ قيمت ولري، نودورانگو سم سيخ اغيزه تر ازمويښي لاندې سامپل حجروشمير (Cell population) ټولو رڼا شوو حجروته زيان رسوي. په داسې حال کې چې په ټيټه کچه وړانگي يانې د منځني د پيل په برخه کې د بايستندراغيزه هغه وخت منځ ته راځي کله چې د سامپل حجروشمير يوه کوچنۍ برخه رڼا شي خو زيان يې پاتې نورو حجرو ته چې رڼا شوې نه دي هم ورسېږي. د سامپل حجروشمير يوه تر ډېرش په سل پورې هغه برخه حجري تشکيلوي چې هغوي ته وړانگي نه دي رسېدلې، خو بيا هم زيانمنې شوې دي. پورتنۍ شکل په ډاگه کوي چې د ټيټې انرژي په برخه کې ديوې ټاکلې انرژي ډوز ليميت څخه پورته د بايستندراغيزه نوره دانرژي ډوز دزياتوالي سره سم سيخ نه ډيرېږي بلکه يو ثابت قيمت ځانته غوره کوي (63).


دبيلگې په ډول لکه څرنگه چې دالفا وړانگومايکرو بيم Microbeam irradiation تجربو وښودله چې که ديو مليون حجروڅخه پينځه په سلو کې، لس په سلو کې او شل په سلو کې ديوې ځانگړې الفا ذرې په واسطه رڼا شي نو دورانگو ناوړه اغيزې لکه موتيشن په خطي ډول نه زياتېږي بلکه په هسک متناسب (super proportional) ډول سره پورته ځي چې قيمتونه يې د ۱۱۴ شکل دمحورونود پيل په برخه کې اوپه خپل وار سره دوولس ځله، نهه ځله او څلور ځله ټاکل شوي دي. يو بل مهم مالومات چې په دې اړوند تر لاسه شوي دي په ډاگه کوي چې د يو مليون رڼا شوو حجروپه راتلونکو دولسونسلونو کې هيڅ ډول بدلون او موتيشن نه ليدل کېږي بلکه دحجرو دڅوارلسم اويا پينځلسم نسل څخه وروسته د بايستندراغيزه پيل کېږي او موتيشن منځ ته راځي.




پایله : د بایستېډراغیزه په ډاگه کوي چې دا سمه نه ده چې د لور انرژي ډوز او اغیزې منځني کوم چې په جاپان باندې د اټوم بم دکارولو په کلاسیک موډل کې تر لاسه شويدي، سم سیخ صفر ته وزغوو (Extrapolation). داځکه چې دورانگو لور انرژي ډوز ($> 1\text{Gy}$) د **خطر ضریب (risk coefficient)** د ټیټې کچې انرژي ډوز $< 0,2\text{Gy}$ د خطر ضریب سره یوشان نه دی. د بېلگې په ډول که دیوملیون حجرو څخه پینځه په سلوکې دالفا ذرې په واسطه رناشي نودخطر ضریب یې دسم سیخ صفرخواته زغول شوي کلاسیک پخواني موډل منځني په پرتله لږ څه دوولس واره لور قیمت لري.

دخطر ټاکلوموډلونه (Risk assessment Modells)

دورانگو دخطر ټاکلو په موخه نن ورځ په نړیواله کچه درياضي دوه نامتوموډلونه په کارول کيږي چې لومړی یې دورانگو دخطر نسبي موډل او دویم یې دورانگو دخطر مطلق موډل په نامه سره یاديږي. په ۱۱۵ شکل کې دنوموړو موډلونو بڼه د وینې سرطان (Leukaemia) او د سرطان پاتې نورو ډولونو لپاره ښودل شوی دی.



۱۱۵- شکل: دورانگو دخطر نسبي او مطلق ریاضي موډلونه دویني سرطان (Leukaemia) او دسرطان هر اړخیزه نورو ناروغیو لپاره ښودل شوي دي (18).



دورانگو دخطر نسبي مودل (Relative Risk Modell)

دورانگو دخطر نسبي مودل دويني سرطان او دهېوکو سرطان څخه پرته د نورو سرطاني ناروغيو د خطر ټاکلو په موخه کارول کېږي. په نوموړي مودل کې درنا شوو وگړو د ناروغيو د ډير بڼت او زياتوالي کچه دهغو وگړو په پرتله چې وړانگې ورته رسيدلي نه وي راښيي.


کله چې ديوه چاپيريال اوسيدونکو ته ايونايږ کونکې وړانگې وه نه رسېږي خو سره دهغې هم په خلکو کې د ناڅرگنده علت څخه د وينې سرطان او د سرطان نورې ناروغي منځ ته راشي، نو په رياضي مودلونو کې د نوموړو طبيعي او په خپل سر (Spontaneous) ناروغيو شميرته نسبي خطر مودل ويل کېږي. داسانتيا لپاره يې دخطر کچه يا قيمت مساوي په يو يانې سل په سل کې تعريف کوي ($Relative Risk = 1$). نودسرطان هغه ناروغي چې يوازي دورانگو دزيان سره تړاو لري د سرطان هغو ناروغيو سره چې په طبيعي ډول منځ ته راځي (Baseline cancer) دسل په سل نه پورته شمير ل کېږي او داضافه ناروغيو اويا زياتي ناروغي نوم ورکول کېږي.

په جاپان باندې داتوم بم دچاودنې څخه وروسته اپيدېمولوجي Epidemiology احساو په ډاگه کړه چې هغو کسانو ته چې ژوندي پاتې شوه، او څلور گري (4 Gy) وړانگې ورته رسيدلي وې، په هغوې کې د وينې سرطان کچه د ۱۹۴۵م کال څخه د مخه په پرتله پينځه لس واره پورته ولاړه شوه. دسرطان ناروغانو دغه اضافگي شمير چې دورانگو سره تړاو لري اوپه طبيعي ډول د سرطان دپيښيدلو شمير څخه تيرئ کوي د زياتي نسبي خطر په نامه سره يادېږي.

دورانگو دخطر مطلق مودل (Absolute Risk Modell)

دويني سرطان اود هېوکو سرطان دخطر ټاکلو په موخه دنوموړي مودل څخه کار اخيستل کېږي. دورانگو دخطر مطلق مودل کې کارپوهان دامنې چې تر يوه ټاکلي وخت پورې (Latency time) دناروغيو دډير بڼت اندازه د تصادفي اوپه خپل سر (Spontaneous) ناروغيو په پرتله پورته ځي، خو بيا وروسته د نوموړي مودې څخه زياتي نورې ناروغي منځ ته نه راځي چې دورانگو دنورو اغيزې سره تړاو ولري.

➤ (Latency time): نوموړې وخت هغې مودې ته وايي چې که څه هم بدن په وړانگورنا شوی وي، خو کومې کلينيکي ناوړه اغيزې اويا کلينيکي نښې (Symptoms) يې نه ښکاري. په بل عبارت نوموړې هغه وخت دی چې يوه اورگانيزم ته د وړانگو په رسيدو سره پيل کېږي او تر هغې مودې پورې پايښت کوي، تر څو په کلينيکي اړوند د ناروغي ښکاره نښې را څرگندي شي.




د روغتيا په تړاو د يورانيم وسلو د خطر كچې اټكل

دلته اوس داپوښتنه پيدا كيږي چې دپاس يادشووشپږو شميرنوپه بنسټ تر لاسه شوي رياضي مودلونه او معادلې تر كومې اندازې پورې د يورانيم وسلود خطراتكل په رښتوني توگه بيان كولاې شي او هم كوم پارامتر يا ټكې دهغوي څخه بل ډول او توپير لري.


لومړي: د يورانيم په وسلوكي د معادل انرژي ډوز كچه دهغې انرژي ډوز په پرتله چې په ياد شوو رياضي مودلونو كې كارول شوې ده ډيره ټيټه ده اودلر څه لسوملي سيورت په شاوخوا كې اټكل كيږي.

دويم: په يادشوو دوو هستوي چاودنو كې چې په جاپان او په پخوانۍ روسيه كې پيښې شوې دي خلكو ته دگاما وړانگې اونويټرون وړانگې رسيدلي دي، په داسې حال كې چې د يورانيم وسلې څخه په لومړۍ وخت كې دالفا وړانگې خپريږي. يورانيم د يو كال څخه وروسته په نورو عناصرو تجزيه كيږي چې په دې ترڅ كې دالفا وړانگو په څنگ كې دبيتا او گاما وړانگې هم خلكو ته رسيږي. تجربو ښودلي ده چې د بدن حجروته د الفا وړانگود زيان كچه د گاما اوبيتا وړانگو په پرتله شل واړه زياته ده. دنوموړو وړانگو توپير لرونكې اغيزې په ۱۱۶ شكل كې ښودل شوې دي. همدا سبب (لامل) دې چې ديورا نيم وسلې څخه د الفا وړانگود خطر احتمال خلكو ته ډير د انديښنې وړ گڼل كيږي.



۱۱۶- شكل: د شي اړخ نسجونه په الفا وړانگواو كيني اړخ همدغه نسجونه په بېټا وړانگورنا شوېدي. په داسې حال كې چې د دواړو وړانگو انرژي ډوز سره يوشان يانې دوه گري (2 Gy) قيمت لري خو دالفا وړانگو بېالوژيكي زيان د بيتا وړانگوپه پرتله شل ځله زيات ښكاري. په نوموړي شكل كې نيمگري حجرې په شين رنگ او روغۍ يانې سالمې حجرې په زير رنگ سره ښودل شوېدي (31).

دريم: د يورانيم وسلې په افغانستان كې د ډيري اوږدې مودې راهيسې، يانې لږ څه ۲۵ كاله راپدې خوا كارول كيږي، او له دې كبله د وخت په تيريدلو سره سم چاپيريال په همغه كچه ډير او پرلپسې توگه په راډيو ايزوتوپ ككړكيږي. دراديو بېالوژي پوهانو له نظره دا په دې ما نا چې د بدن حجرې ۲۵ كاله پرلپسې او پايښت لرونكي ډول دالفا وړانگو تر اغيزې اورنا لاندې **قرار لري (پريوخي)** اود هغوي د



بیرته جوړوونکی انزایم لپاره ډیر کم وخت پاتې کیږي، ترڅو دالفا وړانگو داغیزې په پایله کې د ټپي شوو کروموزومو نیمګړتیا بیرته له منځه یوسي.



د رادیوبیولوژیکي څیړنوپه اساس تجربوونښودله چې نوموړو انزایم ته لږ تر لږه شپږ ساعته وخت په کار دی، تر څو وکولای شي زیانمن شوي حجرې بیرته جوړې کړي، خو په دې شرط چې په دغه موده کې نورې وړانګې ورته وه نه رسیږي.

څلورم: څرنګه چې دیورانیم وسلو رادیواکتیو مواد دفلازاتو په ډله کې په لمړۍ درجه زهرجن دي، نو کله چې د نوموړو وسلود یوې خوا دورانګو پرلپسې زړر، اود بلې خوا دنوموړو وسلو زهرجنې اغیزې دواړه سره یوځای او په ګډه سره د بدن په حجرو اغیزې واچوي، نودپاس یادشوي تیوري په اساس، دیوې خوا د سرطان د ناروغۍ د منځ ته راتلواحتمال کچه سم سیخ پورته ځي، او دبلې خوا د نورو نارو غیو، لکه د پزې حساسیت یا الرګي، ذکام، ټوخیدل، داندامونودرد او نور هم ورسره زیاتیږي. که څه هم دیورانیم وسلوپه کارولو سره دالفا وړانګو انرژي ډوز، دپاس یاد شوو دریوهستوي پیښوپه پرتله خورالږ اود څو میلی سیورت څخه نه اوړي، خوکه دبېلګه په ډول دلته دمقایسې په موخه د نوموړي موډل په بنسټ محاسبه وکړو نویوازي طبیعي وړانګو ډیره کمه کچه انرژي ډوز یانې دوه میلی سیورت کلنۍ قیمت دنورو زهرجنوکیماوي موادوسره یوځای په یوه ورځ کې د بدن په تقریبا پنځوس زړوحجروکې، د اسي بدلون یا موتیشن راولي، چې که د بیرته جوړوونکي انزایم (DNA-Polymerase) اوپه وینه کې د مخصوصوحجرو له خوا سل په سلو کې بیرته دغه نیمګړتیا پوره نه شي، نو ددې زیات احتمال شته دي چې نوموړې زیانمنې حجرې زیاته برخه به دسرطان په ناروغوحجرو واوړي.

پینځم: دالارآ پرنسیپ (ALARA): په دې اړوند د ایونایز کوونکو وړانګو د خطر څخه دځان ساتلو نړیوال کمیسیون، چې لنډیز یې په (ICRP) سره کیږي، یوه نامتو سپارښتنه دا په ګوته کوي، چې باید بدن ته څومره چې امکان ولري دومره لږ وړانګې ورسیږي. دا په دې مانا چې که څه هم دروغتیا په تړاو دیورانیم وسلوایونایز کوونکو وړانګو، هستوي آزموینو اودناروغیو په پیداکولو کې دورانګو ناوړه اغیزې په ټیټه اندازه هم ښکاري، خوبیا هم ضرور ده چې تر وسه یې کچه راښکته اویا بیخي مخ نیوئ وشي. دبېلګه په ډول دافغانستان په شاوخوا هیوادونو لکه چین، هندوستان، کازاخستان، پاکستان (لرافغانستان) او ایران کې داتومي وسلو پروګرامونه مخ په وړاندې روان دي او ځینې یې هستوي آزمویني تر سره کوي. په تیره بیا د پاکستان (لر افغانستان) هستوي آزمویني چې د ۱۹۹۸ م کال څخه راپدې خوا د دیورند مصنوعي کربنې څخه پنځوس کیلومتره واټن کې ترسره کیږي دافغانستان چاپیریال په رادیو اکتیو وړانګوککړ کوي او له دې کبله ددې سیمې او سیدونکو روغتیا یې د خطر او اندیښنوسره مخامخ کړیده.

د ایونایز کوونکو وړانګو د خطر څخه دځان ساتلو نړیوال کمیسیون (ICRP) دسرطان ناروغۍ د مخ وینې په هکله دریاضي هراړخیزاحسایوي موډلونه محاسبه کړي دي. دنوموړو موډلونودپایلو بنسټ د هستوي پیښواو یا لکه په جاپان باندې داتوم بم څخه ژوندي پاتې شوواو دسرطان په ناروغۍ مړه شوو کسانوپه اپیدمیولوجي (Epidemiology) شمیرنه باندې ولاړدي.


په ۱۱۷ شکل کې نوموړي کمیسیون دسرطان ناروغۍ د منځ ته راتلودزیان احتمال ضریب د ټیټي کچې انرژي برخې لپاره پینځه په سل تقسیم په یو سیورت ($0,05 \text{ Sv}^{-1}$) ټا کلی دی.



۱۱۷- شکل: دسرطان ناروغی کثرت (پیرسنت) او دورانگوانرژي کلنی پوزتر منځ اړیکي د یوه سم سیخ او سرحد نه لرونکي تیوري (Linear non threshold theory = LNT) له مخې شودل شوې دي. په افقي محور باندې انرژي پوزیه واحد سیورت اویوه کال، او په عمودي محور کې د سرطان ناروغی پرلپسې والی (کثرت) ښودل شوی، چې په یوه ملیون وگړو اویوه کال کې پیدا کیږي. د شکل پیل برخه یانې یو ملي سیورت (10^{-3} Sv) د ناروغیو شمیر دوه په یو ملیون وگړو کې اټکل کیږي. د طبیعي وړانگو په کچه پوز د سرطان ناروغیو کثرت په یوه کال او په یو ملیون وگړو کې لږ څه شل تنه رابښي. په نوموړو ناروغیو کې هغه کسان هم شامل دي، چې بې له وړانگو څخه یوه ناڅاپه اودنا څرگنده علت د سرطان په ناروغی اخته کیږي. دیوه سیورت نه تر لس سیورت پورې (د شکل اخیستی برخه) هغه شمیر ناروغی دي، چې په حیواناتو باندې د تجربوله مخې او پایه جاپان باندې داتوم بم څخه په ژونديو پاتې شویو کسانو کې پیدا شوې دي. د بېلگه په ډول په جاپان باندې داتوم بم په چاودلو کې که یوه ملیون وگړو ته یو سیورت وړانگې وررسېدلې وي نو دهغوې څخه لږ څه دوه زره کسان په یوه کال کې دسرطان په یوه ناروغی باندې اخته شول (7).


* تورتکي دتجربونتيجه، او عمودي کرښې دغلطی (ناسمی) لیمیت، اوپری شوې کرښې د سم سیخ او سرحد نه لرونکي تیوري LNT منحنی، دلوري کچې پوزخه تر صفره پوري سم سیخ غزیدل شوي کرښه رابښي (Extrapolation).

په ۱۱۸ شکل کې د سم سیخ او لېمېټ نه لرونکي تیوري گراف مشتق یانې tangent ښودل شوی دی چې د سرطان اضافي ناروغیو احتمال Δp او دورانگودپوز ΔD توپیر د حاصل تقسیم څخه تر لاسه کیږي.



$$Y = \tan \alpha = \Delta p / \Delta D = 0,005\%/mSv$$

د نوموړي منحنی میل (Inclination) یا نې تانگینټ مساوي دې له: $0,005\%/mSv$ دا په دې مانا چې که د یوې سیمې چاپیریال دومره په رادیو اکتیو موادو ککړوي، چې هلته سل ذره کسان ژوند کوي او هر یوه تن ته یو ملي سیورت وړانګې ورسېږي، نو د دغو سلو زرو څخه به یوازې پینځه تنه د رادیو اکتیف وړانګو د خطر په اساس د سرطان په ناروغۍ اخته شي.



۱۱۸- شکل: په عمودي محور کې د سرطان ناروغۍ احتمال (Probability of cancer) او په افقي محوري کې د وړانګو کلنې انرژي ډوز D په واحد د ملي سیورت بنودل شوی دی. (27)


لکه چې د ۱۱۸ شکل څخه څرګندېږي چې دوه نیم ملي سیورت څخه رابنګته برخه کې شمېرنه د باور وړ نه ده. دا ځکه چې دغه برخه د طبیعي وړانګو سره برابره ده. د سرطان ناروغۍ پینځه ویشته په سل کې د طبیعي وړانګو څخه منځ ته راځي.

کولیکتیو یا ډله ایز ډوز (Collective dose)

کله چې په یوه چاپیریال کې وړانګې خپرې شي، نو دهغې سیمې اوسیدونکو ته په توپیر سره وړانګې رسېږي. د وړانګو د خطر شمېرنې او اټکل په موخه ددې اړتیا لیدل کېږي، چې دغه او سیدونکي په څو ګروپونو او یا ډلو ویشل شي. هغه فزیکي کمیت چې د نوموړې شمېرنې لپاره ګټور دی د کولیکتیو ډوز (ډله ایز ډوز) په نامه سره یادېږي.

☞ کولیکتیو یا ډله ایز ډوز عبارت دی له مجموعه د حاصل ضرب د وړانګو منځني انرژي ډوز او د هغو ګروپونو شمېر چې توپیر لرونکي ډله خلک په رڼا شوي وي.

☞ د کولیکتیو ډوز واحد (یو تن ضرب د سیورت) او یا (man-sievert) سره بنودل کېږي.



* **پوښتنه:** د امریکا سرشمیرنه لږ څه دوه سوه څلورنوي ملیونه ده. که چیرته هر یوه وگړي ته په یوه کال کې د هستوي آزمویښو له کبله یو ملی سیورت وړانگې ورسیري نود کولیکتیوډوز کچه یې څومره ده؟

* **ځواب:** $249 \times 10^6 \times 1 \text{mSv} =$

د دوز خطر ضریب (Dose risk coefficient)

که چیرته دیوې سیمې په زرگونو اوسیدونکو ته د بیلگي په ډول د یوې هستوي او یا نورورته پېښوله کبله یو سیورت 1 Sv وړانگې ورسیري او په پایله کې د هغوی څخه یوه برخه کسان د سرطان په ناروغۍ اخته شي، نودغه سلیز تناسب ته د دوز خطر ضریب f_{risk} ویل کیږي. دنوموړي فزیکي کمیت واحد دسرطان په ناروغۍ مړه شوو کسانو سلیزه برخه تقسیم په یوه سیورت ټاکل شوی دی. د بېلگه په ډول لکه دوه په زرمه برخه دسیورت ($f_{\text{risk}} = 2 \times 10^{-3} \text{ Sv}^{-1}$) دامانا لري چې که د یو زرکسانو ($N_{\text{population}}$) ټول بدن ته په یوشان یانې متجانس ډول او دیو سیورت ($D_{\text{dose}} = 1 \text{Sv}$) په اندازه وړانگې ورسیري، نو دیو زر کسانو څخه به دوه تنه د سرطان په ناروغۍ اخته شي. د بدن هر غړی لپاره د نړیوال کمیسیون (ICRP) له خوا دنوموړي ضریب په هکله ځانگړي قیمتونه د اوږدې څیړنې په پایله کې تل نوي خپریږي.

☢ د ۱۹۹۰ کال څخه راپدې خوا د نړیوال کمیسیون (ICRP) له خوا دورانگودوز خطر ضریب پینځه په سل په یوه سیورت ($0,05/\text{Sv} = 5\%/\text{Sv} = 5 \times 10^{-2} \text{Sv}$) ټاکل شوی دی. نو کله چې سل تنه په یوسیورت وړانگو رڼا شي نو دهغوي څخه به په ډیرا احتمال سره پینځه تنه دژوند په اوږدو کې د خطر له کبله مړه شي.

دلاندنۍ معادلې په مرسته سره کولای شو چې دیوه هیواد هغو وگړو شمیر N_{cancer} تر لاسه کړو چې هغوي ته وړانگې رسیدلې وي، او بیا د سرطان په ناروغۍ اخته او مړه شي. بر سیره په دې کولای شو چې په دې اړوند دورانگو ستوخاصتیک زیان اندازه مخ وینه او اټکل وکړو. په لاندې معادله کې دورانگو انرژي ډوز په واحد دسیورت D(Sv) او د خطر ضریب f_{risk} په واحد د سلیزه برخه په یو سیورت $\% \text{Sv}^{-1}$ کارول کیږي.


د سرطان په ناروغۍ اخته شوو مړو شمیر د لاندنې فرمول څخه تر لاسه کیږي.

د سرطان مړو شمیر = د دوز خطر ضریب × درنا شوو وگړو شمیر × اغیزمن ډوز

Cancer deaths = Effective Equivalent Dose × Dose risk coefficient × Exposed Population

$$N_{\text{cancer}} = D_{\text{dose}} \times f_{\text{risk}} \times N_{\text{population}}$$

په پورتنۍ معادله کې د (درنا شوو وگړو شمیر × د معادل ډوز اندازه) حاصل ضرب ته ډله ایز ډوز (Collective dose) هم ویل کیږي او واحد یې په (یوتن × سیورت = $\text{person} \times \text{Sivert}$) سره ښودل کیږي.



*** پوښتنه:** که چیرته دټول ژوند په موده کې د وړانگو ستوخاستیک وروستی خطر دجر مني هیواد وگړو لپاره تر څیرني لاندې و نیسو، اوومنو چې دچرنوبیل هستوي پيښی په ترڅ کې دیوې سیمې سل ذره وگړو (100 000 persons) ته د یوه سیورت په لسمه برخه یانې سل ملي سیورت (0,1 Sv = 100 mSv) وړانگې رسیدلې وي، نو داحسايې له مخې هغه احتمال چې وروسته له اوږدې مودې به په هغوي کې دطبیعي وړانگوڅخه پرته د سرطان اضافکې ناروغی منځ ته راشي او یوازې دورانگو سره تړاوولري مالوم کړی؟

*** حل:**

سل ذره وگړي × سل ملي سیورت × دخطر ضریب = دمر و شمیر

$$10^5 \times 10^{-1} \text{ Sv} \times 5 \times 10^{-2} \text{ Sv}^{-1} = 500$$

*** ځواب:** په سل ملي سیورت وړانگورنا شووسلو ذرو وگړو څخه به پینځه سوه تنه د سرطان په ناروغی مړه شي.

په ۴۱ جدول کې د بدن هر غړي لپاره دورانگو دوز خطر ضریب په واحد Sv / % بنودل شوی دی او که وغواړو چې دیوه ټاکلي غړي لپاره د بېلگه په ډول لکه دسېري سرطان له کبله د مړشوو کسانو شمیرمخ وینه وکړو، نودنوموړي جدول په کارولو سره د سېري د خطر ضریب، اونوموړي غړي ته ر سیدلې وړانگې دوزپه لاندنی معادله کې اچوو، نو لروچې:

دسېري سرطان مړو شمیر = د سېري خطر ضریب × درنا شوو وگړو شمیر × سېري ته د اغیزمن دوز اندازه


د بېلگه په ډول که سل ذره وگړي د یوه سیورت په لسمه برخه (0,1 Sv = 100 mSv) وړانگې رنا شي نو دهغوی څخه هغه کسان چې دسېري سرطان په ناروغی به دژوند په اوږدوکې مړه شي او د خطر ضریب یې ۴۱ جدول له مخې مساوي دی له: $(0,9 \times 10^{-2} \text{ Sv})$

سل ذره وگړي × سل ملي سیورت × دخطر ضریب = دمر و شمیر

$$10^5 \times 10^{-1} \text{ Sv} \times 0,9 \times 10^{-2} \text{ Sv}^{-1} = 90$$

یانې نوي 90 وگړي به د سل ذره رنا شوو کسانو څخه د سېري سرطان په ناروغی مړه شي.

که چیر ته په ۴۱ جدول کې دټولو غړو د خطر ضریب سره جمع کړونو قیمت یې پینځه په سل تقسیم په سیورت کيږي ((0,05/Sv = 5% /Sv)).



څرنگه چې د المان نفوس لږ څه اتيا مليونه وگړي تشکيلوي نو که هغوی هریوه ته د بيلگي په ډول لس ملي سيورت وړانگي $0,01\text{Sv} = 10^{-2}\text{Sv}$ ورسیري، نو دهغو کسانو شمیر چې د سرطان په ناروغۍ به په راتلونکي کوم وخت کې مړه شي په لاندې ډول تر لاسه کيږي.


اتيا مليونه وگړي $\times$ لس ملي سيورت $\times$ دخطر ضريب = دمر و شمیر

$$80 \times 10^6 \times 10^{-2} \text{ Sv} \times 5 \times 10^{-2} / \text{Sv} = 40\,000$$

* **ځواب:** دا په دې مانا چې د اتيا مليونو وگړو څخه به څلوېښت زره وگړي په راتلونکي وخت کې د سرطان په ناروغۍ مړه شي که هغوی په لس ملي سيورت رڼا شي.

دغړی نوم	دخطر ضريب ($10^{-2}/\text{Sv}$) = %/Sv	دعمر بايبل په کالو	د اټکل شوو سرطان ناروغانو اضافي شمیر
Bone marrow دهډوکو سره مازغه	0,52	15	52
Bone surface دهډوکو پوستکي	0,01	15	1
Breast سینه یا ټټر	0,8	18	80
Lung سږي	0,9	14	90
Oesophagus + stomach مړی او معده	2,24	12	224
Thyroid تایراید	0,17	15	17
د بدن ټول نور غړي	0,38	15	38
ټول (Total)	5,02	15	502

٤١ جدول: د وړانگو څخه دساتنې نړیوال کمیسیون (ICRP 1991) دڅېړونې په اساس دسرطان ناروغۍ دمنځ ته راتلوخطر ضريب (Cancer Risk coefficient) د هر غړي لپاره په واحد د سلمه په سيورت (%/Sv) بنودل شوی دی کله چې ټول بدن د وړانگو د یوه سيورت په لسمه برخه ($0,1 \text{ Sv}$) رڼا شي



دپورتني جدول څخه څرگنديږي چې که سل ذره وگړي (100 000 persons) د يوه سيورت په لسمه برخه (0,1 Sv) رڼا شي نو دهغوې څخه لږ څه پينځه سوه تنه د سرطان په ناروغۍ مړه کيږي.


که فرض کړو چې دافغانستان نفوس (سرشميرنه) په او سني وخت کې شل مليونه ومنو، او دجگړوپه ټوله موده کې د افغانستان هريوه وگړي ته ديورانيم هر اړ خيزه وسلو وړانگود خپريدلو په پايله کې لس ملي سيورت اغيزمن دوزور رسېدلي وي ($10 \text{ mSv} = 0,01 \text{ Sv}$) او دسرطان ناروغۍ دخطر ضريب د وړانگو څخه دساتني نړيوال کميسيون په سپارښتنه (ICRP) پينځه په سلو کې د يوه سيورت ($0,05 \text{ Sv}^{-1}$) لپاره ومنل شي نو دهغو وگړو شمير چې د سرطان په ناروغۍ به په راتلونکي وخت کې مړه شي په لاندې ډول لاس ته راځي.

شل مليون وگړي × لس ملي سيورت × دخطر ضريب = دمړو شمير
$20 \times 10^6 \times 10^{-2} \text{ Sv} \times 5 \times 10^{-2} \text{ Sv} = 10 \text{ 000}$

دپورتني شميرني په اساس داسې اټکل کيږي چې دشل مليونوافغانانوڅخه به په راتلونکي وخت کې لس ذره تنه د سرطان په ناروغۍ اخته اويا مړه شي.

د نړيوال کميسيون نوم	د وينې سرطان اضافه وگړو شمير	د ټولنوروهر ډول سرطان ناروغانو اضافي شمير
UNSCEAR 1988	100	600 - 1000
ICRP 1991	100	800
BEIR 1990	100	900

۴۲- جدول: په نوموړي جدول کې د دريو نامتواومتل شوو نړيوال کميسيونواحسا په شودل شوي ده، چې د رياضي مودلونو په اساس يې د سرطان ناروغۍ په هکله خپره کړې. د بېلگه په ډول کله چې لس ذره تنه (10 000 persons) دورانگو په يوگړي انرژي ډوز (1 Gy) رڼا شي، نو داضافه اخته شووکسانو شمير د هغوسرطان ناروغيو په پرتله، چې په طبيعي ډول منځ ته راځي، دوينې سرطان لپاره سل تنه اودنوروسرطان ناروغيولپاره د يو زرکسانو څخه هم اوړي .



په درمل پوهنه (طبابت) کې دایونایزکونکو وړانگو دخطر اټکل


نن ورځ ددرمل پوهنې په هر اړخیزو څانگو لکه رادیوتېراپي Radiation Therapy، رادیولوژي Radiology او دهستوي طب Nuclear Medicine کې دایونایزکونکو وړانگو څخه دناړو غیو په پیژندنه او درملنه کې په پراخه توګه ګټه اخیستل کیږي. څرنګه چې نوموړې وړانګې دناړو غانو لپاره دیوې خوا ګټورې دي خو دبلې خوا د ګټې په څنګ کې دروغتیا په تړاو خطر هم لري. دېبلګه په ډول لکه چې دالمان په هیواد کې دتمدن سره سم د درمل پوهنې په نوموړو څانګو کې دایونایزکونکو وړانګو دانرژي ډوز اندازه د اکسریز یوه عکس اخیستلو په موخه لږ څه $(1,2 \text{ mSv})$ ، په هستوي طب کې درادیواکتیو موادو څخه د ناړو غیو پیژندنې په موخه لږ څه $(0,2 \text{ mSv})$ ته رسیږي. د وړانګو نه دځان ساتنې نړیوال کمیسیون ICRP له خوا په وروستي وخت کې د وړانګو په تړاو دخطر ضریب یوځل بیا نوی ټاکل شوی دی، چې قیمت یې پینځه په سل په یوسیورت دی $(0,05/\text{Sv})$. نن ورځ دنوموړي قیمت په کارولو سره کولای شو چې د اکسریز په اړوند دټول عمر لپاره دسرطان ناروغۍ دخطر دمنځ ته راتلو اټکل په لاندې ډول تر سره کړو..

د اکسریز عکس د خطر په تړاو دسرطان ناروغۍ اټکل

څرنګه چې دالمان هیواد سر شمیرنه (نفوس) اتیا ملیونه دي او که فرض کړو چې په یوه کال کې هریوه تن ته د $(1,2 \text{ mSv})$ په اندازه اکسریز ورسیري، نو دسرطان ناروغۍ د منځ ته راتلو له کبله دمر و شمیر په لاندې ډول تر لاسه کولای شو.

د ټول عمر لپاره دخطر ضریب $\times$ دخلکو نفوس $\times$ د وړانګو اندازه = د سرطان ناروغانو شمیر
$(1,2 \times 10^{-3} \text{ Sv}) \times (80\,000\,000) \times (0,05/\text{Sv}) = 4800$
پایله: په یوه کال کې څلورده اته سوه عام وګړي په المان کې داکسریز د ناوړه اغیزو له کبله دسرطان په ناروغۍ مړه کیږي.

د بلې خوا دالمان په هیواد کې دوه سوه شل زره $(220\,000)$ وګړي، بې له دې چې وړانګې ورته رسیدلي وي، دنور ونا څرګندو علتونو له کبله په یوه کال کې د سرطان په ناروغۍ مړه کیږي. دا په دې مانا چې د اکسریز وړانګو دخطر د نوموړي ناڅرګنده سرطان په پرتله لږ څه دوه په سل دی $(4800/220000 = 0,022 = 2,2 \%)$.



دسرطان خطر څخه ديوه تن مړه کيدل	اغيزمن انرژي ډوز په واحد سيورت Sv	د بدن يوه غړي ډاکسريز عکس اخيستل
$1,3 \times 10^{-6}$	$3,2 \times 10^{-5}$	سینه
6×10^{-6}	15×10^{-5}	شمزۍ يا ستون فقرات
2×10^{-5}	$5,4 \times 10^{-4}$	دمعدې رڼا کول
$1,8 \times 10^{-4}$	$4,4 \times 10^{-3}$	دهډوکو سينټيگرام

٤٢- جدول: د سرطان ناروغۍ د خطر احتمال چې د بدن غړو ډاکسريز عکس څخه پيداکيږي.

د علت احتمال تيوري (Probability of causation theory)

د علت احتمال تيوري په گوته کوي چې که يو چا ته ډير کالونه تر مخه وړانگې رسيدلي وي، نو د ابيديمولوژي څيړنوپه بنسټ څومره سلیز احتمال شته دی، چې ډيره موده وروسته د وړانگوداغيزو له کبله راپاراول شوي سرطان ناروغۍ دهغه په غړو کې منځ ته راشي (76).


پوښتنه:

يو مسلکي ساينس پوه د ١٩٤٠ څخه تر ١٩٦٠ م کال پورې دامريکا يوه ايالت نيواداپه سيمه کې (Nevada state) کې دهستوي وسلودازموينې په موخه په کار بوخت وه. په ١٩٧٦ م کال کې دوينې دسرطان (Malignant Lymphoma) په ناروغۍ اخته شو. په ١٩٥١ م کال کې دډوزيمتري الو په مرسته سره په ډاگه شوه، چې هغه ته دهستوي آزموينوپه کړنلاره کې لږڅه درې نيم سانتي گري وړانگې (3,72 cGy) په يوه کال کې رسيدلي دي. څومره احتمال شته دی، چې پينځه وېشت کاله وروسته نوموړې ناروغي دهستوي وسلو ازموينودچاپيريال وړانگو څخه را پيدا شوې وي؟

*

حل: د علت احتمال (Probability of causation = P.C) عبارت دی له حاصل تقسيم د هغو اضافگي شميرسرطان ناروغۍ، چې دورانگوانرژي ډوز (Radiation cancer = R) له کبله منځ ته راځي، اومجموعه دسرطان ټولي نورې پاتې ناروغۍ چې په طبيعي ډول (Base line cancer plus the radiation cancer = B+R) اوهم دورانگوسره تړاو لري منځ ته راځي (76).

دنوموړو لنډيز ليکنې په کارولو سره د علت احتمال تيوري (Probability of causation theory) رياضي معادله په لاندې ډول ليکلای شو.



$$\text{Probability of causation} = \frac{R \times X}{B \times R \times X} \times 100$$

په پورتنی معادله کې:

✓ X د هر غړی لپاره د سرطان ځانګړې ناروغۍ مطلق خطر دی چې د یوې سانتي ګري انرژي دوز څخه د یوه کال په موده کې منځ ته راځي. دنړیوال کمسیون بایر (BEIR) د څیړنوسره سم که یوملیون خلکو ته په یوه کال کې یوسانتي ګري 1 cGy وړانګې ورسیري نو د نوموړې بیالوژیکي کمیت قیمت د ویني سرطان (Lymphoma) لپاره مساوي دی له: $0,27/10^6/\text{yr/cGy}$

✓ هغه وړانګې چې مسلکي کارپوه ته ۲۵ کاله دمخه رسیدلي دی مساوي ده له $R=3,27 \text{ cGy}$


✓ د سرطان هغه ناروغۍ چې بي له وړانګو څخه منځ ته راځي اودطبیعی هر اړخیزواو ناڅرګندو پیښو سره تړاو لري د بنسټیز خطر په شکل (B =Base line risk) داوسنیو څیړنو له مخې (76) په یوه کال او یوملیون وګړو کې لږ څه دوه سوه اته پنځوس اټکل کیږي او مساوي دی له: $258/10^6/\text{yr}$



کله چې نوموړي قیمتونه په پورتنی معادله کې کیردو نو لروچې:

$$\text{Probability of causation} = \frac{3,72 \times 0,27}{258 \times 3,72 \times 0,27} \times 100\% = 0,4\%$$

* **ځواب:** ددې احتمال چې دغه مسلکي کارپوه به دهستوي وسلودازمویني په ترڅ کې دورانګوله کبله د سرطان په ناروغۍ اخته شوي وي، څلور په سل کې اټکل کیږي. دا په دې مانا چې ددوه سوه پنځوس چانسو څخه یوازې یوچانس کیدلای شي چې د لمفوما (Lymphoma) ناروغي اصلي علت د وړانګو سره تړاو ولري.

په لاندني ګراف کې دغرو سرطان خطر نسبي احتمال د عام ولس او دتپټي کچې انرژي لپاره ښودل شوي دی کله چې پینځه سوه زره تنه په یو ګري 1Gy وړانګورنا شي.






۱۲۰- شکل: د ټیټې کچې وړانگو لپاره دیوه جرمني نامتو ساینس پوه W.Jacobi یوموډل بنودل شوی دی. په نوموړي شکل کې دورانګوداغیزې په پایله کې دسرطان ناروغي دخطر احتمال Probability دکالونو په تابع سره راښيي (32).

د بیلګې په ډول: ۱- د ستوني سرطان Throat cancer ، ۲- ددهوکې سرطان Bone cancer ۳- دویني سرطان Leukemia ، ۴- دیني سرطان Liver Cancer

د ټیټې کچې وړانګود دخطر احتمال په اړوند دیوه جرمني نامتو ساینس پوه W.Jacobi له خوا یو تیورېټیکي موډل په ۱۲۰ شکل کې بنودل شوی دی. دنوموړي موډل پایله او د احسايي بنسټ د هغو زرګونوکارګرانود ارقامو Data څخه تر لاسه شوی دی، چې دالمان په ختیزه سیمه کې دیورانایوم په کانونکې ۱۹۴۵ څخه تر ۱۹۹۰ پورې په کار بوخت وو. دغه کارګران د سړي ناروغي څخه پنځوس په سلو کې مړه کیدل.

که فرض کړو چې دجګړوپه ډګرکې یوپېنځه ویشت کلن افغان په ۲۰۰۱ م کال کې لس واړه د یورانایوم وسلود استعمال په وخت کې په اعظمي کچه راډیو اکتیو گرد تنفس کړي وي، نوډیورټني ګراف له مخي شپږ په سل (6%) کې ددې احتمال شته، چې دغه سړي لس کاله وروسته دویني په سرطان اوشل په سل (20%) کې ددهوکې په سرطان اخته شي اود سرطان نوموړي ناروغي اصلي علت دیورانایوم وسلې سره تړاوتلري. که چیرته شل کاله وروسته دغه افغان د ډيني (Liver) په سرطان اخته شو، نو لږ څه شپېته په سلوکې ددې احتمال شته دي، چې دغه به دیورانایوم وسلوڅخه پیدا شوي وي.



لنډيز

په ټيټه کچه وړانگې يانې د صفر نه تر دوه سوه ملي سيورټ (0-200 mSv) پورې لاندنۍ اغيزې په بدن کې منځ ته راوستلای شي.

د حجرې په ډي. اين. اي. کې موټيشن منځ ته راوړي
د سرطان ناروغۍ د راپارولو او منځ ته راتلو سبب (لامل) گرځي
د بدن د دفاع سيستم دومره کمزوری کولای شي چې په پايله کې د میکروبونو او وایرسونو مخه نه شي نيولای، او له دې کبله هر اړخيزې ناروغۍ منځ ته راتلای شي. د بدن همغه غړی خپله دنده هم په سم ډول نه شي تر سره کولای.
د وړانگو ناروغي منځ ته راوستلای شي
په راتلونکي نسل کې د معيوبو ماشومانو زيږيدلو سبب (لامل) گرځيدلای شي

پوښتنې (Questions) :


۱-۱۵ په يوه کال کې دالمان هيواد څومره خلک دسرطان په ناروغۍ نوي اخته کيږي؟

۲-۱۵ د ماليگنوم (Malignom) او سرطان تر منځ توپير څه دی؟

۳-۱۵ په درمل پيژندنه کې د سرطان ناروغۍ په تړاو د ريسيديو (Recediv) کلمه او د ريميزيون (Remission) کلمه څه مانا ورکوي؟

۴-۱۵ اپيډيميولوژي څه ته وايي؟

۵-۱۵ د سرحد يا ليميټ نه لرونکي راديوبيولوژيکي تيوري (Linear non threshold theory= LNT) دټيټې کچې وړانگو په تړاو څه پايله لري؟



لسمه برخه

شپاړسم څپرکی

دورانگو اندازه کولوتگلاري



(Radiation Measurement methods)

سریزه

څرنگه چې انسانان د حس داسې غړي نه لري، چې ایونایز کوونکې وړانګې لکه الفا، بېتا، گاما اود پروتون اونیوترون زړې حس کړي او یایې په سترگو لکه نوریانې رڼا وويني، نو له دې کبله دنوموړو وړانگو پیژندنه او دهغوي دخطر اټکل او ځان ساتنه، ډیر گران تمامیږي. یوازې د تخنیکي آلو په مرسته سره موږ کولای شو چې د وړانگو دناوړه اغیزو څخه ځان وساتو. نن ورځ د ایونایزکوونکو وړانگو د اندازه کولو لپاره ډیر دقیق او هر اړخیز آلو او تگلارو څخه کار اخیستل کیږي، چې دورانگو د انرژي کچې، لوړ ډوز او ټیټ ډوز اودورانگو ډول سره سم ټاکل کیږي. څرنگه چې ددغو تخنیکي ټولو آلو بیان کول دلته دکتاب موضوع ډیره اوږده کوي، نویوازې هغه تگلارې ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د یورانیم ایزوټوپونو په اندازه کولو کې زیات حساسیت او پوره دقیق والی ښیي. دا ځکه چې نوموړي ایزوټوپونه په چاپېریال کې په ډیره ټیټه کچه پیدا کیږي.

لومړۍ: گاما شپکټرومټري (Gamma Spectrometry)

گاما شپیکټرو مټري د هستوي فزیک یوه ډیره وتلې کرنلاره ده چې په یوه بیالوژیکي نمونه کې درادیاکتیوایزوتوپونودپیژندلو او دهغوي د گاما وړانگوداندازه کولوپه موخه ور څخه کار اخیستل کیږي. په ۱۲۱ - شکل کې د گاما شپکټرومټري بنسټیز جوړښت ښودل شوی دی. کله چې د گاما یوه ذره یانې یوکوانټ دنیم هادي گرمانیم په کریستال (Germanium = Ge) ولگیږي نو هلته دمثبت سوریوپټ (p) او منفي سوریوپټ (n) ترمنځ په یوه بل دریم پټ کې چې دغریب شوي پټ (Depleted layer) په نامه سره یادیږي گڼ شمیر د الکترون سوریو جوړې (Electron-hole pairs) منځ ته راولي. په پایله کې یو بریښنایز جریان د تړلي سرکېټ په منځ کې پیل کیږي او له دې کبله د مقاومت ($R = \text{Resistance}$) د سراواخیرپه برخو کې د ولټیج توپیراو دهغې سره سم یو زیگنال منځ ته راځي. نوموړی زیگنال دیوه امپلیفایر (Amplifier) په مرسته سره پرلپسې دومرغت کیږي، چې د یوه مونیتورپه پرده باندې د انرژي شپکټرم په بڼه لیدل کیدای شي. د بېلگه په ډول په ۱۲۱ شکل کې د ایزوټوپو انرژي شپکټرم لیدل کیدای شي. نوموړی شپکټرم یو خطیز شپکټرم دی چې هره یوه لیکه یې، دیوه ځانگړي ایزوټوپ د انرژي سره سمون خوري.




۱۲۱- شکل: د گاما شپکترومترې بنسټيز جوړښت (Gamma Specrometry)

دگاما شپکترومتراله د لاندنيو برخو څخه جوړه ده(34) .

- دگرمانیم بریسنایز نیم هادی دېدکتور (Germanium Semiconductor Detecor)
- د ولتيج زيگنال ستروونکي برخه (Amplification)
- د يوي پياوړي الکترونيکي تکنالوژي په مرسته سره د ولتيج زيگنال شميرل کيږي (Counter)
- د يوه مونيتور (Monitor) پرده باندې کولای شو چې د پېژندل شوي اوپه بيالوژيکي نمونه کي دناڅرگنده ايزوتوپونو انرژي شپکتري وليدل شي.

نن ورځ د گرمانیم نیم هادي کريستالونه په دومره سوچه توگه توليد کيږي، چې دنوموړي کريستال د سړولو لپاره د پخوا په پرتله مایع نایتروجن ته هيڅ اړتيا نه شته . دنوموړي نوښت گټه په دې کې ده چې په ډيره آسانۍ سره دتودوخي په عادی درجه کې هم ورڅخه کار اخيستل کيدای شي. څرنگه چې د گرمانیم د يوه الکترون سوري جوړې د توليد لپاره په ډيره کمه کچه انرژي په کار ده، چې قيمت يې لږ څه درې الکترون ولټه (3 eV) ته رسيږي، نو له دې کبله دگرمانیم دېدکتور د يوي خوا دايزوتوپود انرژي توپيرکولو وړتيا (Energy resolution) دنورودېدکتورونو په پرتله ډيره پياوړې ده او دبلې خوا دگاما وړانگو د اندازه کولو په اړوند ډير حساسيت شيي. د بېلگه په ډول دوه ايزوتوپونه چې په انرژي شپکتري کې د يوه بل څخه لس کيلو الکترون ولټه (10 KeV) واټن ولري د يوه بل څخه په توپير سره پېژندلای شي.





دگاما شپکترومتري گټور استعمال په لاندې ډول سره بيان کولای شو.

- په راديو اکتیو موادو د چاپېریال ککړ توب اندازه کول. لکه اوبه، هوا، ځمکه اونور.
- په چاپېریال کې د راديو اکتیو غاز د مخصوصه راديو اکتیویټي (Specific radioactivity) کچه اود ایزوټوپو کیفي اومقداري تجزیه کول. د بېلگه په ډول د هستوي بټیو، هستوي آزموینو اونورو هستوي پېښو لکه د چرنوبیل په هستوي پېښه کې هغه نجیبه راديو اکتیو غاز، چې چاپېریال ته ازاډکیري دگاما شپکترومتري په مرسته سره ډیر شه اندازه کیدلای شي.
- دځمکې پر مخ لکه ریگ، شگه، خاوره او ډبرو کې د راديو اکتیویټي او ایزوټوپو پیژندل
- په اوبو، خوراکي موادو لکه غوښه، تر کاري، میوو او نورو موادو کې د راديو اکتیویټي کچه اندازه کول.

دویم: بیا لوژیکی ډوزیمتری (Biological Dosimetry)

بیالوژیکی ډوزیمتری په یوه حجره (ژونکه) کې دورانگو دزر په پیژندلو کې نن ورځ یوه ډیره حساسه تگلاره تشکیلوي. داځکه چې ټول بدن ته د رسیدلو وړانگو انرژي ډوز ډیرې مودې څخه وروسته هم په ډیر دقیق او سم ډول سره اندازه کولای شي. په ۱۲۲ شکل کې دنوموړې ډوزیمترې کرنلاره ښودل شوې ده.

دیوي پیچکاری یا سنتي په مرسته سره لږ څه پینځه ملي لیتره وینه، د رگونو څخه اخیستل کیږي او په سپینو کرویاتو (Lymphocytes) کې دورانگو ناوړه اغیزې، لکه د کروموزومو ناسمي (Aberration) د یوه میکروسکوپ په مرسته سره لټول کیږي. ددې موخې لپاره لومړی په لابراتوار کې ستاندارد ډوزیمتری تر سره شي، تر څو د دورانگو ډوز او د کروموزومو د ناسمي تر منځ، اړیکې تر لاسه شي. دا په دې مانا، چې یوازې د تجربو په بنسټ د وړانگو انرژي ډوز، او دهغوي ناوړو اغیزو تر منځ، یو ریاضي موډل تر لاسه کیږي. دنوموړې موخې لپاره سپین کرویات د کیمیاوي موادو په مرسته سره تر هغه پورې راپارول کیږي او په هیجان راوستل کیږي (Stimulate)، تر څو هغوي د حجرو په ویشلو باندې پیل وکړي. د میتوز په پړاو کې بیا سړي کولای شي، د یوه رڼا مایکروسکوپ (light microscope) په مرسته سره، د دې اړینې غبرګ تېاو شوي مزي، او همدارنګه دهغوي موتیشن لکه دوه مرکز (Dicentric) ناسمي په سترګو ووبی. دنوموړې تګ لارې لپاره د وینې لږ تر لږه پینځه سوه حجرو ته اړتیا لیدل کیږي، تر څو په پوره باور سره دهغوسپینو کرویاتو شمیر وټاکل شي، په کوم کې چې دورانگو په واسطه دوه مرکزونه منځ ته راغلي وي. څیړنو په ډاګه کړې ده، چې په سپینو کرویاتو کې د دوه مرکز وروشمیر د وړانگو دانرژي ډوز سره سم سیخ تړاو لري. د بیالوژیکی ډوزیمترې رومبیتوب اوبرم دنورومیتودونو په پرتله داده، چې په ټیټه کچه انرژي ډوز ناوړه اغیزې د بیلګې په ډول لکه د سل ملي سیورت نه تر لس ملي سیورت پورې هم اندازه کیدلای شي.




۱۲۲- شکل: د بیالوژیکي ډوزیمتری په مېتود کې د یوې پیچکاری په مرسته سره د لاس څخه وینه اخیستل کېږي، اوبیا ترمکروسکوپ لاندې په هریوه سپین کرویات (Lymphocyte) کې ددوه مرکزو کروموزومو شمیرگڼل کېږي. په نوموړي شکل کې په (Dicentrics = D) دوه مرکزې کروموزوم په ویکتور(غشي) سره شودل شوي دي (28).

ډکروموزوموفلوریسینس تگلاره (Chromosome fluorescence technique)

دوینې په رڼا شوو سپینو کرویاتو کې ددوه مرکزو کروموزومو ناسمي Aberration، یوه داسې بیالوژیکي ډوزیمتری ده، چې بدن ته دورانګو انرژي ډوز د ټاکلویه موخه ورڅخه کار اخیستل کېږي. دنوموړې کرنلارې نیمګړتیا په دې کې لیدل کېږي، چې دسپینو کرویاتو په ویشنه کې ډکروموزومودوه مرکزې ناسمې، راتلونکي نسل ته نه انتقال کېږي. نو له دې کبله سړی نه شی کولای، چې داوړد مهال لپاره، دنوموړې کرنلارې څخه، دباوروربیالوژیکي ډوزیمتری په ډول، اغیزمنه ګټه پورته کړي.

ډکروموزوموفلوریسینس تگلاره نن ورځ دورانګو نه دځان ساتنې په اړوند، تر ټولواړینه او ارزښتناکه بیالوژیکي ډوزیمتری ګڼل کېږي. داځکه چې بدن ته دوررسیدلو وړانګوانرژي ډوز، وروسته له ډیرو کالونوڅخه هم ټاکلی شي. دبیلګې په ډول، دچرنوبیل Chernobyl هستوي پېښې څخه لږڅه لس کاله وروسته هم داوکراین په هیواد کې، د نوموړې کرنلارې څخه په لوړه کچه ګټه واخیستل شوه. ډکروموزوموفلوریسینس په تگلاره کې هغه کروموزومونه، چې د وړانګو د ناوړه اغیزو په پایله کې ورته زیان رسیدلی وي اودکروموزوم یوه برخه یې بایللې وي، خوبیا بیرته د یوه بل کروموزوم سره یوکیمیایي مرکب جوړکړی وي، کار اخیستل کېږي (Translocation). نوکله چې دغه ناسم کروموزوم نه په یوه داسې ماده ولړل شي، چې دفلوریسینس رنګ اویاځښت پیدا کړي fluorescence، نودرڼا شوو کروموزومو رنګ د هغو کروموزومو په پرتله، چې نوموړې ناسمي پکې نه وي پیدا شوي، ښکاره توپیرښيي. هر څومره چې د فلوریسینس کچه زیاته وي، هغومره ډیر د ترانسلوکیشن موتیشن هم ډیر وي، او دهغې سره سم دورانګو انرژي ډوز هم زیاته ده. په دې هکله یو لړ معیاري او ستاندارد منځني ګان اندازه شوي دي، چې دهغوی له مخې بدن ته دوررسیدلي انرژي ډوز کچه ډیر کاله وروسته هم ټاکل کېدای شي. دا ځکه چې د کروموزومودبې ځایه کیدلوناسمي (Translocation)، د سپینو کرویاتو دویشنې څخه وروسته، راتلونکو نسلونوته هم انتقال کېږي.



د بيالوژيکي ډوزيمټري پخلۍ د يو لړ احساوي شميرنوپه بنسټ تر سره شوی دی چې په لاندې ډول بيان کيږي.



- د اکسريز عکسونو اخيستلو په کړنلاره کې د سرطان ناروغيو اضافي شميرنه
- په جاپان باندې داتوم بم غورځونې څخه وروسته هغه څوک چې ژوندي پاتې شول او بيا د سرطان په ناروغۍ اخته شول.
- د نړۍ په هغو سيمو کې چې دطبيعي وړاګوانرژي ډوزکچه ډيره لوړه ده. د بېلګه په ډول لکه د هندوستان کيرالا (Kerala) په ولايت کې د طبيعي وړانګو کچه لږ څه پنځوس ملي سيورت (50 mSv) په يوه کال کې اندازه شوي ده. نوموړې قيمت د عام وګړو دلوړ لېمټ څخه پنځوس ځله ډيره ده.

دریم: د پلازما کتلې سپکټروسکوپي (Plasma mass spectroscopy)

په ۱۲۳ شکل کې يوه فزيکي اوسنۍ آله بنودل شوې ده چې د انډکټيو کپلډ پلازما ماس سپکټروسکوپي (Inductively coupled plasma mass spectroscopy = ICP-MS) په نامه سره ياديږي. دنوموړې الې وړتيا د ګاما سپکټرومټري په پرتله داده چې په يوه بيالوژيکي نمونه کې، د راډيو اکتيو او نه راډيو اکتيو ايزوټوپونو په پيژندلو او دهغوي د کچې په اندازه کولو کې يوه بې سارې کړنلاره تشکيلوي.

نن ورځ په نړيواله کچه دنوموړې کړنلارې څخه په يوه طبي نمونه لکه وينه (Blood)، ميتيا زی (urine) او غړو کې ديورانيوم دوه سوه اته ديرش (U^{238}) او يورانيوم دوه سوه پينځه ديرش (U^{235}) ايزوټوپونو او همدارنګه نورو عناصرو د اندازه کولو په موخه ورڅخه کار اخيستل کيږي. دا ځکه چې د کتلې سپکټروسکوپي آله دنورو په پرتله، د يورانيوم ايزوټوپونو په توپير پيژندلو (Resolution) کې، يوه بې سارې، دقيقه او حساسه کړنلاره تشکيلوي.

دنوموړې آلې بڼه والی په دې کې ليدل کيږي چې ديوې خوا په يوه وار سره ډير عناصرونه او ايزوټوپونه او دهغوی تناسب اندازه کولای شو، اود بلې خوا د ځيرونکو بيالوژيکي او جيو فزيکي نمونو بڼه دغاز په شکل نه بلکه دمايع په شکل کې هم ټاکل کيدای شي. له دې کبله لټونکي عناصرونه په بخار نه شي بدلېدلای او اندازه کيږي. دنوموړې آلې داندازه کولو تر ټولو کوچنۍ يا نې ټيټ ليميټ (Lower Detection limit) په يو ګرام نمونه کې، دبيلګي په ډول دسوديم Na-23 لپاره لږ څه پينځه پيکوګرام په يوه ګرام ماده کې (5 pg/g) او حساسيت (Sensitivity) يې يوولس کونټس په يو پيکوګرام په يو ګرام (11 counts/pg/g) ماده کې ثبوت شوی دی. د ICP-MS آله د لاندنيو برخو څخه جوړه ده.




۱۲۳- شکل: د کتلي شپکتروسکوپي (ICP-MS) د کارکولو بنسټيز بڼه (76)

- ◀ د سمپل (نموني) تيارول (Sample introduction)
- ◀ دسمپل ايوناييزېشن (Sample ionization)
- ◀ دکتلي شپکتروسکوپي منځنۍ برخه (ICP-MS Interface)
- ◀ د کتلي شپکترومتر (Mass spectrometer)
- ◀ دېټېکتور (Detector)
- ◀ دارقامو کمپيوټري تحليل (Data analysis)


دکتلي شپکتروسکوپي دکارکولو کړنلاره (ICP-MS Operating principles)

په ۱۲۴ شکل کې ښودل شوي ده چې په يوه لوبښي کې د مایع سمپل (نمونه) د يوې ځانگړې آلې لکه نېبو لايڅز (Nebulizer) او د جامد سمپل د ليزر (Laser) په مرسته سره په بخار او غاز باندې بدليږي، چې دغه ډول غازد ايروزول (Aerosol) په نامه سره ياديږي. د سمپل غاز بيا سم سيخ د ارگون پلازما سرچينې (Argon plasma source) ته ورننوځي چې هلته د سمپل اتومونه د ډير لوړتودوخي له کبله په ايونواوړي. د ارگون غاز په چاپير کې يو بريښنايز گوتک (Coil) تاوشوي دی چې دراديو فريکونس يوه جنراتور سره تړلي دی. دجنراتور څخه داسې څپې راوځي چې څلويښت مېگا هرش (Radiofrequency = 40 MHz) راديو فريکونس لري. نوموړي فريکونس دبريښنايز گوتک په مرسته سره چې د اندکسين پر نسپ په بنسټ (Inductively coupled) کارکوي، الکترو مقناطيسي انرژي دارگون غازسرچينې ته انتقال کوي. په پايله کې دارگون غاز تو دوخی د کلويں لږ څه اوه زره درجي (7000 ° K) ته پورته ځي چې دارگون ټول اتومونه په ايونو بدليږي او په دې ډول دارگون غاز پلازما سرچينه لاس ته راځي.

➡ يو غاز چې ټول خنثي اتومونه يې په ايونواوړول شوي وي، د همغه غاز پلازما (plasma) په نامه سره ياديږي.




کله چې د سمپل ټول اتومونه په ایونو او بنټل نوییا وروسته د کتلې شپکتروسکوپي منځنۍ برخې ته دیوه کوچني سوري له لاری، چې قطر یې لږ څه یو ملي متر دی ورننوځي. په دې ځای کې د ځانگړو پمپونو په مرسته سره په ډیره لوړه کچه تشیا (Vacuum) منځ ته راځي، چې قیمت یې داتموسفیر فشار لږ څه د یوه تورسل زرمه برخه (1×10^{-5} torr) تشکیلوي. همدا سبب (لامل) دی چې د سمپل ایونونه په ډیر لوړ سرعت سره د منځنۍ برخې څخه د کتلې شپکترومتر (Mass spectrometer) تر ټولومهمې (اړینې) برخې ته ورننوځي چې په ۱۲۴- شکل کې ښودل شوی دی.



۱۲۴- شکل: د کتلې دوه گون فوکس کوونکې کتلې شپکترومتراله، چې د مقناطیسي او بریښنا ییز ساحودوه برخو یاسکترونو (Sector) څخه جوړه ده.

د سمپل مثبت چارج شوو ایونو جریان لومړی بریښنا ییز ساحي (ESA) او بیا ورپسې د مقناطیسي ساحي په برخو magnet sector کې، چې دواړه دلته لکه د عدسیو (Lenses) په ډول دنده تر سره کوي، د کتلې شپکترومتر په راتولونکي چاک (Collector slit) کې فوکس کیږي. د کتلې شپکترومتر په اخرنۍ برخه کې د سمپل مثبت چارج شوو ایونو جریان دیوه ځانگړي دډکتور په مرسته سره چې د چنلترون (Channeltron electron multiplier) په نامه سره یادېږي، اندازه کیږي.

د کتلې شپکتروسکوپي د موندلو تیټ لیمیت (حد) (Detection limit) دیوترلیون (Trillion) یوه برخه یانې لس په طاقت د منفي دوولس تشکیلوي (1×10^{-12}) (Parts per trillion = ppt).



د پام وړ: هغه مواد چې په چاپېريال کې په ډيره کمه کچه پيدا کيږي نو د غلظت (Concentration) لپاره لاندني کميتونه په کارول کيږي.

يوه برخه ديو مليون (1ppm = 1 parts per million) دا مانا ورکوي چې د بېلگه په ډول که يوگرام (1gramm) ماده لکه يوگرام بوره په يوتن (Tonn= 1 000 000 gramm) محلول لکه اوبو کې حل کړو، نو په اوبو کې د بورې غلظت يوه برخه يانې يوگرام په يو مليون گرام اوبو کې تشکيلوي. په همدې ډول ليکلای شو چې: يوه برخه په بيليون (1ppb = 1 parts per billion) او يوه برخه په تريليون (1 ppt = 1 parts per trillion).

1 kilogram (kg) = 1 million milligrams (mg)	يو کيلوگرام = يو مليون ملي گرام
sso: 1 mg/kg = 1 part per million	نو لرو: يو ملي گرام تقسيم په کيلوگرام = يوه برخه په مليون


نو ليکلای شو چې :

1ppm = 1 part per million = 0,0001% = 1 mg/kg	يومليونمه برخه
1ppb = 1 parts per billion = 0,0000001% = 1 micro g/kg (Mikrogramm per kg)	يوبليونمه برخه
1ppt = 1 parts per trillion = 0,0000000001 = 1 ng/kg (Nanogramm per kg)	يو تريليونمه برخه

څرنگه چې د يو ليتر (1 l = 1 Liter) اوبو وزن د يو کيلوگرام سره برابر دی نو ليکلای شو چې:

1 mg/l = 1 part per million	يوملي گرام تقسيم په ليتر = يوه برخه په مليون
1 ug/l = 1 part per billion	يو مايکروگرام تقسيم په ليتر = يوه برخه په بيليون


په ۴۳ جدول کې دويني يوه نمونه (Blood sample) د کتلې شپکترومتر په مرسته سره تحليل شوي ده. په دغه نمونه کې يوازي هغه عنصرونه اندازه شوي دي چې په وينه کې په ډيره ټيټه کچه پيدا کيږي (Trace elements). دنوموړي جدول څخه څرگنديږي چې دويني په يوه ملي ليترنمونه کې د يورانيم (U^{238}) عنصرکچه لږ څه صفرعشاريه دوه نانو گرام، يانې ديوه گرام يو پرملياردمه برخه ($ng = 10^{-9}g$) قمت لري. په دغه نمونه کې تر ټولو عنصرولور به برخه د جست عنصر (Zinc = Zn) تشکيلوي چې قيمت يې لږ څه پينځه زره نانو گرام په يوه ملي ليتر وينه کې اندازه شوی دی.



عنصر	په یوه ملي لیتر ml وینه کې د عنصر اندازه شوي قیمت په واحد د Nanogram = ng = 10^{-9} g نانوگرام	
Element	Certified range ng/mL	Measured Value ng/mL
⁹ Be	5.4–6.4	5.2 ± 0.4
²⁷ Al	49.0–68.8	50 ± 3
⁵¹ V	4.0–4.6	3.8 ± 0.3
⁵² Cr	5.6–6.4	5.5 ± 0.07
⁵⁵ Mn	12.0–14.6	12.2 ± 0.2
⁵⁶ Fe*	423–447	412 ± 4
⁵⁹ Co	5.7–6.5	5.60 ± 0.01
⁶⁰ Ni	4.7–5.9	5.2 ± 1
⁶³ Cu	637–695	607 ± 11
⁶⁶ Zn	5109–5323	4830 ± 55
⁶⁸ Zn	5109–5323	4840 ± 66
⁷⁵ As	11.9–14.5	11.4 ± 0.2
⁸⁰ Se	113–133	109 ± 3
⁷⁷ Se	113–133	108 ± 5
⁷⁸ Se	113–133	105 ± 3
⁸² Se	113–133	121 ± 2
¹¹¹ Cd	5.6–6.4	5.7 ± 0.2
¹¹⁴ Cd	5.6–6.4	5.70 ± 0.06
¹³⁷ Ba	60.6–68.4	83 ± 2
¹³⁸ Ba	60.6–68.4	81.7 ± 0.7
¹³⁵ Ba	60.6–68.4	82 ± 1
²⁰⁵ Tl	4.9–5.5	4.8 ± 0.09
Pb	372–414	392 ± 4
²³⁸ U	0.176–0.184	0.170 ± 0.002


*in µg/mL
Calibration in 1% IPA + 0.01% EDTA+0.01% TritonX
100 ppb Var-IS used as I/S sample 1:10 dilution corrected


۴۳- جدول: د کتلې شپکترومتر (Varian 820-MS) په مرسته سره د وینې په یوه نمونه یانې سمپل (Blood sample) کې هغه عنصرونه اندازه شوي دي، چې په ډیره لږ کچه پیدا کېږي او له دې کبله ورته (Trace elements) ویل کېږي. (54)



پوښتنې (Questions) :

- ۱-۱۶ د کروموزومو فلوريسينس تگلاره دنورويالوژيکي پوزيتمري په پرتله څه گټه لري؟
- ۲-۱۶ يو پي پي ايم 1ppm څه ما نا ورکوي؟
- ۳-۱۶ گاما شپيکترومتري څه ډول کرنلاره ده؟
- ۴-۱۶ د انډکټيو کپلډ پلازما کتلې شپيکترومتري څه ډول فزيکي اله ده؟
- ۵-۱۶ ببالوژيکي پوزيتمري څه ډول کارکوي؟
- ۶-۱۶ ديوې کوبالټ شپيته Co-60 سرچينې څخه دگاما دوه وړانگې γ_1 او γ_2 خپر يري اوديوه گاما شپيکترومتري آلې په مرسته سره چې په لاندې شکل کې شول شوي ده اندازه کيږي. دنوموړې آلې د کارکولو کرنلاره تشرېح کړئ او دنوکليد جدول په مرسته سره چې د کتاب په اخير کې مل شوی دی، د نوموړو وړانگو انرژي وټاکئ؟





اولسم څپرکی

د چاپېریال رادیواکتیویټي څارنه

(Environmental Radioactivity monitoring)

سریزه

چرنوبیل (Tschornobyl) د اکراین (Ukraine) هیواد یو کوچنی ښار دی چې هلته شل کاله پخوا، یانې داپریل میاشتې په پینځه ویښتمه نیټه ۱۹۸۶ م کال د ښپې په یوه نیمه بجه د چرنوبیل د څلورم بلاک هستوي بټۍ د مسلکي کارکوونکو د ناسم چلن په پایله کې و چاودله، اود هستوي بټۍ په منځ کې د تودوخي درجه دومره پورته ولاړه، چې د هستوي بټۍ سروونکي اوبه په بخار واوښتې، او د هغې سره سم د سونگ هستوي مواد ویلي شوه. په دې ترڅ کې داوبو بخار فشار تر سل اتموسفیر (Atmosphere) نه هم پورته ولاړ شه، چې په پایله کې د هستوي بټۍ د سونگ لږ څه ټول رادیو اکتیف مواد چاپېریال ته وښیندل شوه. نوموړې هستوي ناوړه پېښه د اتومي انرژي په ټکنالوژي او پېښ لیک کې ځکه یوه بې سارې غمیزه گڼل کیږي، چې دنړۍ هر گوټ ته د نوموړې هستوي بټۍ رادیو اکتیو مواد د باد په واسطه ولېږدول شوه. دغو رادیو اکتیو مواد و، دنړۍ په هر ځای کې لا تر اوسه هم د انسانانو روغتیا د خطر سره مخامخ کړې ده.

دچرنوبیل هستوي پېښې څخه وروسته دنړۍ په لږڅه ټولو هیوادونو کې په رادیو اکتیو موادو د چاپېریال ککړتوب اندازه کول سمدلاسه پیل شوه. هغه آله چې نن ورځ په نړیواله کچه د چاپېریال اکتیویټي د اندازه کولو په موخه ور څخه کار اخیستل کیږي، دخوځیدونکي گاما شپکترو متر په نامه سره یادیږي. په ۱۲۵ شکل کې د گاما شپکترومتر یو ګرځنده لابراتور ښودل شوی دی، چې د یوه هیواد په مختلفو سیمو کې شپه او ورځ یانې د څلرویش ساعتونو په موده کې د چاپېریال رادیو اکتیویټي اندازه کوي اود ایزوټوپو ترکیب تر څارنې لاندې نیسي.

د بېلګه په ډول د ۱۹۸۶ م کال څخه را پدې خوا د جرمني هیواد بایرن (Bayern) په ولایت کې په سیزیم (Caesium) رادیو اکتیو ایزوټوپ باندې د چاپېریال ککړتوب کچه په ۱۲۵ شکل کې ښودل شوې ده، چې د نوموړي آلي په مرسته سره اندازه شوې دی.






Abb. 6: Zeitliche Entwicklung des Rückganges der bayernweiten durchschnittlichen Cs 137-Kontamination in Klärschlamm im Zeitraum von 1987 bis 1991.

۱۲۵- شکل: د ۱۹۸۷ م کال څخه تر ۱۹۹۱ م کال پورې دجرمني بایرن (Bayern) ولایت په چاپېریال کې دسیزیم (Caesium-137) اکتیویټي ښودل شوې ده. دگراف څخه څرگندېږي چې د چرنوبیل هستوي بټۍ د چاودنې په کال کې، د سیزیم مخصوصه اکتیویټي ترټولو جگ قیمت یانې لږڅه درې ذره بېکاریل په یوه کیلو گرام (3000 Bq/Kg) وچو موادو کې اندازه شوې دی. نوموړی اکتیویټي بیا د هر یوه کال په تیریدلو سره کمښت مومي. په داسې حال کې چې د با یرن غرنیو سیمو په ځینو نباتي موادو، خو په تیره بیا لکه په یوه کیلوگرام مرخیریو (Fungus) کې د اکتیویټي کچه شل کاله د چرنوبیل هستوي پېښې څخه وروسته هم تر شلو زرو بیکاریل (20 000 Bq/Kg) پورې رسېږي. دا ځکه چې د سیزیم د تجزیې نیمایي عمر لږ څه دیرش کاله دی نو له دې کبله به دنوموړي ایزوتوپ ر اډیو ګتیویټي تر سلګونو کالو پورې نور هم شتون ولري (29).

د جرمني هیواد د وړانګوڅخه د ساتنې مقررات (Radiation Protection Regulations) په خوراکي موادو کې د منلو وړ لوړ اکتیویټي لیمټ درې سوه بېکاریل په یوه کیلو گرام (300 Bq/Kg) وچو موادو کې ټاکلي دي. همدا سبب (لامل) دی چې په رادیو اکتیو عنصر وکړ شوي خوراکي موادو لکه مرخیری، د غرځنی غوښي، د غرنی خرس غوښي په خرڅولو باندې لا تر اوسه هم بندیز لګول شوی دی.


نړیوال نامتواو منل شوي کمیسیونونه لکه د روغتیا نړیوال کمیسیون (WHO) داتومي انرژۍ کمیسیون (IAEA) او دورانګونه دځان ساتنې نړیوال کمیسیون (ICRP) د رادیو اکتیو موادو څخه د نړۍ اتموسفیر پاک ساتل او څارل د هر یوه هیواد حکومت ملي او نړیوال مسئولیت ګڼي .



په ۱۹۵۹م کال کې د نړیوال اتومي انرژۍ ټولنې (IAEA) او همدارنګه داروپا یې هیوادونو ترمنځ په نړیواله کچه یو تړون لاسلیک شو (EUROATOM) چې دیوې خوا د هستوي انرژي څخه دسولې په موخه لکه صنعت، طبابت، کرهڼه او نورو برخو کې دګټې اخیستلو تګلارې بیان شوي دي، او دبلې خوا د وړانګو دخطر څخه دځان ساتنې په موخه بنسټیز کړنلارې (Basic Safety Standards) په ګوته شوي دي. دبیلګې په ډول داتوم قانون (§1 Euro-Atom) په لومړي پاراګراف څلورمه ماده کې لیکل شوي دي چې (59):

د نړۍ هر حکومت ملي او نړیواله دنده ګڼل کېږي چې دخپل عام اولس ژوند، روغتیا او د چاپیریال ټول شیان لکه هوا، ځمکه، اوبه، څاروي، دکرهڼې سیمې، اقلیم، ځنګلونه، نباتات او ژوندي اورګانیزم د ایونایز کوونکو وړانګو د خطر او زیان څخه څومره چې امکان ولري خوندي وساتي.

د چاپیریال ساتنې په موخه ددې سپارښتنه هم کوي چې د اعتبار وړ کړنلارو او آلو لکه ګاما شپکټرومټري، د پلازما کتلې شپکټرومټري او نورومدل شوو آلو په مرسته سره په رادیو اکتیو موادو د چاپیریال ککړتوب کچه، تل وڅاري او د خطر په وخت کې نوموړو نړیوالو سازمانونو ته سمدلاسه خبر ورکړي.



۱۲۵- الف: دغریب شوي یورانیم (Depleted uranium) یوې سرګولی ګاما شپکټرم ښودل شوی دی چې د پخوانۍ یوګوسلاویا Kosovo په سیمه کې پیدا شوي اودجرمني پوهانو یوې دولتي ډلې له خوا اندازه شوی دی. په نوموړي شکل کې دیورانیم U235;U238;U234 ایزوټوپونه او په تجزیه کې نور پیدا شوي ایزوټوپونه لکه توریم Th231;Th234 انرژي کرښې لیدل کېږي (92).






Abb. 4.1.4: Gamma-Spektrum einer untersuchten DU-Teilprobe für die Multi-Group-Analysis for Uranium (MGAU). Ausgewertet werden von der MGAU-Software im Wesentlichen Gamma- und Röntgen-Linien der U-Isotope und ihrer Töchter in einem Bereich von 83 keV bis 130 keV.



د چاپېریال ساتنې په موخه د گاما شپکتروميټري یو موبایل یا ګرځنده لابراتوار لیدل کېږي چې په رادیو اکتیو موادو د چاپېریال اکتیویټي دڅلرویشټ ساعتونو په موده کې اندازه کولای شي (57).

دباریم Ba او پلوتونیم Pu انرژي شپکترم کې نوموړي عنصرونه د یوبل څخه جلا پیژندل کېدلای شي (54)




2

دگاما شپکتروميټري دوه موبایل لابراتوارونه (54)

دچاپېریال اکتیویټي اندازه کولو اودرادیواکتیوايزوتوپو د پیژندلویو په بله موډرن ګرځنده (موبایل) نیم هادي گاما شپکتروميټري آله چې د لاندنیو برخو څخه جوړه شوې ده لیدل کېږي .

★ دنیم هادی دېډکتور HP-GE
★ دزیگنال ستروونکي Ampl.
★ دډیرکانال تحلیلوونکي MCA
★ کمپیوټري سیستم اوشپکترم
★ یوبل کمپیوټر چې په لیرې واټن کې موقعیت لري او زیگنالونه ورته استوي.




دگاما شپیکترومتری او توماتیک سیستم په مرسته سره د هیوادپه مختلفو سیمو کې د چاپیریال رادیواکتیویټي د څلرویشته ساعتونو په موده کې څارنه کیدلای شي.

که په گاونډیو هیوادونو کې کومه هستوي پېښه وښي د بېلگه په ډول که یوه هستوي ازموینه تر سره شي او په پایله کې د چاپیریال رادیواکتیویټي دنورمال کچې نه پورته ولاړه شي نودغه پېښه سمدلاسه پیژندل کیدای شي.



که چېرته د چاپیریال رادیو اکتیویټي دخپل ټاکلي لیمیت څخه واورې نوپه او تو ماتیک ډول سره یوه مرکزي کمپیوتر ته دخطر خبر ورکول کیري.

که چېرته په گاونډیو هیوادونو کې یوه هستوي بټی وچوي، نوپه پایله کې د کسینون (Xenon) رادیو اکتیونجیب غاز چاپیریال ته خپریري. څرنګه چې نوموړی غاز یوازې د یورانیم دوه سوه پینځه دیرش U^{235} په چاودنه کې منځ ته راځي نودا مانا ورکوي چې یوه هستوي پېښه منځ ته راغلې ده. په داسې یوه ناوړه حالت کې سمدلاسه عام وکړي خبریدلای شي تر څو ځانونه دورانګو دخطر څخه خوندي وساتي.

په چاپیریال کې دطبیعي رادیونوکلیدورادیواکتیویټي هم اندا زه کیدلای شي. د بېلگه په ډول لکه د یورانیم دوه سوه اته دیرش سلسله (U-238)، دیورانیم دوه سوه پینځه دیرش سلسله (U-235)، دپوتاشیم څلوېښت سلسله Kalium-40، اود توریم دوه سوه دوه دیرش سلسله (Thorium – 232) اوبرسیره پر دې هغه عنصرونه چې دنوموړو سلسلو په تجزیه کې منځ ته راځي هم اندازه کیدلای شي.




۱۲۶- الف شکل: دگاما شپیکترومتری آلي الکترونيکي جوړښت بڼه ښودل شوی ده



۱۲۷- شکل: دهستوي وړانګولکه الفا ، بېتا او ګاما وړانګو داندازه کولو اود هغوی د انرژي دټاکلو په موخه ځيني تخنیکي موبایل آلی بنودل شوي دي IAEA (6) .

پوښتنې (Questions) :

- ۱-۱۷ په ۱۹۸۶ م کال اود اکراین په هیواد کې دچرنوبیل هستوي پېښه ولې منځ ته راغله؟
- ۲-۱۷ دچرنوبیل هستوي پېښې څخه اوس لږڅه شل کاله تیر شوي دي خو بیا هم دچاپیریال خوراکي شیان په رادیو اکتیو موادو کېږي. ددغومواد په یوه کیلو ګرام کې داکتیویټي لوړه کچه همدا اوس څومره اندازه شوې ده؟
- ۳-۱۷ که چېرته په چاپیریال کې د ګسینون نجیبه Xenon رادیو اکتیو غاز اندازه شي نو دغه ډول ککړتو موږ ته څه ثبوت کوي اومالومات راکوي؟
- ۴-۱۷ هغه کړنلاره چې په رادیو اکتیو موادو دچاپیریال ککړتیا اود ایزوټوپو تشخیص کولای شي څه نومېږي اودکومو برخو نه جوړه ده؟



یوولسمه برخه

اتلسم څپرکی

د سرطان ناروغي (Cancer disease)

سریزه

د سرطان ناروغي د **دبشر** په ژوندانه کې تر ټولو پخوانی پیژندل شوی ناروغي ده چې لږڅه یونیم زر کاله دمخه دمصدر درمل پوهنې اوناروغي پیژندنې په طبي اثاروکې راغلې ده. ځینې روایتونه وایي چې پخپله دویم رامزیس (Ramses II) د فرعونیانو پاجا، لږ څه درې سوه کاله دمیلاد نه دمخه ددهوکو سرطان په ناروغي مړ شوی دی. په هغه وخت کې دنوموړې ناروغي درملنه دیوه عنصر چې د ارزېن (Arsen) په نامه سره یادېږي تر سره کیده. ترنونسې پیړۍ پورې ارزین دسرطان ناروغي ددرملنې لپاره یوازنی پیژندل شوی دوايي گڼل کیده. د سرطان ناروغي په طبي اثاروکې د **کارسینوم (Carcinom)** په نامه سره یادېږي.

داسې اټکل کېږي چې کارسینوم یوه یونانی کلمه وي داځکه چې پینځه سوه کاله دمیلاد نه دمخه د یونان درمل پوه هیپوکراتېس (Hippokrates) دپوستکي سرطان ناروغي لپاره په کار اچولی دی. دسرطان کلمه د بدن دیوه غړي سره سم یوځای کارول کېږي.

دبېلگه په ډول:

دسري دپروستاتا غدې سرطان (Prostata cancer)، دبنځو دتیو سرطان (Breast cancer)، د معدي سرطان (Stomach cancer)، درحم (زیلانځي) سرطان (Uterus carcinom)، ددهوکي سرطان (Bone cancer) اونور.

دسرطان ناروغي یوه خطرناکه ناروغي ده چې په لومړي پړاو کې دیوې نیمګړې یانې موتېشن شوي حجرې څخه پیل کېږي، اود وخت په تیریدلو سره د بدن دهمغه ځای نسجونو حجم یوه ناڅاپه غټیدلو پیل کوي او بې له کنټروله پرسیږي. د بیلګې په توګه په امریکا او لویدیځه نړۍ کې پینځه ویشټ په سلوکې 25% وګړي یانې دعام ولس هرڅلورم تن د سرطان په یو ډول ناروغي اخته او یا مړ کېږي. تر نن ورځ پورې دنوموړې ناروغي رېښتینۍ علت پوره څرګند نه دی، خود بدن هغه برخې چې د سرطان په ناروغي اخته شوي وي، د نورمال حجروپه پرتله مورفولوژي، پاتولوژي، جېنېټیک، هیستولوژي او په هارمونواور ریسپیتورونو (Receptors) کې هر اړخیز بدلون ښیي.




اچ ای ار پی سی پتور (Human epidermal growth factor receptor 2 = HER2)

دپام وړ: هغه ښځې چې دتيوبه سرطان اخته وي اوپه وينه کې يې داچ اي ار ريسيپټور HER2 کچه ډيره وپېژندل شي نويوه ډيره اغيزمنه درملنه يې د بدن ددفاعي موادو (Antibody) په مرسته سره تر سره کيږي چې د هرسيپټين (Herceptin) په نامه سره ياديږي.

که چیرې د سرطان نا روغی علاج (درملنه) وه نه شي، نود کانسر نسجونه په نورو شاوخوا روغو نسجونو کې ور ننوځي او یا داچې د بدن په نورو برخو باندې فشار راولي. څرنگه چې دانسان په بدن کې د حجر ود ډولونو شمیر تر لږ څه دوه سوه پورې رسیږي، نو له دې کبله دوه سوه توپیر لرونکي سرطان ناروغی هم شته دي. د بېلگه په ډول څرنگه چې په سږي کې توپیر لرونکې حجرې شته دي نو کیدای شي چې په سږي کې هم مختلف ډوله سرطان پیدا شي.

څرنگه چې د سرطان ناروغۍ د یوې غیر نورمال سټریدونکې (abnormal growth) اوپه خپل سربې کنټروله ویشونکې حجرې څخه پیل کیږي او د بدن د هر یوه غړي لپاره توپیر لرونکې سرلیک لري، نو د هغوی پر سوب سره سم د تشخیص په موخه په لاندې ډول کلینیکي اصطلاحونه ورته په کارېږي.


- ☒ **نیو پلازیا (Neoplasia):** کله چې توپیر لرونکي نسجونه په غټیدلو او پړسوب پیل وکړي او په پایله کې هر راز ناروغۍ لکه د سرطان ناروغۍ او یا غیر سرطاني ناروغۍ ورڅخه پیداشي
 - ☒ **کارسینوم (Carcinoma):** هغه خطرناک پړسوب ته ویل کیږي چې د ایپیتل حجرو څخه منځ ته راځي. د بېلګه په ډول لکه د پروستات، کانسر، د تیوکانسر، د سږي کانسر او د غټو کولموکانسر
 - ☒ **لومفوما او لویکېمي (Lymphoma and Leucamia):** هغه خطرناک پړسوب ته ویل کیږي چې د وینې حجرو او د هډوکو حجرو څخه منځ ته راځي




- ✓ زارکوما (Sarcoma) : هغه خطرناک پړسوب ته ویل کیږي چې د نښلونکو حجرو (connective tissue) او دمپزونښپمال حجرو (Mesenchymal cells) څخه منځ ته راځي.
- ✓ گلیوما (Glioma) : هغه خطرناک پړسوب ته ویل کیږي چې دماغزو گلیا حجرو (Glia cells) څخه منځ ته راځي.
- ✓ جرمینوما (Germinoma) : هغه خطرناک پړسوب ته ویل کیږي چې د جنسي غدو څخه منځ ته راځي. لکه تخمدان (Ovary) او د نارینه جنسي غده (بیضه) تیستیکل (Testicle).

د سرطان هره یوه ناروغي کوم چې د وړانگو په واسطه منځ ته راغلي وي، د سړي د مرګ سبب (لامل) نه ګرځي. د بېلګه په ډول د تایرایډ سرطان څخه په سل کی لس تنه مړه کیږي. د چر نویل هستوي بټۍ په پېښه کې د چا پیريال یوازې یو په سل کې کوچنیان او تنګي ځوانان د تایرایډ په سرطان مړه شول. همدارنګه د سینې سرطان څخه پنځوس په سل کې او د پوستکي سرطان څخه یو په سل کې د مرګ سره مخامخ کیږي.

څرنګه چې دنوموړې ناروغۍ بڼه د سرطان یا نې چنګاش بڼې ته ډیره ورته ښکاري، نو داسې اټکل کیږي چې د دې کبله ورته دسرطان ناروغي نوم ورکړ شوی دی. د بېلګه په ډول په ۱۲۸ شکل کې د پوستکي سرطان هر اړخیز ډولونه ښودل شوي دي چې د چنګاش بڼې ته ډیر ورته والی لري.



۱۲۸- شکل: دپوستکي سرطان ناروغيو دغټید لوهر اړخیزې کلینیکي بڼې(9).



د سرطان ناروغی تعریف (Cancer definition)

د سرطان کلمه یوه عمومي اصطلاح ده او هر ډول ناوړه پړسوب (Tumor) ته ویل کیږي چې دروغتیا په تراوخطرولري او د بدن یوه غړي د ناروغی سبب (لامل) وگرځي. د سرطان حجرې په خپل سر اوپه کنترول نه لرونکي ډول ډیریري چې د هغوی مخ نیوی ډیر گران او یا کله نا شونی تمامیري. دسرطان ناروغی یو واحد ډوله بڼه نه لري بلکه نن ورځ د نوموړې ناروغی تر سلو نه زیات ډولونه پیژندل شوي دي. د بېلگه په ډول لکه د پروستاتا سرطان، د معدې سرطان، د تیوسرطان، د سږي سرطان او نور. دنوموړو ناروغیو تر منځ ډیر توپیرونه شته دي چې په لاندې ډول بیان کیږي:

- دسرطان ناروغی پېښلیک د یوه بل سره توپیر لري
- دسرطان ناروغی پرمختگ دیوه بل سره توپیر لري
- دسرطان ناروغی د درملنې کړنلارې دیوه بل سره توپیر لري
- دسرطان ناروغی د درملنې په تړاو توپیر لرونکی غبرگون ښيي



دسرطان ناروغی د پیژندنې (تشخیص) تخنیکي کړنلارې

د سرطان ناروغی د ځانگړو طبي آلو لکه کمپیوتر توموگراف Computer tomography ، دهستوي طب گاما کمره (Gamma camera) مقناطیسي ریزونانس توموگرافي (Magnetic Resonance tomography)، پوزیټرون امیزون توموگراف (Positron Emmission Tomography) او د اکس وړانکو د عکس اخیستلو او یا په وینه کې د ځینو هارمونو، پروتینو او عنصر د نورمال لیمیت څخه د بدلون په مرسته سره پیژندل کیدای شي.

لومړی: کمپیوترتوموگرافي (Computer tomography = CT)

کمپیوترتوموگرافي (CT) په بدن کې دناروغیو د پیژندلو په موخه د عکس اخیستلویوه خورا مهمه اوترتولو دقیقه کړنلاره ده، چې د یوه ځاگړي کمپیوتر په مرسته سره کارکوي. په نوموړې کړنلاره کې د بدن دننه غړودری بعده (Three dimensional) اکسریز عکسونه تر لاسه کیږي. ددې موخې لپاره ډاکسریزسرچینه په یوه ځانگړي اکسیال محور دناروغ په ساره سطحه راڅرخي اودوه بعده اکسریز عکسونه اخلي. دیوه کمپیوتر په مرسته سره دغه دوه بعده عکسونه په دری بعده اړول کیږي.



په ۱۲۹ شکل کې د نوموړې طبي آلي تخنیکي جوړښت ښودل شوی دی چې دلاندنیو برخونه جوړدی:



۱۲۹- شکل: کمپیوتر توموگرافي (Computer Tomography = CT) دنارو غیو پیژندلو په موخه یوه نامتو طبي آله ده چې دیولر دېدېکتورونو (detectors)، اکسریز سرچینې (X-Ray Tube)، یو کمپیوتر او یو مونیټور (Monitor) څخه جوړه ده. تومو (tomos = slice) یوه یونانی کلمه ده چې دیوه شي په ساره پرې شوې ټوټې ته وايي او گراف (graphein = to write) د لیکلو مانا لري. www.Imaginis.com (75)

- ✓ **د اکسریز تیوب (X-ray tube):** په نوموړې برخه کې داکسریز تو لید کيږي. دنوموړو وړانگو څخه د نارو غیو په پیژندلو او هم د درمل په موخه کار اخیستل کيږي.
- ✓ **گڼ شمیر دیدېکتورونه (electronic detectors):** الکترونیکی دیدیکتورونه چې په یوه دایروي شکله څرخیدونکې فلزي چوکات باندې کلک تړل شوي دي او هغه وړانگې چې د ناروغ د بدن څخه تیریږي، اندازه کوي. په داسې حال کې چې پخوا به د نارو غیو د پیژندلو په موخه داکسریز فلم څخه کار اخیستل کیده، نن ورځ د فلم په ځای نیم هادي دیدیکتورونه په کارول کيږي،
- ✓ **د کمپیوتر سیستم چې ددېدېکتورونو انالوگ (Analog) بریښنايز زیگنالونه په ډیجیټال (Digital imaging) زیگنالونو اړوي** اوله دې کبله د بدن اناتومي په هره یوه سطحه او درې بعدو عکسونو Three dimensional medical reconstruction بدلولاى شي. د بېلگه په ډول لکه د ساره سطحه Transversal plane د سر نه پښو خواته په اوږدو سطحه Longitudinal plane او دڅټ نه مخ خواته په اوږدو سطحه Sagittal plane اونور.




داکسریز تیوب څخه سم سیخ دنوموړو وړانگو یو نری او فوکس شوی بڼل راوړي او دناروغ په بدن باندې لگيږي. څرنګه چې داکسریز وړانگې د بدن په هډوکو، وازده (Lipid) او غوښه کې په توپیر سره جذب کيږي، نو له دې کبله د هغوي نسجونو اکسریز عکس هم دیوه او بل څخه توپیر لري او پیژندل یې آسانه تماميږي. دا ځکه چې داکسریز غبرګون په بدن کې د عنصر ونود اتومي نمبر (Atomic number) او کثافت سره تړاو لري او هغه فزیکي کړنلاره ټاکي، چې په څومره کچه وړانگې په بدن کې جذب او څومره تیرې شي.



۱۳۰- شکل: کله چې ډاکسریزورانګي د عکس اخیستلو په موخه د بدن څخه تیریږي، نو په هډوکو (Bone) کې نسبت د وازدي (Lepid) ، سږي، پاسته نسجونو (Soft tissue) او هوا (Air) په پرتله ډیر جذب کیږي. دا ځکه چې د هډوکو کثافت د نورو نسجونو په پرتله لږ څه دوه ځله لوړ دی. په بني اړخ کې ډاکسریز د شدت کمښت ښودل شوی دی چې د یوه ډیډیکتور په مرسته سره اندا زه کیږي (15).

هغه اکسریز چې د ناروغ بدن څخه تیری شي نوبیا په مخامخ ګڼ شمیر ډیډیکتور ونو لګیږي او هلته دځانګړي الکترونيکي سرکټونو په مرسته سره اندازه کیږي. نوموړي ډیډیکتورونه په یوه ډایروي شکه څرخیدونکي فلزي چوکاټ باندې کلک تړل شويدي، چې د اکسریز تیوب سره په یوه محور او یوځای حرکت کوي. څرنګه چې ټول ډیډیکتورونه اود اکسریز تیوب په یو مرکزي شریک محور سره یوځای، په دری سوه شپيته درجه زاویه (360°C) حرکت کوي، نو د بدن دیوې برخې په ساره پرې شوي پور یا طبقې (Cross section)، چې پنډوالی یی په خپله خوښه ټاکل کیدای شي او لږ څه یو ملي متر ته هم رسیږي دارتسام (Projection) ډیر اناتومي شکلونه لاس ته راځي. دا په دې مانا چې د بدن د یوه ملي متر پنډپور اکسریز عکسونه د دری سوه شپيته اړخونو څخه اخیستل کیږي. په پایله کې د کمپیوټر په مرسته سره د ډیډیکتورونو زیګنالونه داسې اړول کیږي چې په یوه پرده (Screen) باندې د بدن دغړو نه تیری شوي وړانګي په توپیر سره لیدل کیږي.

د بېلګه په ډول هغه غړي چې کثافت یی د یوه نه لوړوي (1g/cm^3) لکه هډوکي سپین رنګ اوکه دیوه نه کوچنی وي (1g/cm^3) لکه هوا او سږي تور رنګ خاڼته غوره کوي.





۱۳۱- شکل: داکسریز په مرسته سره دیوې ښځې په تیو کې د ماما سرطان (Mamma carcinom) پیژندل شوي چې په ښي اړخ اکسریز عکس کې دیوې وېکټور په څوکه ښودل شوی دی. په کین اړخ کې همدغه ناروغي د کمپیوټر توموگرافي (CT) په کرنلاره سره د بدن په یوه سا ره پرې شوې سطحه کې (Cross section) هم ډیره جوته ښکاري.

دویم: مقناطیسي ریزونانس توموگرافي (Magnetic Resonance Imaging = MRI)

مقناطیسي ریزونانس توموگرافي یا (MRI) د پستو نسجونو (Soft tissues) ناروغيو خوپه تیره بیا د عصبي سیستم ناروغيو په پیژندنه (Diagnostic) کې تر ټولو یوه وتلې طبي کرنلاره ده. په نوموړي فزیکي کرنلاره کې د اکسریز په ځای د رادیو څپو (Radio waves) او پیاوړي مقناطیسي ساحو څخه کار اخیستل کیږي.

په لومړي پړاو کې ناروغ دنوموړي آلې یوه دایروي شکه سورې منځ ته ورننه ایستل کیږي چې هلته یوه زوروره مقناطیسي ساحه تولید شوي وي. په لومړي پړاو کې د یوه فریکونس جنراتور سرچینې څخه د رادیو څپې خپرېږي او دناروغ بدن په رڼا کیږي. په دویم پړاو کې د بدن مختلفو نسجونو څخه درادیو څپې جذب کیږي. په دریم پړاو کې همدغه جذب شوي رادیو څپې د هرډول نسجونو څخه بیرته بهرته په توپیر لرونکي انرژي خپرېږي. څرنگه چې دتوپیر لرونکو نسجونو انرژي شپکترم د یوه او بل سره یوشان نه دی، نو دیوې کمپیوټر په مرسته سره کولای شو، چې د یوې ځانګړې نسج اود هغې څخه په ځانګړي ډول خپرې شوو وړانګو تر منځ اړیکې دیوې عکس په بڼه تر لاسه کړو. ۱۳۲ شکل کې د نوموړي آلې جوړښت ښودل شوی دی چې په تخنیکي ډول د یوه ستاتیک مقناطیس (Magnet)، د رادیو څپې یو جنراتور، یولې بریښنايز ګوټکونو (Electrical Coils) او یو پیاوړي کمپیوټر څخه جوړه شویده.



دماگنېټيک ريزونانس آلي ظاهري بڼه بنودل شوې ده چې يوناړوغ د يوه دايروي شکله مقناطيسي په منځ کې د عکس اخيستلو په موخه پروت دی.	دماگنېټيک ريزونانس آلي منځنۍ تخنیکي بڼه بنودل شوې ده چې د ناروغ په چاپيره کې ديولر بريښنايز گوتکونو په مرسته پيدا شوي مقناطيسي ساحه رابښي
	

۱۳۲- شکل: دماگنېټيک ريزونانس آلي تخنیکي جوړښت ديو لړ بريښنايزگوتکونوڅخه جوړدی چې ناروغ ته دراديوڅپي استوي (Transmitter) او همدارنگه هغه الکترومقناطيسي وړانگي چې دناروغ د عکس اخيستلو برخې څخه بيرته خپريږي اندازه کوي (Receiver). (51)


د نوموړي آلي گټور استعمال د کمپيوټر توموگرافي په پرتله دادې چې:

۱- د نوموړي تخنیکي آلي په مرسته سره د بدن اناتومي جوړښت د يوه مقناطيسي عکس په څير په ساره او هم په اوږدو دهری خوا او هرې زاويې څخه د يو ملي متره پنډ والي (1mm thin) په کچه هم اخيستل کيدلای شي .

۲- څرنگه چې په نوموړي آله کې دراديو څپو څخه کار اخيستل کيږي نو له دې کبله بدن ته هيڅ ډول زیان نه رسوي. په داسې حال کې چې په کمپيوټر توموگرافي کې د اکسريز څخه کار اخيستل کيږي اود روغتيا په تړاو ډير د اندېښنې وړ دی.


۳- د بدن ځانگړو نسجونو هر اړخيز پاتولوژي، مورفولوژي او ميتاباليزم بدلون په پيژندلو کې لکه د سرطان نسجونو ډيرکي وېشنه اويا د بدن په التهاب اخته برخو په پيژندلو کې تر ټولو حساسه ځانگړي کړنلاره تشکيلوي.

خو دنوموړي تگلاری (Method) او د کمپيوټر توموگرافي CT تگلاری ترمنځ توپير دادې چې د ماگنېټيک ريزونانس توموگرافي په کړنلاره سره يوازي د بدن هغو برخو عکس اخيستل د ناروغيو د سم او دقيق (Precise) پيژندنې په اړوند خورا ډير گټور گڼل کيږي چې د پستونسجونو (Soft tissues) څخه جوړې وي او يا په بل عبارت هغه نسجونه چې ډيره برخه يې د اوبومرکب په ځان کې ولري. د بېلگه په ډول لکه دسر ما غزه، د بدن شله غوښه او د بدن نورې بې هډوکو برخې. په داسې حال کې



چې د کمپیوتر توموگرافي په کرنلاره سره کولای شو چې د بدن په هډوکو او هم په پستو نسجونو کې د ناروغیو پیژندل سرته رسیږي. څرنګه چې د فزیک نوموړې دواړه کرنلاري خورا حساسې (Sensitive) او د باور وړ کرنلاري پیژندل شوې دي، نو درمل پوهان د یوې ښکمنې ناروغۍ د رښتنونې اود پوره باور ګټلو په موخه د دواړو تګلارو څخه په ګډه سره هم کار اخلي، چې د فوزیون (Fusion) په نامه سره یادېږي .


په ۱۳۳ شکل کې د سرطان ناروغۍ د پیژندل په موخه د کمپیوتر توموگرافي CT او هم ماګنېټیک ریزونانس توموگرافي MRI دواړو تګلارې عکسونه اخیستل شوي او بیا وروسته د یوه او بل سره ویلي (Fusion) شوي دي




۱۳۳- شکل: شي اړخ ته د سر ماغزو ماګنېټیک ریزونانس توموگرافي MRI او چپ اړخ ته د کمپیوتر توموگرافي CT په ساره سطحه پرې شوي (cross section) عکسونه ښودل شوي دي. د سرطان ناروغي په نوموړي عکس کې دسر شي خواته پیژندل شوې او د یوې دایرې (circle) په بڼه پر لیکه شوې ده. که اوس دواړه عکسونه د یوه بل سره پرتله کړو، نو ښکاره ده چې په ماګنېټیک ریزونانس توموگرافي په کرنلاره کې د سرطان ناروغي پوره پیژندل کېږي، خو د کمپیوتر توموگرافي په کرنلاره کې پوره نه شي پیژندل کېدای.

دمقنطایسي ریزونانس توموگرافي فزیکي بنسټ

دمقنطایسي ریزونانس توموگرافي فزیکي بنسټ په دې ولاړ دی چې که د یوې مادې داتومونو په هستوکې د پروتونو او یا نیوترونو شمیر یو ټاک عدد (شمیره) وي، نو په طبیعي ډول دخپل محور په شاوخوا یو څرخیدونکی حرکت تر سره کوي، چې د هستې سپین (Nuclear spin) په نامه سره یادېږي. داتوم هسته د پروتون او نیوترون څخه جوړه ده چې نوموړو ذرو ته نوکلیون هم ویل کېږي. د نوکلیونو نوموړې حرکت چې دلته به د هستې سپین (Nuclear spin) په ځای **دهستې څرخیدل** نوم




ورکړو په ورځني ژوند کې د کوچنيانو دلوبې کولوبوې آلې سره ورته بېلگه کېدای شي، چې د سيلی يا لاتو Top په نوم سره يادېږي. دلوبې کولو يوه داسې لاتو چې د ځمکې جاذبې قوې تراغيزې لاندې يو څرخيدونکی حرکت تر سره کوي په ۱۳۴ شکل کې ښودل شوي ده.



۱۳۴- شکل: دځمکې پر مخ يوه سيلی يا لاتو (Top) ديوې خوا په خپل محور تاوېږي (Spin) او دبلې خوا دځمکې د جاذبې قوې په اساس د عمودي محور په شاوخوا يو څرخيدونکی حرکت يانې پريچيسيون موشن (precession motion) هم تر سره کوي(75).

	الف شکل: دهستي دوه قطبه مقناطيسي (Magnetic dipole) په خپل محور باندې را څرخي چې دهستي سپين (Spin) په نوم يادېږي
	ب شکل: کله چې د باندې خواڅخه کومه مقناطيسي ساحه په يوه ماده اغيزه و نه کړي، نو داتوم هستې دوه قطبه مقناطيسونه هرې خواته د يو احساوي وېشتوب له مخې خواره واره پراته وي
	ج شکل: خو کله چې د باندې خواڅخه يوه مقناطيسي ساحه په يوه ماده اغيزه وکړي، نو داتوم هستې دوه قطبه مقناطيسونه د باندنۍ مقناطيسي ساحې د ليکو په اوږدو کې موازي (Parallel) شکل غوره کوي. نوموړې هستې ديوې خوا په خپل محور راڅرخي او دبلې خوا د مقناطيسي ساحې په چاپېره هم يو گرزيدونکی حرکت تر سره کوي. (شمال = N او جنوب = S)

په ۱۳۵ - الف شکل: په پورتنۍ شکل کې د يو نوکليون څرخيدونکی حرکت ښودل شوی دی. د اتوم په هسته کې نيوترونه او پروتونه د انرژي په ټاکلو مدارونو کې پراته دي او په خپل محور څرخېږي. ټول هغه اتومونه چې د هغوی په هستو کې د پروتونو او نيوترونو شمير يو جوت عدد وي (Even number) د هستې څرخيدل (سپين) يې صفر قيمت لري. دا ځکه چې د يونوکليون څرخيدلو ویکتور سمت پورته




خواته او دېل نوکليون څرخيدلو ویکتور سمت بنکته خواته دی يانې د يو بل سره مخالف سمت لري، نو له دې کبله دهغوي د څرخيدلو (سپين) ویکتور مجموعه خنثي کيږي اود ویکتور مطلقه قيمت يې د صفر سره مساوي کيږي. خو ټول هغه اتومونه چې په هستو کې د پروتونو او نيوترونو شمير يو تاک عدد وي نو د خپل ځان لپاره يوځانگړی فزيکي کميت لری چې د هستي سپين (Nuclear spin) ورته ويل کيږي. نوموړی مطلب په لنډ ډول داسې ليکو:

◀ يوازې هغه اتومونه چې په هسته کې د نوکليونو تاک شمير (Odd number) ولري د هستي څرخيدنې (Nuclear spin) خاوندان دي او قيمت يې د صفر سره برابر نه دی. هغه اتومونه چې نوموړي خواص ولري او په بدن کې په زياته کچه شتون لري عبارت دي له: **هايډروجن**، **نايتروجن**، **سوديم** او **فوسفور**. خو په نوموړو ټولو اتومونو کې ډيرکې برخه هايډروجن تشکيلوي. نو له دې کبله د هستي څرخيدلو په کړنلاره کې د عکس اخيستلو په موخه يوازې د هايډروجن اتوم پروتون ونډه لري.

◀ په عادی حالت کې، يا ني بې له مقناطيسي ساحې څخه، د بدن د نوموړو هستونو کليونونه د خپل محوري په شاوخوا، او د فضا په يوه نا ټاکلې سمت کې په غسر منظم ډول څرخيږي. د بېلگه په ډول په ۱۳۵- **ب شکل** کې يوه ماده بنودل شوې ده، چې د هستي څرخيدلو ویکتورونو څوکي يې د يوه احساوي وېشتوب له مخې هرې خواته خواږې واري دي او دهستي څرخيدنې وکتورونو (Vectors) سمتونه موازي شکل نه لري

◀ کله چې يو پروتون او يونيوترون په خپل محور څرخيږي، نو په پايله کې يو مقناطيسي دوه قطبه مومېنت چې د μ په توري سره يې بڼيو، ورسره پخپله منځ ته راځي. دا په دې مانا چې داتوم هستي لکه کوچني مقناطيسونه دي، چې په خپل محور څرخيږي. د بلې خوا هريو اتوم خپل ځانته يو ټاکلې فريکونسي لري، دا ځکه چې د هغوی مقناطيسي مومنت د يوه بل څخه توپير لري. نوموړی مقناطيسي مومنت په خپل وار سره يوه مقناطيسي ساحه (B_{nuc}) توليدوي. د بېلگه په ډول د اوبو (H_2O) ماليکول د هايډروجن اتوم پروتون په طبيعي ډول سره يو مقناطيسي مومېنت (Magnetic moment) لري، چې که په يوه مقناطيسي ساحه B کې کيښودل شي، نو ډيوټنسيلي انرژي (E_{pot}) خاوند کيږي. د هايډروجن هستي نوموړې انرژي د هغه د مقناطيسي مومېنت μ او د باندنۍ مقناطيسي ساحې B د شدت سره سم سيخ متنا سب ده يانې ($E_{Pot} = \mu B$). که څه هم د هايډروجن اتوم هسته يوه کمزورې مقناطيس لري، خو په عادي حالت کې د انسان بدن پخپله، که څه هم ډيره برخه يې د هايډروجن اتوم څخه جوړه ده، په مجموع کې مقناطيسي خاصيت نه بڼي. دا ځکه چې په بدن کې د هايډروجن اتوم هستي په ملياردونو مقناطيسي دوه قطبونه (Magnetic Dipoles) يا مقناطيسي ډيپول په نا منظم توگه سره خواږه واره پراته دي او محصله مقناطيسي ډيپول مومنت يې صفر دی.

◀ خو کله چې د بدن نوموړي مقناطيسي ډيپولونه په يوه بهرنۍ ستاتيک مقناطيسي ساحه (B) کې کيښودل شي، نو دنوموړې ساحې او د هستي مقناطيسي ساحې (B_{nuc}) تر منځ غبرگون منځ ته راځي او په پايله کې د هايډروجن اتوم هستي مقناطيسي سمت سم سيخ کيږي (۱۳۵ ج شکل).





د بدن اتومونو هغه هستې چې دڅرخېدنې یانې (Spins) قیمت یې دصفر سره مساوي نه وي، نود هغوي مقناطیسي دوه قطبونه د باندنۍ مقناطیسي ساحې د لیکو په اوږدوکې موازي (Parallel) شکل غوره کوي اود څرخیدلو سمت یې، د باندنۍ مقناطیس شمال څخه جنوب خواته سمیږي. په داسې حال کې چې د هایدروجن اتوم ځینې نورې هستې هم شته دي، چې دهغوی مقناطیسي دوه قطبونه د باندنۍ مقناطیسي ساحې په اوږدوکې ضد موازي (Antiparallel) شکل ځانته غوره کوي. دا په دې مانا چې د نوموړو هستود څرخیدلو سمت د باندنۍ مقناطیسي ساحې د جنوب څخه شمال خوا ته سمیږي. په ۱۳۵ ج شکل کې د هستو مقناطیسي دوه قطبونو موازي او ضد موازي څرخیدنې ښودل شوي دي.

د بېلگه په ډول که چیرته د تودوخي درجه 37°C اود باندنۍ مقناطیسي ساحې شدت یو تیسلا (1Tesla) و منو، نود هایدروجن اتوم هستو موازي څرخیدنې د ضد موازي څرخیدنې په پرتله لږ څه اووه برخې په ملیون تشکیلوي (7 ppm). دا په دې مانا چې د بدن یوې برخې د یو ملیون اتومونو څخه یوازې اووه اتومونو شته دي، چې دهغوي مقناطیسي دوه قطبونه موازي شکل لري اود هغوي د پوتنسیلي انرژي زیگنال د اندازه کولو وړ دی. د یو ملیون اتومونو څخه ټول هغه هستې چې د هغوی دهستې څرخیدلو وکتورونه، په یوه سمت کې پراته وي، سره جمع کیږي، اوتول هغه وکتورونه چې د یو بل سره مخالف سمت ولري، مجموعه یې خنثی کیږي. په پایله کې یوازې اووه هستې پاتې کیږي، چې د هغوي په مرسته سره د ماگنېټیک ریزونانس کړنلاره سر ته رسیږي. ددغواووه هستودڅرخیدنې مجموعي مقناطیسي زیگنالونوڅخه د عکس اخیستلو په موخه کار اخیستل کیږي. دنوموړو اووهستو مقناطیسي انرژي اندازه کول په تخنیکي لحاظ ډیر سخت تمامیږي، اوددې اړتیا لیدل کیږي چې په زرگونو ځله زور ورته شي. دې خوا په نسجونو کې داتوم هستې په ځانگړي توگه نه بلکه په یوه کیمیاوي مرکب کې خوندي پټې شوې وي. د بېلگه په ډول یو ملي متر مکعب او به $(1\text{mm}^3 \text{H}_2\text{O})$ لږ څه اووه ضرب د لس په طاقت د نونس $(6,7 \times 10^{19} \text{ protons/mm}^3)$ پرو تو نونه لري.

د لارمور فریکونسي (ω_L = Larmor frequency)

که چیرته بدن په یوه برخه کې چې هلته پوره هایدروجن موجودوي، دباندې خوا څخه دوخت په تړاو یوه ثابته او ډیره زوروره مقناطیسي ساحه B، چې قیمت یې د بېلگه په ډول د ځمکې د مقناطیسي ساحې په پرتله یو زرځله لوړوي، په کارواچول شي نو د همغې برخې پروتونونو (H^+) مقناطیسي مومنټ یو ټاکلې موازي سمت ځانته غوره کوي (Alignment). په دې ترڅ کې د هایدروجن اتوم هسته په یوه وخت کې دوه ډوله حرکتونه تر سره کوي. لومړې داچې په خپل محور باندې څرخيږي (Spin) دوهم دا چې دهایدروجن اتوم هریو پروتون (H^+) د باندنۍ مقناطیسي ساحې د لیکو په شاوخوا په یوه ټاکلې فریکونسي (frequency) سره یو څرخیدونکی حرکت پیل کوي. نوموړی څرخیدونکی حرکت د یوې سیلې سره ورته دی او له دې کبله ورته د پریسیزیون موشن (precession motion) یانې د سیلې حرکت او په یوه ثانیه کې د څرخیدلو شمیرته د څیرونکو هستود پریسیزیون فریکونسي (precession frequency) په نامه سره یادېږي.




۱۳۶- د شکل: دیوې هستې دوه قطبه مقناطیس په خپل محور را څرخي (Spin) او هم ورسره جوت د باندنۍ مقناطیسي ساحې H په چاپیره یو گرزیدونکی پرې سیسیون (precession motion) حرکت تر سره کوي (51)

داتوم هستود پرېسیزیون فریکوېنسي (precession frequency) چې د بهرنۍ مقناطیسي (B) ساحې لیکو په شاوخوا یې سرته رسوي، یو بل نوم هم ورکړشوی دی او د لارمور فریکوېنسي (Larmor frequency = ω_L) په نامه سره یادېږي. نوموړی فریکوېنسي په همغه کچه نور هم زیاتېږي، څومره چې د بهرنۍ مقناطیسي (B) ساحې شدت زیاتېږي. دا په دې مانا چې د لارمور فریکوېنسي د بهرنۍ مقناطیس (B) د شدت سره سم سیخ متناسب دی اود یو بل سره لاندنۍ اړیکې لري.


$\omega_L = \gamma \times B$	
$\omega_L =$	دبهرنۍ مقناطیسي ساحې B په شاوخوا د هستو پرېسیزیون فریکوېنسي
$B =$	د بهرنۍ مقناطیسي ساحې قوه
$\gamma =$	د هر یو اټوم هستې لپاره یوه ځانګړې ثابته ده
د بېلګه په ډول د پروتون لپاره چې بهرنۍ مقناطیسي ساحه یې یو تیسلا (T) قیمت ولري لږ څه دوه څلوېښت مېگا هرڅ ده (42,6 MHz/T). دا په دې مانا چې یو پروتون په یوه ثانیه کې لږڅه دوه څلوېښت ملیونه ځله د بهرنۍ مقناطیسي ساحې په شاوخوا راڅرخېږي.	

دهستي ریزونانس (Nuclear Resonance)

کله چې یوناروغ د MRI آلې منځ ته ور ننه ایستل شي نود شاوخوا ثابتې مقناطیسي ساحې په مرسته سره دهایدروجن هستې پروتون (H^+) مقناطیسي دوه قطبه مومنټ سم سیخ کېږي، اود لارمور په فریکوېنسي سره (42 MHz) د مقناطیسي ساحې په چاپیره راڅرخېږي. که چېرته اوس دیوه بریښنايز ګوټک په مرسته سره، چې د فریکونس جنراتور سرچینې سره تړلې ده، الکترومقناطیسي څپې د ناروغ بدن ته ولېږل شي، چې کټ مټ همغه فریکوېنسي ولري، لکه دهایدروجن هستې د پروتون مقناطیسي دوه قطبه مومنټ یانې دوه څلوېښت میگا هرڅ فریکوېنسي قیمت ولري، نو د انرژي راکړه ورکړه کېدلای شي. نوکله چې د لوړ فریکوېنسي جنراتور او په بدن کې دپروتونو څرخیدونکی فریکونس سره یو شان شي، نو د ریزونانس (Resonance) حالت منځ ته راځي.




په ۱۳۷ شکل کې د ریزونانس فزیکي پېښه د دوو موټرو د سرعت سره پر تله شوې ده. د بېلگه په ډول د انرژي راکړه ورکړه د دوو موټرچلوونکو تر منځ هغه وخت تر سره کېدای شي چې ددواړو موټرونو سرعت سره یو شان وي.




۱۳۷- شکل: ددواړو موټرچلوونکو ترمنځ د انرژي (Energy exchange) او یا دیوه شي راکړه ورکړه په هغه صورت کې تر سره کېدای شي چې د هغوی د موټرو سرعت سره یو شان وي (9).

په دې ترڅ کې د هایدروجن اتوم سم سیخ شوي هستوي مقناطیسونه، د نوموړي لوړ فریکونسي سرچینې څخه انرژي تر لاسه کوي اوله دې کبله د موازي سمت څخه لکه د صفر درجې زاويې (0°) څخه، د ضد موازي سمت خوا ته لکه یو سلواتیا درجې زاويې (180°) ته را اوړي، یانې سرچینه کیږي. نوموړي فزیکي کړنلاره په ۱۳۸ شکل کې ښودل شوې ده.



۱۳۸ - شکل: کله چې د اتوم هستې دوه قطبه مقناطیس ته د باندې خوا څخه انرژي ورکړه شي نو خپل اوسنی موازي (Parallel) څرخېدونکی پرې سیسیون حرکت (0°) سمت بدلوي، او سر په پښو خواته (180°) یانې موازي ضد (Anti parallel) څرخېدونکی حرکت غوره کوي (51)

کله چې دراديو څپې د ناروغ په بدن ولگيږي نو د هایدروجن اتوم پروتونه د ټیټې انرژي مدار څخه د انرژي یوه لوړ مدار ته پورته کوي. دا ځکه چې دنوموړو وړانگو شپکترم څخه یو داسې فوتون ځان ته




را جذب کوي چې مساعده انرژي ولري. په دې ترڅو کې د هایدروجن اټوم هسته تر هغه وخته پورې د تحریک په حالت کې پاتې کیږي ترڅو چې د باندنۍ سرچینې څخه د رادیو څپې زیځنوالونه ورته رسېږي. څرنګه چې د اټوم په هسته کې لکه د اټوم د پوښ (Atom shell) په شان هم دانرژي مدارونه شته دي، نو دغه ګڼلاره د اټوم د مدارونو سره ورته ده یا نې کله چې یو الکترون د بېلګه په ډول لکه د K مدار الکترون یو فوتون جذب کړي نو د L یا سني مدار ته پورته خپري. خو کله چې بیرته خپل پخواني مدار ته روالوېږي، نو د نوموړو مدارونو د انرژي توپیر د الکترومقناطیسي وړانګې په شکل خپروي. د هایدروجن اټوم په هسته کې هم نوموړې ګڼلاره تر سره کیږي.

څرنګه چې اوس د هایدروجن اټوم هسته په یوه هیجاني حالت کې قرار لري (پریوځي) نو ډیر زیار وباسي چې دغه جذب شوې انرژي بیرته دځان څخه لیرې کړي. نوموړې پېښه هغه وخت پیل کیږي چې د الکترومقناطیسي څپو باندنۍ سرچینه ورڅخه بیرته لیرې شي، نو د هایدروجن هستو مقناطیسي مومنت بیرته خپل پخواني سمت خواته را ګرځي، او په دې ترڅو کې د رادیو څپو په ساحه کې الکترومقناطیسي وړانګې د ناروغ د بدن څخه خپریږي. نوموړې وړانګې د یوه بریښنايز ګوټک (Electrical Coil) په مرسته سره اندازه کیږي چې په ۱۳۹ شکل کې ښودل شوی دی. په اخیر کې د هایدروجن هستې همغه اضافګي انرژي د الکترو مقناطیسي څپو په څیر د لاسه ورکوي کوم چې لوړ فریکونس جنراتور څخه یې تر مخه جذب کړي وه. نوموړې ګڼلارې ته په فزیک کې ماګنېټیک ریزونانس شپېکټروسکوپي (Spectroscopy) هم ویل کیږي، داځکه چې د نوموړو وړانګو په مرسته سره د همدغه ځای نسجونو د هایدروجن هستو کثافت ویشټوب اوشاخوا کیمیاوي مرکباتو جوړښت په هکله مالومات تر لاسه کیږي. همدا سبب (لامل) دی چې د هایدروجن هستې کثافت د ویشټوب سره سم، د بدن هر ډول نسجونو ترمنځ توپیر لرونکي شپېکټروسکوپي عکسونه لاس ته راځي. د بېلګه په ډول که د باندنۍ مقناطیسي ساحې شدت یو تیسلا (Tesla) وټاکل شي نو د هایدروجن اټوم هستې څخه خپري شوې وړانګې چې د ډیکټورونو په مرسته اندازه کیږي لږ څه څلوېښت مېگا هرڅ (40 MHz) قیمت لري.

دلور فریکونسي جنراتور سرکټ (High-frequency generator circuit)


د الکترومقناطیسي وړانګو سرچینه یو لوړ فریکونسي جنراتور او یو بریښنايز ګوټک تشکیلوي چې ټول د یوه بریښنايز سرکټ په شکل سره تړلي دي. په نوموړي سرکټ کې د بریښنايز ګوټک د الکترومقناطیسي وړانګو لیږونکي یانې ټرانسمیټر (Transmitter) په ډول کارکوي، چې د جنراتور لوړ فریکونسي زیځنوالونه (Signals) د بدن هغو برخو ته استوي چې هلته د ناروغیو ډیپرنډلویه موخه ټاکل شوې وي. دغه بریښنايز ګوټک د رادیو سټیشن (Radio station) سره ورته دی چې د یوې خوا د رادیو څپې استوي او د بلې خوا یې بیرته رانیسي (Receive). د همدغه بریښنايز ګوټک په مرسته سره هغه زیځنوالونه اندازه کیږي چې د بدن څخه راوړي. د نوموړي زیځنال څپې د ټرانسمیټر څپې سره یو شان، خو امپلیتود (Amplitude) یې ډیر کوچنی وي او په دې پورې اړه لري چې په څومره شمیر پروتونه په نوموړي ګڼلاره کې برخه اخلي او په هیجان راغلي دي (Excitation). په نوموړي سرکټ کې بریښنايز ګوټک د یو ډیکټور (Detector) دنده په غاړه اخلي چې په لومړي ځل د زیځنال ټرانسمیټر (Transmitter) اوبیا په دوهم ځل د زیځنال رانیوونکي (Receiver) په صفت کار ورکوي. په ۱۳۹ شکل کې د ټرانسمیټر زیځنال او رانیوونکي زیځنال ښودل شوی دی.




۱۳۹- شکل: د مګنېټیک ریزونانس په کرنلاره کې د یوه جنراتور څخه دراديو څپې یو زیګنال دناروغ بدن ته استول کېږي او بیا انعکاس شوی زیګنال اندازه کېږي. دراديو څپې دواړه لیږونکي (Transmitter) او بیرته رانیوونکي (Receiver) زیګنال د یوه برېښنايز ګوټک په مرسته سره اندازه کېږي. (51)

دا څرګنده ده چې رانیوونکي زیګنال د لیږونکي زیګنال په پرتله ډیر کوچنی وي او له دې کبله باید په زرګونو واړه زورور شي تر څو د اندازې کولو وړ وګرزي.

په ۱۴۰ شکل کې د یوې مقناطیسي ریزونانس توموګرافي آلې یوه بڼه شول شوې ده.




۱۴۰- شکل د مګنېټیک ریزونانس (MRI) په مرسته سره د ناروغ په ماغزو کې د سرطان ناروغۍ میټاستاز (Metastase) پیژندل شوې ده.




د سرطان ناروغۍ د پیژندلو لومړني پړاونه

سرطان یوه داسې ناروغي ده چې په پیل کې د بدن په یوه روغه او عادي حجره (ژونکه) کې د نا څرګنده علتونو په بنسټ د موتیشن (Mutation) بدلون منځ ته راځي او په پایله کې بیا دغه حجره (ژونکه) په خپل سر او دکنترول نه وتلې ویښل کیږي. په لومړي پړاو کې د روغې او ناروغي حجرې تر منځ توپیر پیژندل ډیر سخت تمامیږي. خو د سرطان یوه داسې د کنترول څخه وتلې ځانګړې حجره (ژونکه) د وخت په تیریدلو سره ګڼ شمیر نورې نوې حجرې پیدا کوي، چې د بدن همغه برخه پرسیري. دغه ډول پرسوب د تومور (tumour) او یا کانسر (cancer) په نامه سره یا ډیري. کله چې د کانسر حجرو شمیر د یوه ټاکلي کچې او یا حجم څخه واورې، نو بیا وروسته دنوموړو طبي آلو لکه کمپیوټر توموګرافي، اکسریز او ماګنېټیک ریزونانس توموګرافي په مرسته سره پیژندل کیدلای شي. په ۱۴۱ شکل کې د سرطان حجرو شمیر د نوموړو حجرو د ویش شمیرو په تابع سره ښودل شوی دی. په کلینیکي تړاو د سرطان ناروغي د عکس اخیستونکو طبي الوپه مرسته سره یوازې هغه وخت پیژندل کیدای شي چې غټوالی یې لږ څه یو سانتي متر قطر ته ورسیري.



۱۴۱- شکل: په عمودي محور کې، د سرطان ناروغي د حجرو د ویش شمیرو، او په افقي محور کې دنوموړې ناروغي کلینیکي نښانې، د وخت په تیریدلو او د حجرو د ویش شمیرو (Mitose) شمیر ښودل شوي دي. د بیلګې په ډول د حجرو تر لږ څه دیر ځله ویش شوی پورې یو مخکنی کلینیکي پړاو ترسره کیږي، چې میاشتي او کالونه وخت نیسي. دنوموړي وخت څخه وروسته یانې د حجرو د دیر شوځلو ویش شوی وروسته کلینیکي پړاو پیل کیږي او یوه ناروغي د غټوالي اونورو کلینیکي ګڼلارو په مرسته پیژندل کیدای شي (9).



دېبلگه په ډول که و منو چې دوخت په اړوند د سرطان نسجونو غټوالی د یوه اکسپوننسیال تابع (Exponential) په بڼه سترېږي، نومیاشتي او کالونه تیرېږي تر څو قطر یې لږڅه یو سانتي متر قیمت ځانته غوره کړي. په دې ترڅ کې د پیدا شوو حجرو شمیر، لږڅه لس ملیونو ته (10 Millions) رسیږي. ددې لپاره چې د سرطان نسجونه دیو سانتي متر په کچه غټ شي، نو ورته ضرور ده چې د میتوز په هره یوه ویشنه کې خپل حجم لږ څه دیرش ځله ډبل (Redoubling) کړي. کله چې د سرطان ناروغی غټوالی یوه ګرام ته ورسېږي نو د حجرو شمیر یې لږ څه یو ملیارد اټکل کېږي. د سرطان ځینې ناروغی شته دي چې تر څو لیدلو وړ پړاو ته رسیږي، نو د پړوخت لکه میاشتي او کالونه ورته په کاردې او دهغې نه تر مخه یې پیژندل ډیر سخت تمامیږي (8)


د سرطان نسجونو هیستولوژي (Histology) او مورفولوژي (Morphology) بڼه

هیستو لوژي یوه یوناني کلمه ده، چې مانا یې په ډیره نری (Thin slices) کچه د نسجونو پرې کول دي. مورفولوژي دسانسکریت (Sanskrit) ژبې یوه کلمه ده چې د نسجونو مینځنۍ جوړښت او اناتومي بڼه تر څیړنې لاندې نیسي. ډېدن هغه غړې او یا نسجونه چې د سرطان ناروغی شک ور باندې کیږي او پرسیډلي بڼه ولري، لکه بڼه ډوله پړسوب (Benign tumor) او ناوړه پړسوب (Malign tumor)، نو په لومړي ګام کې د هیستولوژي تګلارې په مرسته تر پلټنې لاندې نیول کیږي.

د سرطان ناروغی دپیژندنې او تشخیص په موخه ډېدن هغه برخې څخه چې د سرطان او یا نورو ناروغیو شک ور باندې کیږي، د عملیاتو په ګرځول سره یوه برخه نسجونه پرې کیږي. نوموړې ګرځولارې ته بیوپسي (Biopsy) ویل کیږي. د غه نسجونه دپاتولوژي ډاکټر (Pathologist) له خوا په یوه هیستولوژي لابراتوار کې دځانګړو تګلارو (Methods) په مرسته سره لکه د نسجونو اوښتون عملیه (Tissue processing)، ټینګول - فیکسیشن (Fixation)، ننه ایستل - امبېډینګ (Embedding)، ټوټه کول (Sectioning)، کنګل کول (Frozen section)، رنګول - سټینینګ (Staining) او په پایله کې د یوه مایکروسکوپ (Microscope) لاندې تر پلټنې لاندې نیول کیږي.

د نسجونو ټینګه ساتنه (Fixation)

د نوموړې ګرځولارې موخه داده چې نسجونه دیوې خوا دتل لپاره په خپل لومړني بیوکیمیاوي حالت کې خوندي وساتل شي او په میخانیکي ډول کلک پاتې شي او د بلې خوا په طبیعي چاپیریال کې ځانته دانزایمو رانیوولو په پایله کې د نسجونو په خپل سر تجزي (Enzyme Autolysis) مخنیوی وشي. نوموړې پروسه باید چې د نسجونو د عملیاتو څخه وروسته سمدلاسه ترسره شي، ترڅو د باکټریاوو، وایرسونو او نورو ناروګیمیاوي اغیزوله کبله، نسجونه خراب نه شي او د خوسا کیدو څخه خوندي پاتې شي. د نسجونو ټینګ ساتنې لپاره لاندینيو موادو څخه کار اخیستل کیږي. لکه فورم الډیهید (formaldehyde)، میرکیوریک کلوراید (mercuric chloride)، میتانول (Methanol)، پوتاسیم پرمنگانات (Potassium permanganate) او نور.



د بیلکه په ډول د بیوپسی نسجونه میخانیکي او بیوکیماوي کلکوالي د ساتنې په موخه دلس په سلو کې فورمالین (Formalin) څخه کار اخیستل کیږي .

1: Organ dissection 2: Tissues embedding 3: Paraffinblock 4: Staining 5: Histological slices
Kidney cancer in paraffin (View under microscope)



دهیستولوژي نموني يوه توتېه ۳- نسجونه په کنگل ۲- نسجونه په مایع شوي ۱- د یوه غري پرې
تر مایکروسکوپ لاندې لیدل شوی پارافین بلاک کې پارافینو کې ډوب کیږي شوي برخه
کیږي.

په پارافین کې دنسجونونه ایستل (Tissues embedding in paraffin)


ددې لپاره چې دنسجونو میخانیکي کلکوالی ډیر شي او بیا یې په اسانۍ سره پرې کړای شو، نو په تاودو اومايع شويو پارافینو کې لمبول (ډوب) کیږي. په نوموړې کړنلاره کې دالکولوپه مرسته سره، چې غلظت یې پرلپسې پینځه اویا، پینځه نوي او سل په سل کې وي (75%;95%;100% Alcohols)، دنسجونو څخه پرلپسې اوبه ایستل کیږي (Dehydration). په ورپسې پړاو کې، دیوې بلې کیمیاوي مادې، یانې کسولین (Xylene) په کارولو سره، الکول دنسجونو دمنځ څخه بیرته ایستل کیږي. په پایله کې نسجونه پاک، شفاف او روڼ (Clearing) شکل ځان ته غوره کوي. **دکسولین کیمیاوي مواد** دپیټرولوڅخه تر لاسه کیږي.

د نسجونو پرې کول (Tissues sectioning)

ددې موخې لپاره چې دنسجونو څخه ډیرې نرۍ توتې تر لاسه شي، نو په پارافینو کې ننه ایستل شوي نسجونه د لږ څه منفي اویا درجوساتی گراد (-70°C) په شاوخوا کې ساړه ساتل کیږي. ورپسې دیوه تیره چاقو ډوله آلې په مرسته سره، چې د مایکروټوم (Microtome) په نامه یادېږي، دپارافینو بلاکونه په کوچنیو برخو پرې کیږي. دنسجونو هغه نري پرې شوې توتې، چې دناروغیود تشخیص په موخه د شیشه یي سلايد (Glas Slides) پر مخ د مایکروسکوپ لاندې لیدل کیږي، پنډوالی یې ددریو مایکرون نه تر لسو مایکرون (3-10 microns) پورې دارتیا سره سم ټاکل کیږي.


د نسجونو رنګول (Staining)

ددې لپاره چې دیوې حجرې ټولې برخې لکه د حجرې هسته، د حجرې سیتوپلازما (Cytoplasm) اونور په توپیر سره وپېژندلای شو، نودنسجونو رنګولو ته اړتیا پیدا کیږي. دنوموړې موخې لپاره په لوموړي پړاو کې دنسجونو په مینځ کې کارول شوی پارافین موم (Paraffin wax) باید بیرته لیرې شي (Deparaffinization). دغه کړنلاره پرلپسې د کسولین، الکول اویا داوبو په کارولو سره سرته رسیږي. په هیستولوژي کې د نسجونو رنګولونامتومواد هیماتوکسیلین (Hematoxylin=H) او ای اوزین (Eosin = E) مواد تشکیلوي. دبیلګه په توګه هیماتوکسیلین د حجرې هستې (Nuclei) ته اسماني رنګ



اواي اوزين دحجري سيتو پلازم (Cytoplasm) ته **کلابي** اويا **سور رنگ** ورکوي. په پايله کې د يوه مايکروسکوپ په مرسته د نوموړو حجرو مورفولوژي بدلون تر څيرني لاندې نيول کيږي.

Haematoxylin and Eosin (H&E) stained lung tissues of emphysema patient
دايمفوزيما ناروغ دسري نسجونو ته دهيماتوکسپلين او اي اوزين موادو په مرسته رنگ ورکړ شوی دی








د يوه ناروغ سري د سري نسجونو هيستولوژي بڼه ښودل شوې ده چې د ايمفوزيما emphysema په ناروغۍ اخته دی. دحجرو هستي اسماني-ارغواني رنگ، دويني سره کرويات **سور رنگ**، دحجري بهرني مواد (Extracellular) مواد **کلابي رنگ** او دهوا برخې سپين رنگ لري (71)



دسرطان حجروسيټولوژي (Cytology) او مورفولوژي (Morphology) خواص

- د نورمال حجري په پرتله د سرطان حجري هر اړخيز بڼه (Cell polymorphy) 
- د هستوهر اړخيز بڼه، غټوالي او ډولونه (Nuclear polymorphy; atypia) 
- دهستوهر اړخيز اويا خورا ډير رنگ کيدل (Polychromasia; Hyperchromasia) 
- دهستي او سيتو پلازما غټوالي په تناسب کې ډير توپير ليدل کيږي 
- د سرطان حجره (ژونکه) د يوې هستې په ځای ډيرې هستې هم لرلای شي (Poly nucleus) 
- د کروموزوم شميرې د نورمال حجري سره توپير لري اويا نيمگري وي (Aneuploidy) 


د بېلگه په ډول په ۱۴۲ شکل کې د ويني يوډول سرطان (CML) هيستولوژي بڼه شودل شوې ده. د نوموړي ناروغۍ سبب (لامل) دادی چې د هډوکو په ماغزو کې د يوې خوا دارتيا نه ډير کرويات لکه گرانولوخيټ Granulocytes توليد کيږي او دبلي خوا نوموړي کرويات په سپينو کروياتو نه اوږي ياني د پوځوالي پړاو ته نه رسيږي. نوموړي کرويات چې د بلاست په نامه سره ياديږي Blasts کومه ځانگړې دنده نه شي تر سره کولای او دگټې په ځای بدن ته د زهريو سرچينه گرزي.




نورمال حجرې	د سرطان حجرو مورفولوژي او هيستولوژي خواص
	د سرطان په ناروغۍ کې د اړتيا څخه ډيرې حجرې ویشل کيږي
	د سرطان حجرې هسته دنورمال حجرې په پرتله غټه کيږي او اناتومي بڼه يې تغير کوي
	د سيتوپلازم حجم د هستې په پرتله ډير کوچنی وي
	د سرطان حجرو تر منځ مورفولوژي بڼه او غټوالی يوشان نه وي
	د سرطان حجره (ژونکه) خپل ټاکلی نورمال اناتومي او هيستولوژي شکل دلاسه ورکوي
	د سرطان حجرې په ډير غير منظم شکل سره هرې خوا خورې ورې پرتې وي
	د تومور سرحدې پوله په بشپړ توګه نه ښکاري








۱۴۲ شکل: په کين اړخ کې دويني سپينو کروياتو عادي هيستولوژي بڼه او په بني اړخ کې دويني سرطان (CML) يوه هيستولوژي بڼه ښودل شوې ده. په بني اړخ کې د گرانولوخيټو Granulocytes شمير د کين اړخ په پرتله ډير ليدل کيږي چې په ارغواني نيلي رنگ سره ښودل شوي دي.



۱۴۳ شکل: د سرطان حجري (Tumor) د نورمال روغو حجرو (Normal cells) سره يوځای ښودل شوي دي (39) د تومور حجرو مورفولوژي بڼه د نورمال حجرو سره ښکاره توپير لري.




	
درحم سرطان: دهستورنگ خورادير Hyperchromasia او غتوالی يی توپير لري Polymorphism ، سيتو پلازما سپين بخون بازوفيل basophil رنگ لري اودپلاتين اپيتل سرطان حجروپه منځ کي گن شميرسپين کرويآت ليدل کيږي.	دتايريد سرطان: دحجروجوربنت او غتوالی پوشان نه دی (Polymorphism) ، ډيري اوتوپيرلرونکي هستي ليدل کيږي (Anisokaryosis) درنگ ډول H.E.
	
دپوستکي سرطان هيستولوژي بڼه بنودل شوي ده چې گن شميرحجري ديوې ليکي په شکل او ډيري نږدي سره پرته دي او د هرې خوا څخه ديوې (Basal membran) باډال غشا څخه احاطه شوي دي	دپوستکي سرطان (Basalioma) : تر سترگي لاندې دايروي شکله تومور ليدل کيږي چې په منځ کي ېې خنډنه برخه ده اوپرسيدلی دی (Ulceration)




د بدن یوې نورمال حجرې جوړښت

د هر سړي بدن د بیلینونو (Billions) حجرو څخه جوړ شوی دی چې د ژوند په اوږدو کې دارتیا سره سم دخپل ځان څخه یوه کاپي کولای شي او یا دا چې په نورو نويو حجرو ویشل کيږي. یوه حجره (ژونکه) یوازې د یوه مایکروسکوپ لاندې لیدل کیدای شي. په ۱۴۴ شکل کې د یوې نورمال حجرې جوړښت ښودل شوی دی:




۱۴۴- شکل: د یوې نورمال حجرې جوړښت (69)

د بدن روغو حجرو هیستولوژي بڼه داسې ښکاري چې په ډله ایزه توګه سره یوځای یوه په بل نښتي وي، او په دې ډول غړي او نسجونه سره کلک یوځای ساتي. په ۱۴۵ شکل کې د بدن یوه غړې د روغو حجرو بڼه ښودل شوې ده چې د یوه بلاک شکل لري.



۱۴۵- شکل: د بدن د یوه روغو رمت غړي د حجرو جوړښت (69)




څرنگه چې په بدن کې توپیر لرونکي حجرې شته دي چې ځانګړې دنده سرته رسوي، خوبیا هم دهغوی اصلي بنسټ سره ډیر ورته والی لري.

	د نورمال حجرې د ویشټوب کړنلاره. یوه نورمال حجره (ژونکه) تر هغه وخته پورې ویشټو ب ته پایښت ورکوي تر څو د اړتیا وړ حجرې شمیر پوره شي. کله چې یوه حجره (ژونکه) نیمګړی منځ ته راشي او دجوړېدلو امکان موجود نه وي نو د ځان وژنې لاره غوره کوي (Apoptosis) د سرطان حجرې د ویشټوب کړنلاره دیوی حجرې څخه په خپل وار سره دوه حجرې، بیا څلور حجرې، بیا اته حجرې، شپاړس حجرې او هم داسې نور منځ په زاتید وپا ښت کوي. د پیدا شوو سرطان حجرې شمیر ریاضي فرمول داسې لیکلای شو: 2^N په دې ځای کې N د صفر نه تر لایتناهي پورې قیمت اخیستلای شي.

١٤٦- ب شکل: د سرطان یوې حجرې او دنورمال یوې حجرې تر منځ د ویشټوب توپیر پر تله کول بنودل شوي دي(69).

سرطان او جین (Genes and cancer)


هره یوه حجره (ژونکه) یوه هسته لري چې د نوکلئوس (Nucleus) یا هستې په نامه سره یادېږي. جین په رېښتوني کې د یوه کوډ code بېټونه bits جوړوي. هغه مالومات چې په جین کې موجود وي، کیدلای شي لکه د یوه بریښنايز سویچ په شان بل اومره شي او یا په بل عبارت مالومات پیل او بند شي. جین د یوې حجرې ټولې دندې کنټرول کوي. جین ددې پریکړه هم کوي چې یوه حجره (ژونکه) کله خپل ځان وویشي، یوه حجره (ژونکه) څه وکړي او کله ځان وژنه (Apoptosis) وکړي. په عادي حالت کې جین ددې مسئولیت په غاړه اخلي چې د بدن حجرې په یوه منظم او تر کنټرول لاندې شکل سره ستري شي، بیرته پوره شي اود اړتیا سره سم ډیرې شي اود خپل ځان عوض یا نې کاپي پیدا کړي. خو که چیرته نوموړې سیستم او کړنلاره دیوه نا څرګنده سبب (لامل) څخه په نا سمه لاره روان شي، نو پايله یې داسې ختمیږي چې دغه حجره (ژونکه) مړه کیږي. دا په دې مانا چې مخکې له دې څخه چې یوه روغه حجره (ژونکه) د سرطان په حجره (ژونکه) واوړي او کانسر ناروغي ورڅخه جوړه شي نو دغه



حجره (ژونکه) دځان وژني لاره غوره کوي. خو په ډيره نادره توگه rarely سره داسې هم پېښېږي چې دغه ټول سيستم په يوه نا سمه لاره روان شي او يوې حجرې ته ددې اجازه ورکړي چې دويشتوب کړنلاره مخ په وړاندې بوزي تر څو چې د سرطان يانې کانسرينا روغي منځ ته راشي.

د نسجونو شه او بد ډوله پړسوب (Benign and Malignant tumors)

که چيرته د بدن يوې برخې نسجونه وپرسېږي نو کيدای شي چې دداسې نسجونو دحجم غټوالی دسرطان د ناروغۍ سره هيڅ تړاو هم ونه لري نو له دې کبله ورته د نسجونو شه ډوله پړسوب او يا شه تومور (Benign tumours) وايي. خو که چيرته د نسجونو پړسوب د سرطان ناروغي له کبله منځ ته راغلی وي، نودنسجونودغه ډول حجم غټوالي ته خراب ډوله پړسوب (Malignant tumours) ويل کيږي.



۱۴۷ شکل: د نسجونو بڼه ډوله (Benign) او خراب ډوله (Malignant) پړسوب (37)


د نسجونو شه ډوله پړسوب دا مانا لري چې د سرطان ناروغي موجوده نه ده. د شه ډوله پړسوب يانې تومور خواص په لاندې ډول دي:

- په عادي ډول سره ډير وروستريږي
- د بدن نورو برخو ته نه غوړيږي يا نې انتقال نه کوي
- په عادي ډول سره يوپوش لري چې د نورمال حجروڅخه جوړوي

دا په دې مانا چې شه ډوله تومور د داسو حجرو څخه جوړشوی دی چې د نورمال حجرو سره بيخي ورته والی لري. خو دغه پړسوب هغه وخت د اندينې وړ دي کله چې :

- دومره غټ شي چې په گاونډيو غړو باندې فشار راولي
- داسې هارمونونه ازادوي چې د بدن نورو غړو په دنده باندې ناوړه اغيزه کوي




د نسجونو خراب ډوله پړسوب يانې خراب ډوله تومورونه (Malignant) د سرطان ناوړه حجرو څخه



جوړ وي. دنوموړي تومور خواص په لاندې ډول دي:

- د شه تومور (Benign) په پرتله ډیر گړندې ستريري
- د شاوخوا نسجونه خرابوي او پکې ننوځي
- د بدن نورو برخو ته هم غوړيږي او انتقال کوي



په ۱۴۸ شکل کې د نورمال حجرو او د سرطان حجرو توپیر ښودل شوی دی.

Normal نورمال حجرې	Hyperplasia د حجرو ډیرښت	Dysplasia غیر نورمال حجرې	Carcinoma in Situ سرطان په خپل ځای کې دی	Cancer سرطان د بدن نورو برخو ته غزيري
				
Normal	Hyperplasia	Mild dysplasia	Carcinoma in situ (severe dysplasia)	Cancer (invasive)

۱۴۸- شکل: په نوموړي شکل کې کين خوا ته نورمال حجرې او پاتې ښیئ خواته د سرطان حجرو دمنځ ته راتلوڅلور پړاونه ښودل شوي دي (90).

د سرطان حجرې دومره زیاتيري چې د خپل بنسټیز پوښ یا مېمبران څخه راوځي او د بدن په روغواو گاونډيو نسجونو په تیره بیا که په اعصابو، غړو او رگونو باندې فشار راوړي، نو خطر يې لا زیات اټکل کيږي. که د سرطان یوه حجره (ژونکه) د تومور څخه را بېله شي، نو کیدای شي چې د وینې او یا لومړي تیک سیستم جريان ته لاره پیدا کړي، او بیا د بدن نورو برخو ته ورسيږي او هلته د سرطان نورې نوی حجرې منځ ته راولي.


➡ نوموړې کلينيکي کړنلاره چې د سرطان ناروغي د بدن یوه ځای څخه و بل ځای ته انتقال وکړي د ميتاستاز (Metastase) په نامه سره ياديږي.




۱۴۹- شکل: په بني اړخ کې دغټو کلموسرطان نسجونو هیستولوژي بڼه او په کین اړخ کې د روغو نسجونو هیستولوژي بڼه ښودل شوی ده.

لومړنۍ او دوهم سرطان (Primary and secondary cancer)

په هغه ځای کې چې د سرطان ناروغي پیل کیږي، د لومړني سرطان په نامه سره یادېږي. خو کله چې د سرطان حجرې دخپل ځای څخه راووځي، او د وینې او یا لومپاتيک سیستم (lymphatic system) په مرسته سره د بدن نورو غړو ته وغورځېږي، نو د بدن دغې برخې ته چې په سرطان ناروغۍ اخته شوې ده، دوهم سرطان ویل کیږي. د بېلگه په ډول په ۱۵۰ شکل کې لومړنۍ سرطان په نری کولمو (bowel) کې پیل شوی او د مېټاستاز کړنلارې په پايله کې د بدن بلې برخې یانې سږو ته رسېدلې دی.



۱۵۰- شکل: لومړنۍ سرطان په غټوکولمو کې پیدا شوی دی او بیا د مېټاستاز د لارې د ښي (Liver) نسجونو ته رسېدلې (69).



د بدن مختلف غړي د توپیر ډوله حجرو څخه جوړ شوي دي. دنوموړو حجرو یو ډول یا تیوب کیدای شي چې په لومړني سرطان واورې. د توپیر ډوله حجرو سرطان هم مختلف خاصیت لري. د بېلګې په ډول :

- په توپیر لرونکي سرعت سره غټ کيږي
- کله چې کیمیاوي مواد وینو ته ازادوي نو په بدن باندې مختلفې اغیزې لري
- د دوايي په مقابل کې مختلف غبرګون شي
- د ایو نایز کوونکو وړانګو په مقابل کې مختلف حساسیت شي

د سرطان ناروغي کیدای شي چې په مختلفو وګړو کې د مختلفو سمپټو (symptoms) سبب (لامل) و ګرځي.

د بدن حجرو پښتوب کړنلاره



کله چې د بدن په یوه غړي کې حجرو ته اړتیا پيدا شي نو ځینې حجرې خپل ځان په دوه برخو وېشي تر څو د هغوی شمیر ډیر شي. نوموړې حجرې دغه ډول کړنلاره په دومره سم او دقیق صورت سره تر سره کوي چې نوې حجرې د زړو حجرو سره کټ مټ یو شان وي.

په ۱۵۱ شکل کې د بدن د حجرو د زیاتوالي کړنلاره ښودل شوې ده. هره یوه حجره (ژونکه) دخپلو ټولو جین (Genes) یوه کاپي کوي. بیا دغه جین په دوه ډيله کيږي یانې په دوه برخو ویشل کيږي، چې هرې یوې حجرې ته یو جین ور رسيږي. هره یوه حجره (ژونکه) په دقیق ډول او کټ مټ یو شان په دوه نورو غبرګو حجرو ویشل (Mitose) کيږي. دغه دوه نوې حجرې بیا په خپل وار سره خپل ځان وېشي او په پایله کې څلور نورې نوې حجرې منځ ته راځي. دڅلورو حجرو څخه اته حجرې او داتو حجرو څخه شپاړس حجرې اود شپاړسو حجرو څخه دوه دیرش حجرې منځ ته راځي او دغه پرو سه په همدې ډول مخ په وړاندې ځي. د بدن حجرو د میتوز دغه ډول بیالوژیکي کړنلاره دکوچني توب د وخت نه راپدې خوا د یوه سړي د ځوانۍ تر موده پورې په ډیره چټکي سره پایښت مومي. خو کله چې یو سړی بالغ شي، نو د حجرو د ویشتوب پروسه سوکه یا وړوکیږي او یوازې دومره نوې حجرې پيدا کيږي چې ورته اړتیا موجوده وي. د بېلګه په ډول هغه حجرې چې دناروغي او یا د بدن د یوې برخې د تپي کیدلو په اساس دمنځه تللي وي نو ددغو حجرو په ځای نورې نوې حجرې منځ ته راځي تر څو دهمغه غړو دنده په سمه توګه پایښت ومومي. د وخت په تیریدلو سره دیوه تومور غټیدلومنځني څوډولونه لري.

دتومور خطی غټوالی (Linear growth): دتومور حجرو ډیرښت د وخت سره سم سیخ متناسب دی او خطی شکل لري. یانې دحجرو ډیرښت په واحد وخت کې ثابت پاتې کيږي.

دتومور اکسپونینسیال غټوالی (Exponential growth): دتومور حجرو شمیر دیوه ټاکلي وخت څخه وروسته دوه برابره کيږي. دبیلګې په ډول لکه دڅلورو ساعتو څخه تر شپږو ساعتو پورې دتومور حجرو شمیر ډبل کيږي. دنوموړې موخې لپاره باید چې دتومور ټولې حجرې د ویشتوب په کړنلاره کې برخه واخلي. هغه وخت چې دتومور حجرو شمیر دوه برابره کيږي دپوتنسیل تومور ډبل وخت په نامه یاديږي.

دتومور زیګموید ډوله غټوالی (Sigmoid growth): په پیل کې دتومور حجرې اکسپونینسیال ډیرښت مومي خو بیا وروسته کمیږي. داځکه چې یوه برخه حجرې د وخت په تیریدلو سره مړې کيږي او بله برخه یې ضایع کيږي.




۱۵۱- شکل: د بدن حجرو د پېریدلو کړنلاره چې د ويشتوب (Mitose) په پایله کې منځ ته راځي او هره حجره (ژونکه) په دوه برخو ویشل کیږي. نوموړې کړنلاره تر هغه وخته پورې پایښت مومي تر څو دارتیا وړ حجرو شمیر پوره شي (69).

خود بدن ځینې حجرې خپل ويشتوب ته دارتیا سره سم همداسې پایښت ورکوي. د بېلگه په ډول لکه جنسي حجرې (Sperma cells)، د ویشتانو حجرې، هغه حجرې چې د هډوکو په مازغوکي وینه جوړوي او داسې نور.

د بدن ټولې حجرې د ويشتوب قابلیت لري ؟

د بدن ټولې حجرې ددې وړتیا نه لري چې ځان وویشي او د خپل ځان عوض حجره (ژونکه) پيدا کړي. په بدن کې د پرې داسې ځانگړې حجرې هم شته دي، چې د یوې مودې څخه وروسته یوه پوخ پړاو ته رسېږي او بیا په بدن کې یوه ټاکلې دنده په غاړه اخلي. کله چې د بدن ځینې حجرې یو ځل بشپړ او پوره پخې شوي وي، نو کیدای شي چې خپل ويشتوب او دبیرته تولید کولو (Reproduce) خاصیت دلاسه ورکړي . خو بیا هم تل په کافي اندازه سره نه پخې شوي (immature cells) حجرې پاتې وي چې د سټم یا نې سټي حجرې (called stem cells) په نامه سره یادېږي. نوموړې حجرې کولای شي چې په همغه شمیر سره چې حجرې دمنځه تللي او یا نیمگړې شوې وي په ځای یې نورې روغې حجرې منځ ته راوړي.



د بدن حجرې څرنگه پو هيري چې خپل ډيربنت ودروي؟

د حجرې ډيربنت، د حجرې ستروالی او د بدن يوې برخې رغونه داټول دجين له خوا کنترول کيږي. د بدن حجرې په دې هم پوهيږي چې څومره حجرې ته اړتيا ده او کله د حجرې د غټيدلو مخنيوی وشي. ساينس پوهان اوس هم په دې لټه کې دي چې څرنگه حجرې دغه کړنلاره تر سره کوي. خو داسې اټکل کيږي چې حجرې په خپل منځ کې يوه بل ته د کيمياوي تعاملاتو په بنسټ زيگنالونه او د مالوماتو راکړه ورکړه کوي. دغه خبر يا زيگنال پخپله د جين څخه راځي، چې د حجرې په ډي اېن اې کې پراته دي. د دې لپاره چې پوره باور ترلاسه شوي وي نو ځينې جين فعال کيږي او حجرې ته داسې وايي چې په ټاکلې کچه نوې حجرې توليد کړي. په دې اړوند بيا يوبل جين هم فعال کيږي او هغوي ته وايي چې د اړتيا نه زيات حجرې توليد نه شي. دا په دې مانا چې د لومړي جين په ضد کار کوي.

د بدن حجرې کولای شي چې خپل ویشټوب ته تل پایبنت ورکړي؟


د بدن حجرې د تل لپاره خپل ویشټوب ته پایبنت نه ورکوي بلکه وروسته له لږ څه پنځوس او يا شپيته ځله بيرته توليد يانې ویشټوب څخه نور نه زياتيږي. داځکه چې د هغوي په جين کې يو مخکنی داسې پروگرام شوی کوم موجوددی چې د هغوي ډيروالی ته يو لمبېټ ټاکلی دی. وروسته د نوموړي ویشټوب څخه پخپله مړې کيږي. په داسې يوه حالت کې چې د حجرې کمښت منځ ته راشي، نو بيا د سټم حجرې فعالی کيږي او د هغوي پر ځای نوې حجرې توليد کوي. خو هغه وخت چې پخپله د يوې حجرې جين ته زيان ورسيري نو خپل ځان پخپله له منځه وړي چې دغه ډول کړنلاره د ځان وژنې يا اپوپتوزيس (apoptosis) په نامه سره ياديږي.

د سرطان حجرې او د يوې نورمال حجرې تر منځ څه توپير دی؟

لومړې: د يوې نورمال حجرې خواص

د بدن نورمال يانې عادي حجرې يو لړ ځانگړي خواص لري چې په لاندې ډول بيان کيږي:

- هغوي کولای شي چې خپل ځان پخپله په دوه بشپړپوره برخو وېشي او په دې ډول بيرته دارتيا ورنوي حجرې توليد کړي
- خپل بيا توليد کړنلاره په رښتوني وخت کې ودروي
- د يوې او بلې سره په سم ځای کې ونښلي
- کله چې نيمگړي او يا زيانمنې شي نو پخپله ځان له منځه وړي (apoptosis)
- کله چې د پوخوالي پر او ته ورسيري نو ځانگړې او ټاکلې دنده تر سره کوي




دويم: د سرطان حجره (ژونکه)

د سرطان حجره (ژونکه) د نورمال حجرې سره توپیر لري. د یوې سرطان حجرې ځینې خواص په لاندې ډول سره بیان کولای شو.


- خپل بیا تولید او ویش توب ته همداسې پایښت ورکوي او په خپل سر پیرېږي
- د خپلو ګاونډیو حجرو زیګنالونو ته نه پام کوي او نه یې اطاعت کوي
- د سرطان حجرو ترمنځ اړیکې پرې کیږي او د یوې بلې سره نه نښلي
- هغوی خپل پاڅه شوي پړاو ته نه رسېږي او له دې کبله ځانګړې دنده هم تر سره کولای نه شي
- که د بدن بل ځای ته هم وخوځېږي بیا هم ژوندي پاتې کیږي.

د سرطان حجرې د نورمال حجرې په برخلاف له پنځوس او یا شپيته ځله ویش توب څخه وروسته خپل بیا تولید نه دروي بلکه همداسې نور هم پایښت ورکوي. دا په دې مانا چې د یوې حجرې څخه دوی، د دوو حجرو څخه څلور، بیا اته، بیاشپارس نوې حجرې جوړېږي. په ۱۵۲ شکل کې د سرطان حجرو د ویش توب او د پېرېدلو کړنلاره ښودل شوې ده.




۱۵۲- شکل: د پوستکي سرطان حجرو ویش توب او د تومور جوړېدلو کړنلاره ښودل شوې ده. په دغه شکل کې ښي او چپ اړخ ته نورمال حجرې او په منځ برخه کې د سرطان حجرې د ویش توب په پړاو کې لیدل کیږي.

که چیرته د سرطان حجرو د تېدلو مخه وه نه نیوله شي نو دوخت په تېرېدلو سره دهغوی شمیردومر هډیريږي چې د بلیونو حجرو څخه هم اوږي (69)




۱۵۳- شکل: د سرطان حجرې هغه ما لېکولونه د لاسه ورکوي کوم چې د هغوي سطحې پر مخ پراته وي او نورمال حجرې په خپل ټاکلي او صحيح ځای کې سره یوځای ساتي. همدا سبب (لامل) دي چې هغوي دخپل سم ځای څخه بېلېږي (69)

په ۱۵۴ شکل کې ښودل شوي ده چې څرنگه د سرطان حجرې د یوه کاپیلار په شا وخوا کې په زیتیدلو پیل کوي .



۱۵۴- شکل: دویني یوه کاپیلار (Capillar) په شاوخوا کې د سرطان حجرو درې ډوله هیستولوژیکي بڼه را ښيي. ۱- کاپیلارته ورڅرمه برخه هغه حجرې دي چې پوره اکسیجن لري او په بشپړتوگه زیاتوالي مومي ۲- د لږ اکسیجن حجرو برخه (Hypoxic cell) ۳- د پیاوړ یا نیکروټیک اکسیجن نه لرونکې برخه (Anoxic Necrotic Cell) چې د کاپیلار څه په یو سلو پنځوس مایکرو متر کې پراته ده (26).

د پاتولوژي څانگو درمل پوهانو ډیر پخوا دسرطان حجرو یو ډیر ځانگړی خاصیت وپېژندلو په دې ما نا چې دسرطان ناروغو حجرو هیستولوژیکي او مورفولوژیکي بڼه د روغو نسجونو سره توپیر لري. په ۱۵۴ شکل کې ښودل شوي ده چې د ویني یو ډیر کوچني رگ (Capillary) په شاوخوا کې د سرطان حجرې درې ډوله پړاونه او یا په بل عبارت درې ډوله برخي جوړیږي. د لوموړي پړاو نسجونه هغه





دې چې د سرطان ناروغۍ په پیل کې پیداشوي وی، خو دنورو نویو سرطان حجرو د زیاتیدلو په کړنلاره کې شاته تمبول شوې وي او د کاپیلار څخه په یوسلوپنځوس مایکرو متر ($150 \mu\text{m}$) واټن کې پرتې وي. څرنګه چې نوموړو حجرو ته اکسیجن هیڅ نه رسېږي نو په پایله کې په یوه پیاوړه شکل (Necrotic) نسجونو اوږي او له دې کبله ورته (Anoxic Necrotic cell) یانې اکسیجن نه لرونکي پیاوړي حجرې ویل کېږي. په دوهم پړاو کې دسرطان هغه حجرې دکاپیلار په شاوخوا کې پرتې وي چې لږاکسیجن پکې وي (Hypoxic cell) اود نیکروتيک حجرو سره شریکه پوله او سرحد لري. ددرېم پړاو حجرې دکاپیلارڅنډې ته ور څرمه او نږدې نسجونه تشکیلوي چې د یوې خوا پوره اکسیجن ورته رسېږي اودبلې خوا د ویشلو او میتوز کړنلاره په پوره ډول تر سره کولای شي. دغه ډول حجروته دنورونویورا پیداکیدونکو حجرو برخه یانې سرچینه ویل کېږي (Proliferative cell). په دې اړوند د یادولو وړ خبره خو داده چې په رادیوتیراپي کې، یوازې هغه حجرې دورانګو په واسطه دمنځه وړل کیدلای شي چې پوره اکسیجن ولري. دا ځکه چې یوازې اکسیجن لرونکي حجرې د ورانګو پمقابل کې زیات حساسیت څرګندوي او له دې کبله ورته (Radio sensitive cell) هم ویل کېږي. په داسې حال کې چې د سرطان هغه نسجونه چې هیڅ اکسیجن وه نه لري لکه دنیکروتيک نسجونه دورانګو پمقابل کې مقاومت شي او له دې کبله یې رادیوتیراپي هم په پوره ډول نه شي تر سره کیدای. دسرطان نسجونو پورته ویل شوي خواص دناروغيو په پیژندنه کې ډیر مهم رول لوبوي. د بېلګه په ډول دورانګو درمل پوهان د سرطان ناروغۍ په پیژندنه کې د بدن په شکمنو برخو په تېره بیا لکه تیو (Mamma)، تیرایډ (Thyroid)، پروستاتا (Prostata) او غدو باندې لاس مېشي، اودفشار او تماس په اساس دنیکروتيک په ډول کلک غونډ شوي نسجونه لټوي.

سرطان څرنګه پیل کېږي؟

نن ورځ ساینس پوهانو ته پوره جوت ده چې د سرطان ناروغي د یوې حجرې څخه پیل کېږي. یوه نیمګړی حجره (ژونکه) په عادي حالت سره ډیر کلونه پخوا مخکې له دې نه چې سړی یې پخپله حس کړي د سرطان په حجره (ژونکه) اووېښتي وي. په هغه وخت کې چې د سرطان ناروغي پیژندل کېږي د سرطان یوې حجرې خپل بې کنټروله ویشتوب اود بیا تولید کړنلاره ډیره پخوا پیل کړې وي. داځکه چې دسرطان حجرې ځینو جینو ته یا داچې زیان رسیدلی وي او یا بیحي دمنځه تللي وي. ساینس پوهان نوموړي بدلون ته **موتیشن** وايي.

دتومورحجم ډبل کیدلووخت (Tumor doubling time)


دتومورحجم ډبل کیدلووخت هغه وخت ته وايي چې په نوموړي موده کې دتومور اویا سرطان نسجونوحجم دلومړي وخت په پرتله دوه ځله غټ شي. کله چې یو تومور په کلینیکي ډول پیژندل کېږي نودهغه دستریدني دوه په دریمه برخه وخت تیرشوی وي. دبیلګي په ډول د تیو سرطان (Mamm carcinoma) دحجم ډبل کیدلووخت لږڅه دوه سوه ورځې اټکل کېږي. ترڅو چې په تیوکې یوه دانه دتماس له لارې د پیژندلووړګرځي دا په دې مانا چې په دومره کچه غټیدلو لپاره یې لږ څه پینځلسو کالوته اړتیا لیدل کېږي. په داسې حال کې چې په نوموړي موده کې شل په سلوکې میتاساز (Metastasis) د بدن په نورو برخو کې غوړیدلې وي.



۱۵۶- شکل: د يوې حجرې د موتیشن په پايله کې دسرطان ناروغۍ دمخنيو جينونه لکه (P53) (Tumor suppressor genes) غیر فعال کيږي اود سرطان ناروغۍ منځ ته راځي(69).

جين او موتیشن (Genes and mutation)

جين د حجرې په منځ کې کوډ شوي پيغامونه او مالومات دي چې حجرې ته دا لارښوونه کوي چې څرنگه خپل چلن دډيربست او ویشتب په تړاو پر مخ بوزی. جين داسې کوډ لري چې حجرې ته وايي چې څرنگه ډير ډوله او توپير لرونکي پروتئين proteins جوړکړي. دجين له خوا يو کوډ نمبر هريوه پروتئين ته ټاکل کيږي. ځينی پروتئين بيا داسې دنده لري چې ديوه بريښنايز سويچ په څيرکارکوي چې بل کيږي او مرکيږي. د بېلگه په ډول ديوه هارمون زيگنال په يوه حجره(ژونکه) اويا پروتئين باندې اغيزه کوي. همدغه پروتئين بيا يو زيگنال استوي چې ديو لږ نورو ځنځيری سويچونو څخه تيریږي، هغه وروستی زيگنال بيا يوې حجرې ته وايي چې ځان په دوه برخو ووېشه.



موتیشن دا مانا لري چې یو جین دمنځه تللی او یا داچې ورته زیان رسیدلی دی نو له دې کبله یوه داسې حجره (ژونکه) نیمګړې ده. موتیشن دې ته هم ویل کیږي کله چې دارتیا نه زیات پروتیین تولید شي او یا داچې پروتیین هیڅ جوړ نه شي. د بېلګه په ډول د یوه زیګنال خپروونکي پروتیین سویچ (switch) د تل لپاره بل یا ترلی پاتې شي او یا داچې ځینې نور پروتیین چې هغوی دیوې حجرې د وېشلو شمیر او لېمیت کنترول دنده په غاړه لري د تل لپاره خلاص پاتې شي. هر هغه شي چې یوې حجرې ته زیان رسوي او په پایله کې په یوه سرطاني حجره (ژونکه) اوږي د کارسینوګن (carcinogens) په نامه سره یادېږي. د بېلګه په ډول لکه سګرټ څکول، ایونایزکونکي وړانګې، وایرس او نور.

د سرطان په حجره (ژونکه) کې کوم جین غیر نورمال شکل لري؟

دری ډوله توپیر لروونکي جین شته دي چې د یوې سرطان حجرې په منځ ته راتللو کې مهم رول لوبوي.

- هغه جین چې یوه حجره (ژونکه) ودې ته هڅوي چې خپل شمیر زیات کړي
- هغه جین چې هغوی د حجرو د ډیریدلو مخ نیوی کوي
- هغه جین چې نیمګړي وي او یا داچې د کارسینوګن موادو په واسطه ورته زیان رسیدلي وي


نومړۍ: اونکو جین (Oncogenes)

داونکو Onco کلمه یو یوناني لغت دی اود پړسوب مانا لري. اونکو جین هغه جینونو ته ویل کیږي چې د نسجونو د پړسوب سبب (لامل) ګرځي. نوموړي جینونه په دوه ډوله دي.

✍ **الف: وایرسي اونکو جین (Viral oncogen):** کله چې یو وایرس یوې نورمال روغي حجرې ته ننوځي نودغه حجره (ژونکه) د سرطان په یوه ناروغه حجره (ژونکه) اړوي. تر نن ورځ پورې لږ څه شل وایرسي اونکو جین پیژندل شوي دي.

✍ **ب: حجروي اونکو جین او یا پروتو اونکو جین (Cellular oncogen = proto oncogen)**

حجروي اونکو جین هغو جینونو ته ویل کیږي چې په عادي حالت کې دیوې حجرې دو یشتوب ، ستریدلو، توپیرکولو Differentiation اود حجرې سایکل Cell cycle دندې کنترول کوي. په عادي صورت سره د بدن ډیرې حجرې یواځې هغه وخت نورې نوې حجرې جوړوي چې اړتیا ورته پیدا شي. د بېلګه په ډول کله چې د بدن کومه برخه ټپي شوې وي او یا داچې کوم طبي عملیات تر سره شوي وي. یونورمال جین چې نوموړې دنده تر سره کوي د پروتو اونکو جین (Proto-oncogen) په نامه سره یادېږي. خو کله چې یونورمال پروتو اونکو جین دایونایزکونکو وړانګو او یا د کانسر جین موادو (Cancerogene) داغیزې له کبله په غیر نورمال شکل واوږي او مو تیشن پکې منځ ته راشي نو داونکو جین (Oncogenes) په نامه سره یادېږي. دا ځکه چې نوموړی جین حجرې ته داسې زیګنالونه استوي چې ګڼه خپل شمیر دارتیا نه نور هم زیات کړي. نوموړو جینو ته پوهانو اونکو جین او یا د سرطان جین (Cancer genes) نوم ورکړی دی.



دويم: دتومور سپرېسر جين (Tumour Suppressor genes)

په حجره (ژونکه) کې ځينې داسې جين هم شته دي چې دهغوي ځانگړې دنده په دې کې ده چې د حجروددېرېست مخه هغه وخت ونيسي کله چې دارتيا نه زيات نورې حجرې توليد شي.

نوموړو جينو ته دسرطان سپرېسر جين (Tumour Suppressor genes) او يا دتومورمخنيوونکي جين ويل کيږي. داځکه چې دغه جين د سرطان ناروغۍ دمنځ ته راتلومخنيوونکي کوي اوپه تېره يې دروي. دا په دې مانا چې داونکو جين په ضد (antagonist) عمل کوي. کله چې اونکو جين او يا تومورسپرېسر جين ضررمن او يا نيمگړي شي او خپله دنده په سمه توگه تر سره نه کړي نو يوه حجره (ژونکه) خپل دېرېست ته دتل لپاره پايښت ورکوي. د سپرېسرتومور جين د ډلو څخه يو نامتو جين د p53 په نامه سره ياديږي. نوموړې جين په عادي صورت سره ديوې حجرې ددېرېست ټول سرليک تر کنترول لاندې لري او هغو حجروته چې نيمگړې وي اوخپله دنده پوره او سمه نه شي تر سره کولای داسې سپارښتنه کوي چې ځان وژنه (apoptosis) وکړي. په هغو وگړو کې چې دسرطان په ناروغۍ اخته وي همدغه جين p53 يا داچې نيمگړی وي او يا داچې بيخي دمنځه تللی وي.


درېم: هغه جين چې نور نيمگړي جين بيرته جوړوي

د حجرې په کروموزومو کې ځينې نور داسې جين هم شته دي چې پخپله د دې اړين دي. (DNA) نيمگړي جينونه بيرته جوړوي. نو کله چې نوموړي جين ضررمن شي نو د يوې حجرې موتېشن نيمگړتيا په خپل حال پاتې کيږي اوکه ومني چې همدغه حجره يوه جنسي حجره وي، نو کولای شي چې نورو راتلونکو نسلونو ته نوموړې نيمگړتيا دموتېشن په ډول انتقال کړي. نوموړې جين په هغو ناروغانو کې چې د غټو کولمو سرطان په ناروغي اخته وي نيمگړي پيدا کيږي.

موتېشن څرنگه منځ ته راځي؟

څرنگه چې يوازې لوی څښتن (ج) بشپړ دی اوپه خپلو کارونو کې غلطې نه کوي، خودا بايد ومني چې طبيعت پخپله هم کله کله تير وتنه کوي يانې د طبيعت په قانونو کې پخپله هم کله کله ناسمي اوغلطي منځ ته راځي. ددېلکه په ډول کله چې دحجرې موتېشن پيښه منځ ته راشي نودنورو علتونوپه څنگ کې يو سبب(لامل) يې پخپله دطبيعت غلطې هم کيدای شي. نوموړې پيښه کېدلای شي چې هغه وخت منځ ته راشي کله چې يوه رک رمټ روغه حجره (ژونکه) خپل ځان ويني او د بيرته توليد کولو کړنلاره پيل کړي او په دې ترڅ کې يوه نيمگړې حجره (ژونکه) منځ ته راشي. يوه داسې نيمگړې حجره (ژونکه) يا داچې خپل ځان پخپله وژني او يا داچې د بدن د دفاع سېستم له خوا ديوې غيرعادي يانې پردې او دښمني حجرې په صفت پېژندل کيږي، او له دې کبله د منځه يووړل کيږي. دا په دې مانا چې ډيري زياتې او د سرطان لومړي پړاو حجرې مړې کيږي، مخکې له دې چې هغوي د سرطان ناروغي سبب(لامل) وگرزي.


خوسره دهغې هم يو داسې ډير کم توکلی چانس او پيښه هم منځ ته راتلای شي، چې يوازې يوه حجره (ژونکه) کوم چې دموتېشن نيمگړتيا پکې پاتې وي مړه نه شي او د سرطان په ناروغي حجره (ژونکه) واوړي.




کوم شیان د سرطان ناروغی سبب (لامل) ګرځي؟

څرنگه چې پخپله د سرطان ناروغی ډیر ډولونه لري نو دلاند نېو شیانو څخه لږ تر لږه یوشی ددې سبب (لامل) کېدای شي چې د سرطان ناروغی سبب (لامل) وګرځي:

- دډیرو فکتورونو علتونه
- کارسینوګېن مواد Carcinogens
- عمر Age
- د بدن دفاع سیستم Immune system
- دهر سړي جنېټیک جوړښت Genetic predisposition
- دخوراک او څښاک کړنلارې
- د چاپیریال هر اړخیزې اغیزې
- دراديو اکتیوموادو طبیعي او مصنوعي وړانګې
- وایرسونه، مایکروبوڼه Viruses



۱۵۷- شکل: د سرطان ناروغی دراپارولولپاره هر اړخیز فکتورونه لکه وړانګې، کیمیاوي زهرجن



مواد وایرس اونورددي سبب(لامل) گرځيدلای شي چې د بدن يوه روغه حجره(ژونکه) د سرطان په حجره(ژونکه) واړوي. په نوموړي شکل کې د يوې روغې حجرې کلينيکي بدلون په سرطا ني حجره(ژونکه) بنودل شوی دی.

لومړی: د ډيرو فکتورونو علتونه

دسرطان لږ څه دوه سوه توپيرلرونکي ډولونه شته دي چې دبدن په مختلفوحجرو باندې ناوړه اغيزه کوي. نو که يوکارسينوگېن شي دبدن يوې برخې نسجونو باندې ناوړه اغيزه اچوي ددې مانا نه لري چې د بدن په يوه بله برخه باندې هم ناوړه اغيزه اچوي. د بېلگه په ډول، که څوک زيات سگرت څکوي نو کيدای شي چې د سږي په سرطان اخته شي. همدارنگه که چيرته د چا پوستکي ته زيات لمر ورسېږي نو کيدای شي چې د پوستکي سرطان (melanoma) ورته پيدا شي. نو کله چې نوموړي دواړه اغيزي او همدارنگه نور فکتورونه سره يوځای پېښ شي نو د سرطان ناروغۍ دمنځ ته راتلو احتمال هم ورسره زياتيږي. نو ډير فکتورونه دا مانا لري چې د سرطان ناروغي نه يوازې ديوه فکتور بلکه ديو لږ ډيرو فکتورونود حاصل ضرب په پايله کې منځ ته راځي.

دويم: کارسينوگن مواد (Carcinogens)

کارسينوگن هغو موادوته ويل کيږي چې دسرطان ناروغۍ په منځ ته راتللوکې مرسته کوي او سبب(لامل) يې گرځي. د بېلگه په ډول سگرت څکول، الکوهول څښل د کارسينوگنو نامتو موادو په ډله کې شميرل کيږي.

درېم: عمر (Age)


د سرطان ډير ډولونه شته دي چې د سږي عمر په اخيرکې زيات خود ځوانې په وخت کې ډير لږ پيدا کيږي. داځکه چې هغه بدلون چې په يوه نورمال حجره(ژونکه) کې پيل کيږي او بيا په سرطان حجره(ژونکه) اوږي ډير وخت نيسي. د بېلگه په ډول د پروستاتا سرطان (Prostata cancer)

څلورم: جنېتيک جوړښت (Genetic predisposition)

ځيني داسې موتیشن هم شته دي چې د سږي د پيدا ښت سره يوځای په يوه حجره(ژونکه) کې موجودوي. نو کله چې ددغه موتیشن سره بيا د ژوند په اوږدو کې نورموتیشن يوځای شي نو داحساېي له مخې ددې زيات احتمال شته دی، چې سږي دسرطان په ناروغۍ اخته شي. نوموړئ موتیشن ته جنېتيک پری دېسپوزيسيون (genetic predisposition) ويل کيږي. د تيوسرطان (breast cancer) دوه جېنونه لکه BRCA1 او BRCA2 د جنېتيک پری دېسپوزيسيون وتلي بيلگې دي. نو هغه ښځې چې يوله نوموړو جينوڅخه په خپل ځان کې لري دهغو ښځو په پرتله چې نه يې لري يوډير لوړاحتمال شته دی چې د سرطان په ناروغۍ اخته شي.

پنځم: د بدن دفاع سيستم يا ايمن سيستم (Immune system)

هغه کسان چې دبدن دفاع سيستم سره ستونځې لري نوددې احتمال يې زيات دی چې دسرطان په ناروغۍ اخته شي. د بېلگه په ډول هغه چاته چې په بدن کې د منځه تللي يوه غړي پر ځای ورته دبل چا يونوی غړی اچول شوی وي نو داسې دواگانې ورکول کيږي چې هغوي ددفاع په سيستم باندې فشارراولي تر څو د انتقال شوي غړي په مقابل کې ناوړه غبرگون وه نه شي او ضد مواد لکه (Antibody) جوړنه کړي.



شپږم: دخوراک او څښاک اغیزه:

په لويديزه نړۍ کې وگړي نه يوازې ډيرخوراک او څښاک کوي بلکې دحيواناتو ډيره وازده هم خوري. داډول ژوند کول دا پايله لري چې د سرطان ناروغۍ د پېښيدلو احتمال لږڅه ډېرش په سل کې پورته بيايي.

اووم: د چاپيريال اغيزه:

په چاپيريال کې هم ډير شيان شته دي چې د سرطان ناروغۍ سره تړاوي. دبيلگي په ډول لکه د لمر وړانگې، طبيعي او مصنوعي ايونايژکونکي وړانگې، په تنباکوکره هوا، دفابريکوڅخه راوتلي فاضله مواد او اسبېست (Asbestos) او داسې نور.

اتم: وایرسونه (Viruses)

✓ ځينې وایرسونه هم ددې سبب(لامل) کيدلای شي چې دسرطان ناروغۍ منځ ته راولي. وایرس کولای شي چې دحجرې په جېن کې بدلون راولي او دسرطان په حجره(ژونکه) واوړي. ځينې ناروغۍ هم شته دي چې د يوه ټاکلي وایرس سره تړاو لري. د بېلگه په ډول:

✓ دغاړې سرطان او د جنسي ناروغۍ دمنځ ته راتلو وایرس چې د (HPV= Humanpathogenen Papilloma-Virus) په نامه سره ياديږي.


✓ د ښې سرطان او د هېپاټيټيز بي وایرس (Hepatitis B virus)

✓ د وينې ټي حجرې سرطان (T cell leukaemia) اود وينې ټي حجرې وایرس

✓ Epstein-Barr virus (EBV) يو داسې وایرس دی چې د هوجکين ليمفوم ناروغۍ Hodgkin's (Lymphoma) سره تړاوي. نوموړې داسې ناروغي ده چې د بدن د لومف سيستم حجرې په غټېدلو پيل کوي.

د سرطان ناروغۍ پړاوونه (The stages of a cancer)

کله چې په يو ه سړي کې دسرطان ناروغي د لومړي ځل لپاره وپېژندل شي، نو تر ټولومهمه پوښتنه داوي چې دنوموړې ناروغۍ دپرمختگ کچه څومره ده اودسرطان حجرې دخپل ځای څخه د بدن کومونوروبرخو ته غوړيدلی او انتقال شوې دي، ترڅو ددرمل په اړوند يوه پريکړه تر سره شي. نوموړې تگ لارې ته دسرطان ناروغۍ پړاوونه وايي. په دې اړوند دډيرو سرطان ناروغيو لپاره د درجي سيستم (Staging systems) څخه کار اخيستل کيږي. نن ورځ دوه مهم سيستمونه منل شوي چې د ډاکترانو له خوا استعمال کيږي او يو يې د ټي اين ايم سيستم (TNM) او بل يې د شمير سيستم (AJCC) په نامه سره ياديږي. په نوموړې لنډيز کې د ټي توري (T= Tumour) د تومور او د اين توري (N= Noode) لومف او د ايم توري (M=Metastasis) مېټاستاز مانا ورکوي. ددغه سيستم په مرسته سره کولای شو چې د تومور لومړنۍ غټوالی وښيو، او داچې د بدن په کومو لومف غدوکې دسرطان حجرې پيداشوي دي، او په اخير کې داهم چې دسرطان حجرې د بدن کوم بل ځای پورې رسيدلي دي.



د **T** تورى دسرطان ناروغۍ غټوالې اود شاوخوا نسجونوسره اړيکې شيې او قيمت يې د يوه نه ترڅلوروپورې دى. ($T=1-4$) او يو دا مانا لري چې دتومور غټوالى کوچنى دى او څلور په دې مانا چې تومور ډير غټ شوى دى. **دبېلگه په ډول:**

- T_0 د کانسر (Cancer) ناروغي په لومړي پړاو کې ده او د ومره کوچنى ده چې پيژندل يې سخت تماميږي.
- T_1 کانسر د دوه سانتي متره څخه کوچنى دې ($< 2 \text{ cm}$) .
- T_2 کانسر ددوه سانتي متره څخه ستر دى ($> 2 \text{ cm}$)
- T_3 کانسردغړي سرحد ي برخې ته رسيدلې اود پينځو سانتي مترو ($> 5 \text{ cm}$) څخه هم اوړي.
- T_4 کانسر گاونډيو غړو ته غوړېدلې دى.



د **N** قيمت د صفر نه تر دريو پورې رسيږي ($N= 0-3$) اوصفر دا مانا لري چې هيڅ مثبت لومف موجودې نه دي او درى په دې مانا چې خورا ډيرې مثبت لومف موجودې دي.

- N_0 دسرطان لومفاوي غدې نه شته، او د بدن نورو برخو ته نه دې غوړېدلې، يانې مېټاستاز نه شته.
- N_1 دسرطان دلومفا وي غدې شته، خو په خپل ځاى کې پرتې دي، او د بدن نورو برخو ته نه دي غوړېدلې.
- N_2 دسرطان دلومفا وي غدې شته او د بدن نورو برخو ته غوړېدلې دي يانې مېټاستازې شته دي.
- N_3 دسرطان گڼ شمير لومفا وي غدې شته ، چې غټوالى يې د شپږ سانتي مترو نه هم اوړي.

د **M** قيمت ياداچې صفر او يا يووي ($M= 0-1$) او صفر په دې مانا چې سرطان په خپل لومړني ځاى کې دى او يو په دې مانا چې دسرطان ناروغي دبدن نورو برخو ته غوړېدلې ده.

➡ $pT_1pN_0M_0$ په دې ځاى کې د پي تورى P دا مانا لري چې د عمليات څخه وروسته د سرطان ناروغۍ پړاونه لکه T_1 او N_0 وټاکل شول. دا په دې مانا چې دبدن عمليات شوې برخې مواد د پاتو هيستولوژي په کړنلاره سره تر څيړنې لاندې ونيول شوه او بيا يې د سرطان ناروغۍ پړاونه وټاکل شول او له دې کبله دعمليات څخه وروسته يانې (Post operative) نوم وکړ شوى دى.

که چيرته د **r** تورى (r) پر ليکه شوى وي نو دا مانا لري چې د سرطان ځينې پاتې شوي نسجونه شته دي او يا دا چې د سرطان ناروغي بيرته راگرزيږي ده ($r = \text{recidive}$) .




۱۵۸- شکل: د کیسه مټاني سرطان (Bladder cancer) هر اړخیز پراوړنه چې د (TNM) سیستم په اساس د یوه گراف په شکل ښودل شوې دي. د کیسه مټانه د ننه برخې اپیتیل (Epitel) په یو (1) اوورپسي لاندنی پوست اپیتیل په دوه (2) او د عضلاتو (Muscle) برخه یې په دریو (3) سره ښودل شوي ده (9).

تومور مارکر (Tumormarker)

نن ورځ د سرطان ځینې داسې ناروغی هم پیژندل شوي دي چې د سرطان حجري پخپله یو ډول مواد لکه انتیجین Antigen، پروتین، اینزایم او هارمونونه جوړوي. په وینه او یا پخپله د سرطان په حجرو کې دنورمال په پرتله د نوموړو موادو د غلظت ډیرښت او یا کمښت دا مانا ورکوي چې دنوموړي غړي د کار کولو دنده د خطر سره مخامخ ده او کیدای شي چې د سرطان ناروغی د لومړي پړاو مخکې نښانې وي. نوموړي مواد د **تومور مارکر** په نامه سره یادېږي چې ځینې یې د یوه غړي سرطان ناروغی سره سم ښیځي او لري. دبیلګې په ډول لکه مولتیپل میولوما Multiple myeloma د سرطان یوه داسې ناروغی ده چې د پلازما په حجرو کې پیل کیږي. نوموړي حجري د سپینو کړویاتو څخه منځ ته راځي. مولتیپل میولوما د سرطان یوه داسې ناروغی ده چې د یوې خوا د هډوکو په ماغزو او وینه کې د پلازما حجرو شمیر ډیرېږي او د بلې خوا یې په جوړښت کې هم بدلون راځي. نوموړي حجري کولای شي چې د بدن د دفاع سیستم د وینې جوړونکو حجرو په تولید باندې ډیره ناوړه اغیزه واچوي. د پلازما حجري د هډوکو په ماغزو کې راټولېږي او هلته یو تومور منځ ته راولي چې د پلازما سیتوماس plasmacytomas په نامه سره یادېږي. هغه ناروغان چې د مولتیپل میولوما په ناروغی اخته وي د هغوی په میتازو کې یو ټاکلی پروتین د Bence jones proteine پیژندل کیدلای شي. نوموړی پروتین یوازې د پلازما حجرو څخه جوړېږي.

د بیلګې په ډول پروستاتا (Prostata) یوه غده ده چې په عادي حالت کې هم یو ټاکلی پروتین افراز کوي او د پروستاتا سپسیفیک انتیجین (Prostata specific antigen = PSA) په نامه سره یې دیري. نوموړی پروتین یو داسې اینزایم دی چې د سپرم حرکت سره مرسته کوي او د هغه جین په نونسم کروموزوم کې



موقعیت لري (Chromosom 19q13). خو کله چې پروستاتا وپرسیږي او غټه شي نو په وینه کې د نوموړي انټیجېن اندازه د پخوا په پرتله بدلون کوي. په عادي صورت کې د پي اېس ای PSA قیمت په وینه کې دصفر څخه ترڅلورنانوگرام په ملي لیتر کې ټاکل شوی دی (0-4 ng/ml). خو په دې اړوند باید وویل شي چې په وینه کې د پي اېس ای PSA قیمت لوړوالی سل په سلو کې ددې مانا نه لري چې ګڼه د سرطان ناروغي سره تړاو لري. دا ځکه چې د پي اېس ای نوموړی قیمت هغه وخت هم پورته ځي کله چې پروستاتا ښه پړسوب (Benigne tumor) ولري. په ۴۳ الف جدول کې د یو لړ مهمو کلینیکي تومور مارکرونو هغه د هغوی تړاو ښودل شوی دی.


تومور مارکر Tumormarker	دتومور ډول Tumortyp
CEA (karzinoembryonales Antigen)	دسږي سرطان، دمعدې سرطان، دتیوسرطان Mamma او د ښي سرطان Liver
CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3)	دترېخي سرطان pancreas ، دتیوسرطان
CA 19-9 (Cancer Antigen 19-9)	دمعدې سرطان، د ښي سرطان Liver دترېخي سرطان
CA 125 (Cancer Antigen 125)	دجنسي غدو سرطان، د تیوسرطان Mamma
Calcitonin	د تایراید سرطان Thyride carcinom
PSA (prostata specific antigen)	دپروستاتالتهاب، غټوالی اویا دسرطان ناروغۍ په پایله کې پورته ځي. د صفر نه تر څلورنانوگرام په ملي لیتر وینه
Ferritin	دسږي سرطان، دښي سرطان ، دویني سرطان او دترېخي سرطان
IgM (Immunoglobuline)	پلازما سیتوم، په وینه کې د ماکروګلوبولین ډیرښت
Bence-Jones-Proteine	په وینه کې د پلازما حجرو ډیرښت ، multiples myelom

۴۳- الف جدول: دسرطان هغه ناروغۍ ښودل شوې دي چې د یوه ټاکلي تومور مارکر سره تړاو لري.

دسرطان ناروغۍ د درمل یا د علاج تګ لارې (Cancer Treatment methods)

که څه هم دسرطان ناروغۍ د درملنې (علاج) په اړوند په اوسني وخت کې ډیرې زیاتې او پرمخ تللي تګ لارې ښته دي، خو بیا هم دیادوني وړ خبره داده، چې هغوي ټولې یوازې هغه وخت ګټوره اغیزې لرلای شي، چې د سرطان ناروغۍ ډیر پرمختګ نه وي کړی. دسرطان د درملنې یانې علاج (Therapy) پیژندل شوې تګ لارې په لاندې ډول دي:

- عملیات (Surgery)
- کیمیاوي تیراپي (Chemotherapy)
- دورانګو درملنه یا رادیو تیراپي (Radiotherapy)
- دهډوکوماغزو او د سټم حجرو ترانسپلانت (Bone marrow and stem cell transplants)
- بیالوژیکي تیراپي (Biological Therapy)
- هارمون تیراپي (Hormone therapy)
- جین تیراپي (Gene therapy)



د نوموړو ټولو کړنلارو څخه عملیات، کیمیاوي تېراپي او راډیو تېراپي خورا پراخ استعمال موندلی دي.

لومړۍ: د عملیات کړنلاره (Surgery)


د عملیات په تگ لاره کې پخپله د سرطان نسجونه او د هغه د سرحد څو ملي متره روغ نسجونه او کله هم د روغ غړي یوه برخه، کوم چې د کمپیوټر توموګراف او نورو طبي آلاتو په مرسته پیژندل شوي وي، لیري کوي. نوموړې کړنلاره په هغه وخت کې تر سره کیږي کله چې د سرطان ناروغي د بدن نورو برخو ته نه وي غوړېدلې یا نې مبتلاستاز یې نه وي کړې او په یوه تړلي او محدود ځای پورې اړه ولري.

دورانګودرملنه یا راډیو تېراپي کړنلاره (Radiotherapy)

نوموړې تگ لاره هغه وخت په کار اچول کیږي چې د سرطان نسجونو سرحد پوره څرګند نه وي او د شا و خوا روغو نسجونو سره دومره شریک شوي وي چې پیژندل یې سخت تمامیږي، او یا دا چې سرطان د بدن نورو برخو ته هم غوړېدلی وي. راډیو تېراپي د سرطان ناروغي د درملنې یوه داسې کړنلاره ده چې د راډیو اکتیو ایزوټوپو او ایونایزکونکو وړانګو څخه کار اخیستل کیږي. په نوموړې کړنلاره کې لوړ انرژي الکترونو، فوتونو، نیوترونو او ایونوزرو په مرسته سره د سرطان حجرې د منځه وړل کیږي. د نوموړو وړانګو نورې ګټورې اغیزې په لاندې ډول دي:


- مخکې د عملیات څخه د سرطان نسجونه سره راغورځول او حجم یې کوچنی کوي
- د عملیات څخه وروسته د سرطان ناروغي دبیرته پیل کیدلو خطر کم کوي
- پخپله وړانګې هم د سرطان حجرې وژني خو سالمې یانې روغې حجرو ته دومره زیات زیان نه رسوي دا ځکه چې روغې حجرې خپل ځان دبیرته چمتو کولای شي
- کله چې د سرطان ناروغي ډیره پر مخ تللی وي او د علاج چانس یې ډیر کم وي نو د وړانګو په مرسته د ناروغ د پاتې ژوند کیفیت ورشه کولای شي.

په ۱۵۹ شکل کې د فوتون او الکترون وړانګو یوه آلې بنډول شوي ده چې د سرطان ناروغي د درملنې په موخه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي او د کلینیکي خطي تعجیل کوونکي (Clinical Linear Accelerator) په نامه سره یادېږي. د نوموړې آلې په کوپړي کې د الکترونو او فوتونو یوه سرچینه ځای په ځای شوې، چې وړانګې یې سم سیخ د الکترومقناطیسي ساحې په مرسته د ناروغ بدن په هغه برخه کې فوکس کیږي، چې د سرطان نسجونه پکې پیژندل شوي وي. د خطي تعجیل کوونکي بڼه والی په دې کې دي چې انرژي یې د ډاکټر د زړه په خوښه د یو مېگا الکترون ولټه څخه تر لږ څه شلو مېگا الکترون ولټه پورې ټاکل کېدلای شي. د نوموړې ټکنالوژي ګټه په دې کې ده چې په بدن کې د سرطان ناروغي د ژوروالي سره سم د وړانګو انرژي په ازاده توګه ټاکلای شو. د بېلګه په ډول پوستکي ته نږدې سرطان لپاره لږ څه پینځه مېگا الکترون ولټه انرژي او د سرطان هغه نسجونه چې په بدن کې ژور پراته وي د بېلګه په ډول لکه لس سانتي متره داسې وړانګې ورکولای شو چې انرژي یې شل مېگا الکترون ولټه قیمت ولري.



۱۵۹- شکل: د رادیولوژی متخصص ډاکتر غازي محمد سلطانی دیوه کلینیکی خطي تعجيل کونکي (Clinical Linear accelerator) په څنگ کې لیدل کیږي. د وړانګو درمل پوه په دې لټه کې دی چې د سیمولاسیون (Simulation) ټکنالوژي په مرسته سره د خطي تعجيل کونکي هغه زاویه او نور هندسي پارامېټرونه ولټوي، ترڅو د سرطان ناروغو نسجونو ته ټاکل شوې انرژي دوز په بشپړ توګه ورسېږي. په نوموړې کرنلاره کې ډیره پام لږنه دې ته وشي، چې د شاوخوا روغو نسجونو ته تر خپله وسه لږ وړانګې ورسېږي، تر څو سالمې حجری د وړانګو د زیان څخه وژغورل شي.

د کلینیکی خطي تعجيل کونکي سرچینې Electron gun څخه الکترونونه راوځي او د الکترو مقناطیسي څپو په مرسته سره تعجيل ورکول کیږي (Accelerating waveguide). دیوه مقناطیس په مرسته سره نوموړي الکترونونه په نوي درجه زاویه (90°) خپل سمت بدلوي او بیا په یوه فلزي نښه (Target) لګیږي. کله چې دغه الکترونونه د نښې اتومونو هستې ته نږدې کې تیریږي نو د کولومب برېښنايز قوه وړباندې اغیزه کوي اولکه یو موټر چې بریک ووهي، نو الکترونونه هم بریک کیږي او خپله حرکي انرژي د لاسه ورکوي اولور انرژي فوتون وړانګې ورڅخه منځ ته راځي. نوموړي وړانګې ناروغ ته مخامخ د یوه کولیماتور (Collimators) په مرسته سره فوکس کیږي.



دراديو تېراپي په کړنلاره کې د سرطان حجرو د بيخي له منځه وړلو په موخه دورانگو بشپړ دوز په عمومي ډول سره د پنځوس څخه تراويا گړې (50- 70 Gray) پورې ټاکل کيږي. نوموړې وړانگې داسې ویشل کيږي (Fraction) چې په يوه ورځ او يووړ سره دوه گړې 2 Gy او پينځه واره په اونۍ کې ناروغ ته ورکول کيږي او له دې کبله لږ څه شپږ اونۍ وخت نيسي.

د کيمو تيرابي (Chemotherapy) کړنلاره

دسرطان ځينې داسې ناروغۍ هم شته دي چې د راديو تېراپي او عملياتو په پرته د دواگانوپه مرسته سره هم له منځه تللای شي. نوموړې کړنلاره د کيمو تېراپي په نامه سره ياديږي.

کيمياوي تېراپي ددرمل پوهنې يوه داسې کړنلاره ده چې دسرطان ځانگړو ناروغيود حجرو د منځه وړلو او همدارنگه دځينوميکروبونودوژلو په موخه ديولرطبيعي اومصنوعي دواگانو څخه کار اخېستل کيږي. نوموړې دواگانې چې د کيموتېراپوتيک (Chemotherapeutic) په نامه سره ياديږي داسې خواص لري، چې د سرطان حجروپه ميتاباليزم باندې اغيزه کوي. په دې مانا چې دحجرې په يوه گرځيدونکې ځانگړي پړاو کې (Cell cycle) چې د (DNA-Synthesephase) په نامه سره ياديږي د دې اړين بېرته غبرگ جوړيدلو (Reduplication) اوکاپې کولو مخنيوی کوي. په نوموړې تگلاره سره کيموتېراپوتيک دواگانې دسرطان حجرو لپاره داسې پايله لري لکه زهر او له دې کبله يې وژني او په روغو حجرو باندې نسبتا کم ناوړه اغيزې لري. د کيموتېراپوتيک دواگانې په لاندې ډول ویشل شوي دي.

الکيل انځين (Alkylating agents = Alkylanzinen) :

د بېلگه په ډول لکه Cisplatin; Cyclophosphamid; Dacarbazin; Mitomycin; Procarbacin


انتي مېتابوليستين (Antimetabolisten) :

دبېلگه په ډول لکه: Methotrexat; Fluoruracid; Azathioprin; Mercaptopurin

انتي بيوتيک (Antibiotics)

د بېلگه په ډول لکه Daunorubicin; Doxorubicin; Mixoantro; Epirubicin

دکيمو تېراپي کړنلارې ښه والی د عمليات او راديو تېراپي په پرتله په دې کې ده، چې د بدن په هره برخه کې دواگانې کولای شي، چې د وينې او دلومف سيستم په جريان کې ننوځي او دسرطان حجروته ځان ورسوي او هغوي دمنځه يوسي. د کيموتېراپي دواگانې دسرطان ناروغۍ د ډول سره سم دعمليات او راديو تېراپي څخه وړاندې او يا وروسته ناروغ ته ورکول کيږي.



لومړۍ: اد جیووانت کیموتیراپي (Adjuvant Chemotherapy)

د کیموتیراپي دواگانې ناروغ ته د عملیاتو او یارادیوتیراپي ددرملنې په اخیږ کې پیل کیږي. دنوموړې کرنلارې گټه په دې کې لیدل کیږي چې د عملیات څخه وروسته دیوې خوا د سرطان ناروغۍ دبیرته راگرزیدلو (Rezediven) خطر کم کیږي او دبلې خوا د میتاستازو (Metastase) منځ ته راتلومخ نیوی وشي.

دویم: نیو ادجیووانت تیراپي (Neoadjuvant Chemotherapy)

د کیموتیراپي دواگانې ناروغ ته د عملیاتو او یارادیوتیراپي ددرملنې څخه په مخ کې ورکول کیږي. دنوموړې کرنلارې گټه په دې کې لیدل کیږي چې د عملیات څخه مخکې د سرطان نسجونه سره راغونډ وي او حجم یې کوچنی کوي.


دسرطان ناروغۍ د خطر رومي نښې

- ۱ - د یوې غدې ستریدل او د بدن په یوه برخه کې دغوشي څخه د یوه کلک غونډاري لکه مرغړي په شکل دیوې داني منځ ته راتلل. د بیلګې په ډول لکه دښخوپه تیوګي Breast knots
- ۲ - دپوستکې یوه خال او یا زخي warts په بڼه کې بدلون او د نورو خالونومځ ته راتلل
- ۳ - دکولمو او یا د میتیازو کڅوړې bladder په کار کولو کې بدلون
- ۴ - دستوني ډیر تخماریدل او ډیر ټوخیدل
- ۵ - دویني کمښت Anemia او یا د بدن خینو غړولکه د نس او یا مهبل (Vagina) څخه دویني بایلل
- ۶ - دهارمونوپه میتابالیزم اوکچه کې بدلون او همدارنګه د ښځې جامې یا حیز دریدل
- ۷ - دستوني څخه دخوراکي موادو تیروولو ستونځه
- ۸ - داشتها نشتوالي او دغوشي څخه کرکه کول
- ۹ - د زخم او پړهار بیرته نه جوړیدل
- ۱۰ - دسترګود لید کمښت او په غوړو ناڅاپي کونیدل
- ۱۱ - په لنډ وخت او یوه ناڅا په دوزن کمښت
- ۱۲ - پایښت لرونکی درد


دسرطان ناروغۍ د تشخیص په موخه یوه ډیره وتلې فزیکي کرنلاره د کمپیوتر توموګرافي په نامه سره یادېږي چې د بدن په درې بعدونو کې د اکسریز عکسونه اخیستل کیږي

☑ دافقي محور سطحه (Transversal plane): هغې عمودي سطحې ته ویل کیږي چې بدن په افقي ډول د سر نه پشوخوا ته په ساره پرې کوي.

☑ کورونال سطحه (Coronal plane = frontal plane): هغې عمودي سطحې ته ویل کیږي چې بدن په اوږدوسره په مخ یوه برخه او په څټ یوه برخه ویشي




✓ ز اګیتال سطحه (Sagittal plane): هغې عمودي سطحې ته ویل کیږي چې بدن د مخ نه شا خواته په دوه څنګونو برخو ویشي



۱۲۸- الف شکل: په کمپیوټر تومو گرافي کې د بدن اناتومي درې بعده محورونه اوسطحې ښودل شوي دي.


پوښتنې (Questions):

- ۱-۱۸ د سرطان ناروغۍ د درملنې نامتوکړنلارې په گوته کړی .
- ۲-۱۸ یو ښه ډوله پړسوب benign او د یوه ناوړه یانې خطرلرونکي پړسوب malignant پړسوب تر منځ توپیر څه دی؟
- ۳-۱۸ یوه ناروغۍ چې د درملنې وروسته بیرته راوګرزي څه نومېږي؟
- ۴-۱۸ د سرطان ناروغۍ د غټوالي او انګړوخواصو په اړوند د T, N, M درجه ورکولو څخه کار اخیستل کیږي. نوموړی ټکی د سرطان ناروغۍ او یا پړسوب په تړاو څه ما لومات وړاندې کولی شي؟
- ۵-۱۸ دایونایز کونکو وړانګوسوماتیک ستوخاستیک زیان څه ډول اټکل کولای شو چې ګڼه د سرطان ناروغي به منځ ته راولي او دخطر ضریب یې څومره دی ؟
- ۶-۱۸ د سرطان ناروغۍ دخطر دوولس نامتوپېژندل شوې رومبی نشي په گوته کړی؟
- ۷-۱۸ تومورمار Tumor marker څرڅه ته وايي ؟
- ۸-۱۸ ځینو ستاتیکا Zytostatika څه ډول مواد دي او اغیزه یې څه ده؟



د یورانیم مخ نیوی اودککړشووکسا نو ددرمل کړنلارې

- تر نن ورځ پورې یوه اغیزمنه فزیکي اویا طبی کړنلاره نه شته چې د تنفس شوي او یا بدن ته ورننوتلي یورانیم مخنیوی او یادرمل وکړي
- هغه چا ته چې یورانیم دتنفس، څښاک او یا خوراک له لارې بدن ته ور ننوتلی وی نوددې لپاره چې دیورانیم ذرې په غړوکی جذب نه شي، اود بدن څخه زر ووځي، نو دسودیم بیکاربونات (Sodium bicarbonate) یونیم په سل % 1,5 ټینګ شوی محلول د رگونو له لارې بدن ته ورتیر شي (Intravenous transfusion)
- که په چا ددې شک وشي چې ګڼه د یورانیم په موادوبه ککړ شوي وی، نو تر ټولو دباورورواوچټکه کړنلاره داده، چې هره ورځ په رڼې میتیازو(urine) اوخړې میتیازو(Faeces) کې دالفا شپیکترومتری تر سره شي او دیورانیم اکتیویټي اندازه شي. نوموړې اکتیویټي د پښتورګودکارکولوپه اړوندربښتونی اوګټورمالومات ورکوي.
- په بدن کې دغریب شوي یورانیم کچه د یوې حساسې فزیکي الې (کټلې ماس شپیکترومتر) په مرسته ترسره کیږي. ددې موخې لپاره د څلرویشته ساعتولپاره د ککړشوي وګړي رڼې میتیازې راټولیري اود یورانیم دوه سوه پینځه دیرش او یورانیم دوه سوه اته دیرش تناسب (U^{235}/U^{238}) ټاکل کیږي.
- هغه او به اوخوراکي مواد چې دیورانیم په موادو ککړ شوي وي وه نه خوړل شي
- هغه سیمې چې د یورانیم سرګولی پکې چاودلې وي د فزیکي الا توبه مرسته سره یې رادیو اکتیویټي اندازه شي اوبیا دهر لوري څخه د ازغن تار په مرسته سره احاطه شي. نوموړې سیمه د یوه رادیو اکتیو سمبول په مرسته نښانه شي اودعام اولس په تګ او راتګ بندیزولګول شي.
- دیورانیم په رادیو اکتیو موادو ککړشوي سیمه د مسلکي کارپوهانو په مرسته پاکه شي او نوموړي مواد یوه خوندي ځای ته ولیږدول شي.
- په هغه سیمه کې چې دیورانیم سرګولی چاودلې وي او هلته کوچنیان په ریګ اوخاوروکې لوبې کوي، نوددې امکان دپراتکل کیږي چې لاسونه او بدن یې په رادیواکتیو موادوککړشي اود تنفس اوخوراک څښاک له لارې دیرزیان ورته ورسیري. دمخ نیوی لپاره بایدې دي چې د اړتیا ورسربښتي ونیول شي اودکوچنیانودککړتوب اکتیویټي اندازه شي
- دیورانیم هغه سرګولی چې په خاوروکې ځینې پرتې وي او نه وي چاودلې هیڅ کله په لاس کې وه نه نیول شي . داځکه چې دورانګو کچه یې دوه ملي سیورت په ساعت کې ده
- که چیرته په ککړشوي سیمه کې څوک د پښتورګودرد څخه دیرشکایت لري نو دډیالایزېس درمل (Dialysis treatment) سپارښتنه هم اړینه ده. که چیرته د پښتورګوتوبولوس ته زیان رسیدلې وي نو په رڼې میتیازو کې د دبیتا مایکروګلوبولین پروتوتین کچه پورته ځي. β_2 -microglobulin
- دسینې اکسریز عکس اخیستل دیورانیم غټي ذرې په سږو کې رابرسیره کوي



دوولسمه برخه

نونسم څپرکی

لنډيز (Summary)


طبيعي يورانيم يوراديو اکتیو فلز دی چې دهستوي بټی لپاره د سونگ موادو په موخه ورڅخه کاراخیستل کیږي. طبيعي يورانيم د دووايزو توپوڅخه جوړدی چې يو يي يورانيم دوه سوه اته دیرش نومویري او نهه نوي عشریه دری په سل اوبل يي يورانيم دوه سوه پینځه دیرش نومویري او دری په زرمه برخه تشکیلوي. په هستوي بټی کې د يورانيم دوه سوه پینځه دیرش برخه د سونگ موادو په موخه بډای کیږي او تر لږڅه دری په سلو کې پورته کیږي.

غریب شوی يورانيم (Depleted Uranium) د طبيعي يورانيم هغه ډول مرکب تشکیلوي چې د غني کولو په کړنلاره کې دیورانيم دوه سوه پینځه دیرش سلیزه برخه د صفر عشریه اووڅخه (0,7%) تر صفر عشریه دوو (0,2%) پوری راتیټه شوي وي. نوموړی فلز د طبيعي يورانيم هغه وروسته پاتې فاضله مواد و ته ویل کیږي، چې د چاودیدونکي يورانيم دوه سوه پینځه دیرش U-235 د بډای کولو په کړنلاره کې پاتې کیږي.

د ۱۹۹۱ څخه راپدې خوا دنړي ډیر هیوادونه د غریب شوی يورانيم څخه په پوځي موخه لکه په ټانکونو، سرگولیو او توغنديو کې دیوه کلک او چاودیدونکي فلز په صفت کاراخلي. څرنګه چې دنوموړي فلز کثافت د اوسپنې پرتله لږ څه دری ځله لوړدی نو له دې کبله د يورانيم سرگولی دهغوی د سرعت سره سم په ډیره اسانۍ سره دپوځي الوتکو، ټانکونو او نورو هغو پوځي وسلو څخه چې د اوسپنې او یانورو فلزاتو څخه جوړي وي تیریدلای شي او هغوی بیخي له منځه وړي.

کله چې دیورانيم یوه سرگولی په نښه ولګیږي نو سمدلاسه په کوچنیو ذرو اوږي او بیا وروسته لکه چاودیدونکي کیمیاوي مواد پخپله اوراخلي او په پایله کې چاپیریال ته دغاز یا ایروزل (Aerosol) په بڼه دباد په واسطه خواره واره کیږي. دغه راديو اکتیو گرد د اتموسفیر څخه دځمکې په مخ پریوځي او بیا ژورو اوبو ته هم لاره پیدا کوي چې په دې ډول په چاپیریال کې ټول ژوندي اونه ژوندي شیان په راديو اکتیو موادو ککړ کیږي. نوموړي مواد کیدلای شي چې دخوراک، څښاک او دتنفس له لاری بدن ته ننوځي.

په دغه راديو اکتیو غاز کې دیورانيم دورو ذرو قطر لږڅه لس میکرو متره دي نو له دې کبله په آسانۍ سره د تنفس له لاری سږو ته ور ننوځي. یوه برخه یې په سږو کې جذب کیږي او پاتې برخه یې د وینې له لاری د بدن ټولو غړو ته لیریدول کیږي چې بیا هلته د هر غړي څخه په توپیر سره جذب کیږي. دبیلګه په ډول شپيته په سل (60%) په هډوکو، شپاړس په سل (16%) په سږو،



اته په سل (8%) په پښتورگوکي جذب کيږي. په سږو کې د یورانیم بیاوژیکي نیمايي وخت دښپار سوکالوڅخه هم اوږي.


 د یورانیم هغه برخه چې د بدن په پلنو هډوکو کې جذب شوې وي کوم چې د ټول بدن لپاره وینه جوړوي نود هډوکوماغزوته وړانګې رسوي. که چیرته دویني حجرې دورانګودناوړه اغیزې په پایله کې زیان ومومي نوټولې هغه حجرې چې دهغوي څخه نورې نوې حجرې جوړیږي هم نیمګړې وي، اوله دې کبله دموتیشن او د وینې سرطان ناروغۍ سبب (لامل) ګرځېدلای شي. په پایله کې دویني کمښت، دویني دفاع سیستم (Imunsystem) کمزورتیا، درنګ سپینوالی، د انتاني ناروغي اونورې ناروغۍ منځ ته راځي.

 دلږ څه یو کال نه وروسته یورانیم په توریم (Th-234) او پروتاکتینیم (Pa-234) تجزیه کيږي اودالفا وړانګو په څنګ کې د بیتا او ګاما وړانګې هم خپروي نوله دې کبله دچاپیریال ټولواوسیدونکو، نباتاتو، ځنګلونو، څلورپښیواونورو ژوندسوري اورګانیزمو ته په راتلونکوڅو لسيزو کې دخطریوهر سرچینه ګرځېدلای شي. داځکه چې دنوموړو اورګانیزمو دې این ای د یورانیم وسلود کیمیاوي، فزیکي، بیاوژیکي، اووړانګیزو زهرجنوناوړواغیزوپه پایله کې موتیشن منځ ته راولي.

 دغریب شوي یورانیم فزیکي نیمايي وخت څلورنیم ملیارده کاله دی. دا په دې مانا چې دنوموړي وخت څخه وروسته د یورانیم اکتیویټي د لومړي وخت په پرتله نیمايي ته راوړي. نوله دې کبله هغه سیمې چې د یورانیم وسلې پکې خورې وړې شوې او په رادیو اکتیو موادو ککړې شوې وي تر زرګونو کالو پورې به هم په نوموړي عنصر اودتجزیې په کړنلاره کې پیدا شوو نویورادیو اکتیو عنصر ونو ککړې پاتې شي.

 د یورانیم فلز لکه سیماب (Hg)، ارزین (Arsen)، سرپ (Pb) او نیکل (Ni) یوډیر زهرجن فلز دی چې د بدن ډیر وغړو دندې په تیره بیا د پښتورگو کارکول نیمګړی کوي. دنړیوال روغتیا سازمان د سپارښتې سره سم دعام وګړو لپاره په یوه ګرام پښتورگوکي د یورانیم اندازه د دریو مایکروګرام (3µg) څخه وانه وړي.

 څرنګه چې د یورانیم وسلوڅخه په ډیره ټیټه کچه وړانګې خپریږي، چې لیول یې د څوملي سیورت نه هم نه اوږي نو له دې کبله دورانګو زیان یې یوه تصادفي اغیزه یا ستوخاصتیک اغیزه ګڼل کيږي چې اټکل یې یوازې د احسایوې شمیرنې په بنسټ ولاړدی. خو د تیوري له مخې لکه د الفا وړانګو یوه ذره او یا یو فوتون هم کولای شي چې د بدن په حجرو Somatic cell او یا جنسي حجرو Genetic cell کې دومره بدلون یا موتیشن راولي چې په پایله کې ډیر کاله وروسته په همغه نسل کې دسرطان ناروغۍ اویا په راتلونکو نسلونو کې عیبناک (Malformation) او لادونه منځ ته راشي. دورانګو ستوخاصتیک اغیزې یوازې هغه وخت بې زره ګڼل کیدای شي چې دورانګوانرژي ډوزیې صفر قیمت ولري یانې چاته هیڅ وړانګې وه نه رسیږي.



اخرنی خبرې او پایله

دگران افغانستان په خاوره کې اوه ویشټ کلنې جگړې دا په ډاگه کړه چې تر نن ورځ پورې افغان ولس د یوې خوا گڼ شمیر ژوندي دښمنان او د بلې خوا نه ژوندي دښمنان لري. د بېلگه په ډول د نه ژونديو او اوږدې مودې دښمنانو په پله کې لاندنۍ وسلې شمیرل کېږي.

د ۱۹۸۰م کال څخه راپدې خوا د هیواد په هر گوټ کې دیورانایوم وسلو څخه د جگړې په ډگر کې کار اخیستل کېږي او په پایله کې چاپیریال په رادیو اکتیو او زهرجنو موادو ککړ کېږي.


په ټول هیواد کې د ماینونو (land mines) شته والی داسې پایله رامنځ ته کړې چې په راتلونکو لس گونو کالونو کې چاپیریال د افغان ولس لپاره د خطر یوه ستره سرچینه او غمیزه وگرځي.

د ۱۹۹۸م کال څخه راپدې خوا د افغانستان گڼ شمیر گاونډي هیوادونه هستوي ازموینې تر سره کوي. په نوموړې کړنلاره کې د هیواد چاپیریال په رادیو اکتیو موادو ککړ کېږي.

څرنگه چې دیورانایوم وسلود ناوړو اغیزو په اړوند تر ننه پورې د یوې علمي اود باور وړ څیړنې د بې پلوه حکومتونو او نامتو پوهنیز ټولنوله خوا نه دي تر سره شوي نو دیورانایوم وسلود هستوي وړانگود رښتونی زیان اټکل تر اوسه پورې ډیر سخت او گنگ پاتې شوی دی. دا ځکه چې:

تجربو وښودله چې د سرطان هغه ناروغۍ کوم چې د یورانیم وسلو د استعمال په پایله کې منځ ته راتلای شي، اود سرطان هغه ناروغۍ کوم چې په چاپیریال کې دنورونو او اغیزو، لکه کیمیاوي زهرجنو موادو، په طبابت کې د وړانگو کارول، په چاپیریال کې طبیعي وړانگې، د چرنوبیل هستوي وړانگې، هستوي ازموینې او د هستوي بټیو څخه را پیدا کېږي دنوموړو ټولو تر منځ په کلینیکي تړاو کوم توپیر کیدلای نه شي.

ددې لپاره چې په دې هکله یوه غوڅه پریکړه وکړای شو، په دې مانا چې گڼه د یورانایوم وسله په کومه کچه داوولس په روغتیا او په چاپیریال باندې ناوړه اغیزې لرلې، نو اړینه ده، چې په دې اړوند د ټیټې کچې وړانگو په هکله نورې علمي څیړنې په ملي اونړیواله کچه تر سره شي. د ټیټې کچې وړانگې او لوړې کچې وړانگې بیلگې په لاندې ډول دي.



په لوړه کچه وړانګې (High level radiation) لکه په جاپان باندې داتوم بم وړانګې، او يا داتومي وسلود کارولوپه پايله کې چاپيريال ته خپرې شوې وړانګې چې دانرژي ډوزي ډيو ګرې ($>1\text{Gy}$) نه پورته وي.

په ټيټه کچه وړانګې (Low level radiation) لکه ديورانم وسلو وړانګې، په طبابت کې د وړانګواستعمال، په چاپيريال کې طبيعي وړانګې، ډچرنوبيل هستوي وړانګې، ديوراننيوم دکان کېندنې وړانګې، او د هستوي بټيوخه ازاد شوې وړانګې چې دانرژي ډوزي ډيو ګرې څلورمې برخې ($<0,25\text{Gy}$) نه ښکته وي. نوموړې وړانګې دطبيعي وړانګوپه پرتله لږ څه سل برابره دي.

د ۱۹۴۰ م کال څخه راپدې خوا دلوړې کچې وړانګې په هکله ګڼ شمير اپيدېمولوجي Epidemiology څيړنې تر سره شوې دي چې د تجربو په بنسټ دوګورووختيا او چاپيريال ته د زيان خطراتکل وړاند ورپه درياضي موډلونه په مرسته تر سره کيدای شي.

په داسې حال کې چې د خلکو روغتيا په تړاو د لوړې کچې وړانګو دزيان اوخطر په هکله دنړيوالومسلکي ساينس پوهانو تر منځ پوره يووالی شته دی خو د ټيټې کچې وړانګو په هکله ساينس پوهان په دوه ډلو ويشل شويدي.


لومړۍ ډله پوهان: (3;4;79;83)

هغه ډله پوهان اونړيوال سازمانونه دي چې دخلکو روغتيا اوچاپيريال ته د ټيټې کچې او ديوراننيوم وسلې وړانګې داندېشنې وړ نه ګڼي او په لاندې ډول خپل نظرو وړاندې کوي.

د ديوراننيوم وسلودخطر کچه دهغو حکومتونوله خواچې دجګړو په ډګر کې ديوراننيوم وسلو څخه کار اخلي نه منل کيږي اود زيان احتمال يې په چاپير يال کې د طبيعي وړانګو اونورو زهرجنوکيمياوي اوبيالوژيکي موادو سره برابراتکل کوي.

داتومي انرژۍ نړيوال سازمان (IAEA)، دملګرو ملتودچاپيريال ساتنې کمسيون (UNEP) او د نړيوال روغتيا سازمان (WHO) د يوراننيوم وسلو زهرجنې اووړانګوناوړه اغيزې مني، خو د زيان کچه يې ډيره ټيټه او داندېشنې وړ نه ګڼي.

په نړۍ کې وتلي مسلکي کارپوهان (83;57;47) ديوراننيوم وسلودخطر کچه دعامو وګړو روغتيا ته داندېشنې وړ نه بولي. دبيلګې په ډول مېکډيارميډ (McDiarmid et al 83) لږ څه دوولس کاله وروسته په هغو عسکرو باندې چې په ۱۹۹۱ م کال کې يې دګلف خليج په جګړه کې برخه اخيستي وه بياالوژيکي او کلينيکي تجربې تر سره کړې. نوموړو کارپوهانودګڼ شمير عسکرو ميتيازې په يوه موده کې د څلرويشت ساعتونولپاره راټولي کړې اود يوراننيوم غلظت کچه يې دځانګړې (ICP-MS) تکنالوژۍ په مرسته سره اندازه کړه. دتجربوپايلو په ډاګه کړه چې دعسکروپه بدن کې د يوراننيوم کچه دطبيعي کچې سره برابره وه.



دويمه ډله پوهان: (1;2;5)


هغه ډله پوهان اونړيوال بې پلوه علمي سازمانونه دي چې دخلکو روغتيا اوچاپيريال ته د ټيټي کچې او ديورانيم وسلې وړانگې په راتلونکو څو کالونو کې بيخي داندېشنې وړ گڼي او خپل نظر په لاندې ډول وړاندې کوي.

دويمه ډله نړيوال بې پلوه مسلکي ساينس پوهان اوپوهنيزنا دولتي ټولنې د بيخي نوو څيړنو او اپيديمولوژي شميرنوپه بنسټ نه يوازي دلوري کچې، بلکه د ټيټي کچې وړانگې دخطر څخه هم ډيره اندېښنه ښيي. نوموړې ډله مسلکي پوهان په ډاگه کوي، چې د هغو پخوانيو فرضيو (Hypotheses) کلاسيک موډلونه، کوم چې په جاپان باندې داتوم بم دکارولونه وروسته د ژونديو پاتې شوو دسرطان په ناروغۍ اخته کسانوڅيړنو او اپيديمولوژي شميرنوپه بنسټ ترلاسه شوي دي، دټيټي کچې وړانگو لپاره د باور وړ نه دي. داځکه چې دغه کلاسيکي موډل دټيټي کچې وړانگو دخطر ضريب کچه ددرندو هستوي ذرو لکه د الفادري لپاره کله چې دخوراک څښاک له لارې بدن ته ننوځي بيخي لږ ښيي. نوموړې ډله پوهان د ټيټي کچې وړانگې لکه ديورانيم وسلې دخطر ضريب په هکله خپل دريزونه لاندنيو ورته هستوي پيښو، نويو څيړنو او اپيديمولوژي شميرنوپه بنسټ په ډاگه کوي (61-65).

هغه حجرې چې دورانگودرنا کيدوپه پايله کې ورته زيان رسيدلي وي خوبيا هم ژوندي پاتې شوي وي. په ډير احتمال سره به په نوموړو حجرو کې څوکاله وروسته دغه وررسيدلي نيمگړتيا را برسیره شي (Genomic instability)

دبايسټېنډراغيزه (Bystander effect) دټيټي کچې وړانگو يوه بيخي نوې او ازمويل شوې بيالوژيکي هغه ناوړه اغيزه په گوته کوي چې درنا شوو حجرو په شاوخوا گاونډيو حجرو کې پيښيږي او زيان ورته رسوي. په داسې حال کې چې گاونډيو حجرو ته هيڅ وړانگې هم رسيدلي نه وي. ددېلکه په ډول دځانگړو حجرو په کلچرکې (Cell culture techniques) يولر تجربو وښودله چې دهستوي درندو ذرو لکه دالفا ذره اود ټيټي کچې انرژي ډولز لپاره د پيژندل شوو فرضيو (Hypotheses) پر خلاف په دې اړين کې دورانگو د موتیشن خطر کچه لږ څه دلسو نه تر سل ځله پورې لوړه ده (61-65).

دټيټي کچې وړانگو دخطر وړاند ويني اټکل تراوسه پورې ديوې خطي بريد نه لرونکي فرضي (Linear-non threshold hypothesis =LNT) په بنسټ تر سره کيږي چې په نړيواله کچه دډيرو مسلکي پوهانو له خوا منل شوی او دباور وړ موډل تشکيلوي. نوموړی فرضيه داسې مني، چې که دورانگو يوه ذره د دې اړين کې يوه ماليکول سره غبرگون وکړي، نو په پايله کې کولای شي چې د سرطان ناروغۍ منځ ته راولي (66). دا په دې مانا چې دسرطان حجرو راپاريدلو احتمال د الفا ذرو دشمير سره سم سيخ متناسب دی. نوکه دالفا لس ذرې د بدن يوه ډي اړين کې په يوه ماليکول ولگيږي نو د سرطان دمنځ ته راتلو خطر يې هم لس ځله پورته ځي. دا په دې مانا چې څومره ډيرې ذرې د دې اړين کې (DNA) په ماليکول ولگيږي نو په



همغه کچه يې د زیان احتمال هم زیاتیري. دنوموړې تیوري په اساس دورانگودخطرڅخه که په هره کچه هم وي خلاصون نه شته (No level of radiation is safe).

❏ ځینې نړیوال بې پلوه اونه حکومتې پوهنیز ټولنې په ډاگه کوي چې په عراق ، په پخواني یوگوسلاویا (کوسوو) ، کووایت او افغانستان کې د یورانیم وسلې کارول شوی دي (1;2;5). په نوموړوسیمو کې خلک د یو لږ ناروغیو څخه کیدوڅخه وروسته شکایت لري. **دبېلگه په ډول:**


د هډوکو خوږیدل، دغړو کمزورتیا، تبه لرل، عصبي تکلیف، دسترگو دید کمښت، سرخوږیدل، دحافظې کمښت، ژورخفگان (Depression) او داسې نور.

دبېلگه په ډول دنړۍ بې پولې ډاکتران (84) په ډاگه کوي چې په ځینوهیوادولکه عراق اویوگوسلاویه کې دسرطان ناروغۍ کچه د پخوا په پرتله څو ځله پورته تللې ده. دنوموړو وسلو په کارولو سره د سیمې وگړو په تیره بیا په کوچنیانو کې دویني سرطان، د معیوبو ماشومانو زیږیدل (Malformation) دپخوا په پرتله ډیرښت موندلې دی.

❏ هغو عسکرو چې پخپله دیورانیم وسلو په کارولو او یا دخلیج جگړې په ډگر کې دنده تر سره کوله په گوته کوي چې دنوموړو وسلوله کبله دهغوی روغتیا ته زیان رسیدلی دی. د بیلگې په ډول دهغوی په رنې میتيازو کې (Urine) دنوروکنترول کسانو په پرتله په لوړه کچه یورانیم اندازه شوی دی او دښوږ په ناروغۍ اخته دي (Nephritis) . په دغو عسکرو او د سیمې په وگړو کې یو ډول نوي ناروغي منځ ته راغله چې د گلف جگړې سینډروم (Gulf war syndrome) په نامه سره یادیږي. د نوموړې ناروغۍ وتلې کلینیکي نښې د بدن ددفاع سیستم (Immune system) کمزورتیا اود معیوبو ماشومانو زیږیدل دي (68).

❏ دملگرو ملتو دچاپیریال ساتنې پروگرام ټولنې (UNEP) درادیو کیمیاوي تحلیل تجربوپه ډاگه کړه چې په پخواني یوگو سلاویا کوزوو (Cosoovo) کې د یورانیم داسې سرگولی کارول شوی دي چې نور ډیر رادیو اکتیو اوډیر زهرجن ایزوتوپونه لکه یورانیم دوه سوه شپږدیرش، پلوتونیم دوه سوه نهه دیرش، پولونیم دوه سوه لس او نیپتونیم عنصر هم پکې شته دي. نوموړي ایزوتوپونه په مصنوعي ډول سره په هستوي بټۍ کې منځ ته راځي او دروغتیا په تړاو تر ټولو د اندیښنې وړ دي. داځکه چې هغوی دیوې خواډیرسخت زهرجن مواد اودبلي خوا ډیر رادیواکتیو خاصیت لري (82).

❏ یوه بله اړینه اودیورانیم وسلو سره ډیره ورته اپیدېمولوژي شمیرنه په هغوپیښه څلویښت زرو کارگرانو تر سره شوې ده، چې د ۱۹۴۶ م کال څخه تر ۱۹۹۰ م کال پورې دجرمني هیواد یورانیم په کانو کې په کارونو بوخت وو. دنوموړو کارگرانو څخه تر نن ورځ پورې لږ څه نیمایي د سږي سرطان، د هډوکو سرطان او دویني سرطان په ناروغۍ مړه شوي دي او دغه لږۍ نورهم پایښت لري. دغوکارگرانو د رادون رادیواکتیو غاز (Radon) چې الفا وړانګې خپروي په ټوله موده کې تنفس کړی وه. په دې تړاو باید وویل شي چې دغریب شوي یورانیم دالفا وړانګواکتیویټي درادون غاز په پرتله ډیره لږ ده. خو که دیورانیم په وسلو کې دهستوي بټۍ د سونګ سوځیدل شوي فاضله مواد وکارول شي چې دپلوتونیم اونور ایزوتوپونه هم پکې گډ شوي وي نو د روغتیا په تړاوډیر داندیښنې وړگڼل کیږي (29).



دافغان دولت چارواکو ته وړاندیزونه


په پښتو کې یو متل دی چې: **(هغه ځای سوځي چې اور په بلیري)**. دا رښتیا خبره ده چې نن ورځ په افغانستان کې اور بل دی، خو هغه څه چې دکارپوهانو په وس کې پوره وي باید ډگرته راوړي. دا په دې مانا چې که چیرته دافغان دولت چارواکي د خپل ولس دروغتیا، سلامتیا او د هیواد چاپیریال ساتنې سره د زړه له کومې مینه لري نو په لاندنیو وړاندیزونو، د خپل ملي او نړیوالو مسئولیتونو په پام کې نیولو سره په دې اړه ټینګ او موثر ګامونه واخلي.

✕ څرنگه چې افغانستان د اتومي انرژۍ نړیوال سازمان (International Atom Energy Agency = IAEA) او هم دنړیوال روغتیا سازمان (World Health Organization = WHO) یو ډیر پخوانی او ټینګ غړی دی، نو د نوموړو سازمانو د منشور سره سم مجبور او مکلف دی، چې په رادیواکتیو هستوي موادو او زهرجنو کیمیاوي او بیالوژیکي موادو باندې د چاپیریال ککړتوب کچه د خپل تخنیکي، علمي او مالي وس سره سم ټیټه وساتي او د یوه ټاکلي کچې یا لیول (Level) څخه وانه وړي. په دې اړوند دایونایز کونکو وړانګو د خطر څخه د ځان ساتنې نړیوال کمیسیون، (International Commission of Radiation Protection = ICRP) په یوه څپرکي کې لاندنۍ سپارښتنه لیکل شوې ده:

د هر یوه هیواد وګړو روغتیا او چاپیریال دایونایز کونکو وړانګو د خطر څخه چې څومره په تخنیکي، تنظیمي، او علمي توګه امکان ولري باید دوس سره سم خوندي او په امن کې وساتل شي. نوموړې ماده په علمي اثارو کې د الارا (ALARA) پرنسپل په نامه سره نامتو ده.

✕ دافغان دولت مسئول چارواکي باید دنړیوال اتومي انرژۍ سازمان (IAEA) او همدارنګه د روغتیا نړیوال سازمان (WHO) څخه په رسمي توګه غوښتنه وکړي چې په ښکمنو سیمو کې داوسیدونکو د ناروغیو پیژندلو په تړاو چې دیورانیم وسلو سره اړیکې ولري څیړنه پیل کړي.

✕ نوموړې موخې ته درسیدلویه خاطر باید دافغانستان واکمن چارواکي سمدلاسه دنړیوال اتومي انرژۍ سازمان (IAEA) او دنړیوال روغتیا سازمان (WHO) په مرسته یوه څیړونکي پروژه پرانیزي چې دیوې خوا په رادیواکتیو موادو د ټول هیواد د چاپیریال ککړتیا کچه شپه او ورځ یانې د څلېروینسټ ساعتونو په موده کې دیوې څارونکې آلې (Environmental Monitoring) په واسطه اندازه کړي او د بلې خوا دسرطان ناروغۍ په تړاو د ثبت او پر لیکه کولو یوه اېپي ډېمولوجي شمیرنه (Epidemiological cancer register statistic) په ټول هیواد کې پیل کړي.




❏ ددې لپاره چې په افغانستان کې د یورانیم وسلو په هکله د نړیوالو پلوی پوهنیزو ټولنو خپور شوي طبي مالوماتو رښتونوالی وازمویل شي، نو ددې اړتیا لیدل کېږي چې پخپله افغان مسلکي کار پوهان د اړوندو سیمو اوسیدونکو په رڼو میتیازو (Urine) ، وینه او چاپیریال، لکه اتموسفیر، نباتاتو، ځنگلنو، دڅښاک اوبو او دځمکې پرمخ د یورانیم کچې او اندازې څیړنه او سپیناوی وشي. څرنگه چې په رڼو میتیازو او وینه کې د فزیکي او بیالوژیکي دوزیمترې په مرسته سره د یورانیم ټاکل شوي کچه، د هغه یورانیم سره چې په ټول بدن کې جذب شوي وي سم سیخ اړیکې لري نو د نوموړې کړنلارې له مخې سړی کولای شي چې تر ډیرو کالوڅخه وروسته هم په بدن کې د یورانیم کچه وټاکل شي او دروغتیا دناورو اغیزو په هکله وړاند وینه تر سره کړي.

❏ د یورانیم په وسلو کې ددو اړینو ایزوټوپونو لکه ($^{235}\text{U}/^{238}\text{U}$) د پیژندلو په موخه یو لړ فزیکي آلې لکه دکتلی شپکټرومتریو وتلې د ستگاه (Inductively coupled plasma mass spectrometry) او دالفا، بیتا او گاما وړانگو د یدکتورونه دکابل پوهنتون طبیعي علومو پوهنځي په واک کې ورکړه شي. بیا د یو شمیر افغاني اونړیوال وتلو استادانو او کارپوهانو له خوا پراخ بنسټیز ریسرچ او څیړنې پیل شي. نوموړې دستگاه د نړیوال مرستو د پروژو په لړ کې تر لاسه شي.


❏ څرنگه چې د افغانستان حکومتي چارواکي د هراړخیزو ناوړه موادو لکه بیالوژیکي، کیمیاوي اورادیواکتیو موادو څخه د چاپیریال د پاک ساتلو او د عام ولس دروغتیا د ساتلو مسؤلیت په غاړه لري، نو له دې کبله مجبور او مکلف دي چې په دې هکله خپلې ټولې هغه څیړنې چې د چاپیریال ککړتوب په هکله په لاس کې لري خپل ولس اونورونړیوالو سازمانونو ته په رسمي ډول وړاندې کړي.

❏ د تجربو په بنسټ باید ددې لټونه وشي چې دهیواد په کومه یوه سیمه کې خوبه د یورانیم په وسلو کې دهستوي بټی د سونگ سوځیدل شوي فاضله مواد (Nuclear power plant waste fuel) نه وي کارول شوي. داځکه چې په نوموړو موادو کې په هستوي بټی کې په مصنوعي ډول جوړ شوي رادیو ایزوټوپونه لکه پلوتونیم دوه سوه نهه دیرش Plutonium 239 اونور هم ورگډ شوي وي.

❏ هغه سیمې چې د یورانیم سرگولی پکې چاودلې وي د فزیکي الا توپه مرسته سره یې رادیو اکتیویټي اندازه شي. د یورانیم په رادیو اکتیو موادو ککړ شوي سیمه باید د مسلکي کارپوهانو په مرسته پاکه شي او نوموړي مواد یوه خوندي ځای ته ولیردول شي. وروسته بیا دهر لوري څخه د ازغن تار په مرسته سره احاطه شي. نوموړې سیمه د یوه رادیو اکتیو سمبول په مرسته نښانه شي اود عام ولس په تگ او راتگ بندیز ولگول شي. په ۱۹۶۶ شکل کې د وړانگو د خطر رادیو اکتیو نښانه یا سمبول ښودل شوی دی.



Radiation hazard symbol




دبندیز سیمه Forbidden Zone

Radioactive contamination

رادیو اکتیو ککرتیا


۱۹۶- شکل: د وړانګود خطر نښه یا سمبول

(ومن الله توفیق)




اځونه (References)


1. A. Durakovic: Uranium Medical Research Center, Washington DC –USA
2. Dai Williams: “Mystery Metal Nightmare in Afghanistan”, 2002
3. WHO , Depleted Uranium (Sources, Exposure and Health Effects) , 2001
4. International Atomic Energy Agency Reports Series 2003,Vienna
5. World Uranium Weapons Conference ; Hamburg/Germany Oct. 2003
6. E.B. Podgorsak, „Radiation Oncology Physics“, A Handbook for Teachers and Students, IAEA 2005
7. Th. Herrmann: „klinische Strahlenbiologie;Gustav Fischer Verlag, 2000
8. Pschyrembel :“ Klinisches Wörterbuch 260 Auflage 2004
9. Sauer, Rolf: Strahlentherapie und Onkologie 2004 (Urban & Fischer)
10. Achakzi, D. : Deutsch –Afghanisch, 1990
11. Günter, Rack : Mathematisch Naturwissenschaftliches Wörterbuch; Deutsch- Dari ; Julius Gross Verlag 1977
12. WAK Foundation for Afghanistan : The ethnic composition of Afghanistan, Safi Druck Verlag 1998 ; Peshawar–
13. W.Jacobi et all ; Verursachungs-Wahrscheinlichkeitvon Lungenkrebs durch die berufliche Exposition von Uran-Bergarbeitern der WISMUT AG; GSF-Bericht S-14/92
14. H. Fritzsche, Eine Formel verändert die Welt, Piper Verlag GmbH München, 2003 Germany
15. JRCunningham, The Physics of Radiology, Charles Thomas Publisher, 1983 USA
16. Samuel Glasstone, P.Dolan “ The Effects of Nuclear Weapons” 1964”
17. Spektrum der Wissenschaft: “ Radioaktivität” 1/1997
18. International Commission on Radiological Protection, Report No. 60 (1991) 1990 Recommendations of the International Committee on Radiological Protection
19. Annals of the ICRP, vol. 21, no. 1-3. Oxford, New York: Pergamon Press, 1991, p. 15.
20. National Research Council, Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations. “Health Effects of Exposures to Low Levels of Ionizing Radiation (BEIR V)”. Washington, D.C.: National Academy Press, 1990, pp. 27-30.
21. National Research Council 1990, pp. 5-8.




22. U.S. Environmental Protection Agency. Issues Paper on Radiation Site Cleanup Regulations. EPA 402-R-93-084. Washington, D.C.:Office of Radiation and Indoor Air, September 1993, p.7.
23. Hanno, Krieger Strahlenphysik, "Dosimetry und Strahlenschutz", Band 1, 5. Auflage, Teubner Verlag, 2002
24. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). "Sources, Effects, and Risks of Ionizing Radiation". New York: United Nations, 1993, pp. 16-17
25. Carlson A. Perez, W. Brady, "Principles and practice of Radiation Oncology"; J.B. Lippincott Company; Fourth Edition, 2002
26. Eric J. Hall, "Radiobiology for the Radiologist", Fifth Edition, Lippincott & Williams Wilkins, New York, 2000
27. International Atomic Energy Agency (IAEA), "Radiation, People and the Environment", Vienna, 2004
28. International Atomic Energy Agency (IAEA), Scientific & Technical Publication, 2005
29. P. Jacob, "Von Roentgen bis Tschernobyl" 2006, <http://www.gsf.de/>
30. www.sprawls.org/ppmi2/RADIOACT/
31. www.infokreis-kernenergie.org/informationskreis/de
32. www.wise-uranium.org/
33. www.chernobyl.info/ - 66k - 3. Mai 2006
34. www.kernenergie.net/documentpool/basiswissen2005.pdf
35. www.science.mcmaster.ca/mciars/Doug%20Boreham/Website_July2/basic clinical.htm
36. www.wisc.edu/wolberg/breast.html#anatomy
37. www.sprawls.org/ppmi2/RAD
38. www.wellesley.edu/Chemistry/chem227/nucleicfunction/cancer/adenop53.gif
39. www.Imaginis.com, Copyright © 1997-2006 Imaginis Corporation,
40. www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/eprmedt/Day_3/Day_3-10.pps
41. www.uic.com.au
42. International Commission on Radiological Protection (ICRP)
43. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR)
44. National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP)
45. Biological Effects of Ionizing Radiation (BEIR)
46. Radiation Effects Research Foundation (RERF)
47. Strahlenschutzkommission (SSK)
48. Vano E., Gonzalez L., et al, Br.J. Radiol. 71: 954-960 (1998)
49. H. Cember, Introduction to health physics, 3rd ed., McGraw-Hill, 1996, p.132
50. Siemens Aktiengesellschaft, Medizinische Technik, Daten, Formeln, Fakten, Ausgabe 1991



51. T.Laubenberger, "Technik der medizinischen Radiologie" Deutscher Ärzte Verlag 1986
52. www.practicalphysics.org
53. www.google.de/search?hl=en&q=chart+of+plato
54. [www. Varianinc.com](http://www.Varianinc.com)
55. The Lancet Volume 351, issue 9103 , 28 Feb. 1998
56. www.Ortec-online.com
57. www.gsf.de
58. www.arpansa.gov.au/basics/units.htm
59. www.duob.org.uk/minutes23.pdf
60. www-ns.iaea.org "International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources , 2003)
Safety Series No. 115"
61. <http://www.traprockpeace.org/1476-069x-4-17.pdf>
62. Hall E.J.; „The bystander Effect“ Health Physic 2003; 85(1);31-5
63. Zhou H, et all ;"Radiation inuced bystander effect ." Adv. Space Res. 2004, 34(6); 1368-72
64. Suzuki M; "Heavy charged particles produce a bystander effect "; Biol Sci Space, 2004,18(4);241-6
65. www.nupecc.org/iai2001/report/B41.pdf
66. www.newscientist.com/article.ns?id=dn6550
67. www.haciendapub.com/article50.html
68. Hodge SJ et al; „Detection of depleted uranium in biological samples from gulf war veterans“; Mil.Med. 2001, Dec;166(12 suppl):69-70
69. www.cancerhelp.org.uk/
70. Bushberg J,T,Seibert J.A.,Leidholdt et al ;"The essential physics of medical imaging"; Baltimore , Williams & Wilkins 1994
71. wikipedia.org/wiki/Uraninit
72. www.iaea.org/NewsCenter/Features/DU/du_qaa.shtml
73. Chadwick, KH, and HP Leenhouts" The Molecular Theory of Radiation Biology. Springer Verlag. Berlin. 1995
74. Sinclair, W.K.;"Risk research and radiation protection";Radiation Res.112(1987)191-216
75. Morenburg,H,"Bildgebende systeme für die medizinische Diagnostik" Siemens Aktiengesellschaft MCD Verlag Erlangen 1995
76. Bond, V.P."The cancer risk attributable to radiation exposure" , Health phys. 40(1981)108-111
77. Steven A. Belinsky : <http://carcin.oxfordjournals.org> "Plutonium targets the p16 gene for inactivation by promoter hypermethylation in human lung" Carcinogenesis, Vol. 25, No. 6, 1063-1067, June 2004
78. Chris Busby; www.llrc.org/2ndevent/2ndeventframes.htm" The second events theory" 2001




79. www.epa.gov/US Environmental Protection Agency
80. www.physik.uni-oldenburg.de/Docs/puma/radio/Uran_Munition.html
81. www.doctorswithoutborders.org/link.cfm
82. www.deploymentlink.osd.mil/du_library/pdfs/unep_du_kosovo_1999.pdf
83. www.environmental-expert.com/ Melissa A McDiarmid et al/Biological monitoring and surveillance results of gulf warI veterans exposed to depleted uranium 2005
84. www.ippnw.org/DUStatement.html
85. www.nrc.gov/“ Uranium enrichment”;U.S. Nuclear Regulatory Commission
86. www.answers.com/topic/uranium-enrichment
87. Bushberg Jerrold T; et al “The essential physics of medical imaging”; Williams & Wilkins, Baltimore 2001.
88. <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html>
89. Grundmann E., “Spezielle Pathologie” , Urban & Schwarzenberg 1986
90. <http://en.wikipedia.org/wiki/Cancer>
91. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Worldwide_nuclear_testing.png
92. U.Oeh, H. Paretzke „Untersuchungen zur Gesundheitsgefährdung durch Munition mit abgereichertem Uran“ : Institut für Strahlenschutz; GSF-Bericht 03/05
93. Robert W.Nelson „Low yield Earth penetrating nuclear weapons „
<http://www.fas.org/faspir/2001/v54n1/weapons.htm>
94. Veith, “Strahlenschutzverordnung 2001”; Bundesanzeiger Verlag
95. Haken,W.: Atom- und Quantenphysik, Springer Verlag 1990
96. Mayer-Kuckuk,T.:Kernphysik, Teubner Stuttgart1992
97. DIN 6814: Begriffe und Benennungen in der radiologischen Technik 1985
98. Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin 2001
99. Jaeger,R.G. Hubner,H.: Dosimetrie und Strahlenschutz
100. Faiz:M.Khan,: The physics of Radiation Therapy, Lippincott Williams&Wilkins 2003
101. Selman,J.: The basic physics of Radiation Therapy, C.C. Thomas 3rd edition 1990
102. Attix,F.H.:Introduction to radiological physics and radiation dosimetry,Wiley interscience 1986
103. Mark Oldham, Radiation physics and application in therapeutic medicine, 2001 IOP publishing Ltd; p 460-470
104. Bushberg et al;”The essential physics of medical imaging; 2nd ed.819; Lippincott Williams & Wilkins; 2.00 edition (December 15, 2001)
105. G.F.Knoll;Radiation detection and measurement”, Wiley; 3 Sub edition (January 5, 2000)
106. W.Huda,:”Review of radiological physics”, Lippincott Williams & Wilkins; 1.00 edition (January 13, 2003)
107. Kenneth S.Krane,”Introductory nuclear physics”; Wiley & Sons; Auflage: 1 (November 1987)



د ډاکټر غازي محمد سلطاني ژوندليک

نوم	د طب ډاکټر غازي محمد د ډاکټر نظر محمد زو
کورنی نوم	سلطاني
د زېږېدلو نېټه	۱۹۶۳/۸/۱۰
د زېږېدلو ځای	خدران د پکتيا ولايت
په خټه	پښتون
د زده کړې لړ ليک	
۱۹۷۰ - ۱۹۷۶ م کال: د کابل ښار بې مېروپه ښوونځۍ کې لومړنۍ زده کړې	
۱۹۷۶ - ۱۹۸۱ م کال: د کابل ښار داماني په ليسه کې زده کړې	
۱۹۸۲ - ۱۹۹۰ م کال: د المان روستوک په ښار کې د طب لوړې زده کړې	
۱۹۹۰ - ۱۹۹۴ م کال: د المان مالبنين ښار روغتون د داخله طب په څانگه کې د مرستيال په توگه په کار بوخت وه	
۱۹۹۴ - ۱۹۹۹ م کال: د المان فرانکفورت (اودر) په ښار کې د راديو لوژي په څانگه کې تخصص تر لاسه کړ	
۱۹۹۹ م کال څخه را په دې خوا د المان فرانکفورت (اودر) ښار روغتون او د راديو لوژي په څانگه کې د متخصص په توگه دنده تر سره کوي	



Answers دپوښتنو ځوابونه

لومړۍ څپرکۍ

- ۱-۱ په نوموړي سيستم کې کتله په کيلوگرام kilogram ، وخت په ثانيه second او اوږدوالی په متر meter سره بنودل کيږي.
- ۲-۱ دراديو اکتیويټي پخوانۍ واحد کيوري او نړيوال واحد يې بيکاريل نومېږي.
- ۳-۱ يو رونتگن په هوا کې لږڅه صفر عشاريه نهه سانتي گري 0,9 cGy انرژي دوز منځ ته راولي
- ۴-۱ يوگرام کتله د لږ څه لس په طاقت د څوارلس ژول کيمياوي انرژي اويا شل کيلو ټن 20 kiloton TNT هستوي انرژي سره برابر قيمت لري
- ۵-۱ په فضا کې دنور سرعت په يوه ثانيه کې لږڅه درې سوه زره کيلومتره دی 300 000 km/s


دويم څپرکۍ

- ۱-۲ په يوه سانتي متر مکعب تومور نسجونو کې لږڅه لس په طاقت دنه 10⁹ cells يانې يومليارد حجري اټکل کيږي.
- ۲-۲ تريسيوم يا تريټون، دويټرون او پروتون
- ۳-۲ ايزوټوپ هغو عناصرو ته ويل کيږي چې د پروټونو شمير يې سره يو برابر خو د نيوترونو شمير يې د يوه بل څخه توپير ولري
- ۴-۲ په يوه مول کې لږڅه لس په طاقت ددرويشټ اتومونه اويا $N_L = 6,022 \times 10^{23}$ particle /Mol
- ۵-۲ داتومي کتلې واحد د خنثی کاربون اټوم کتلې (¹²C₆) يو په دوولسمې برخې سره مساوي دی
- ۶-۲ داتومي کتلې واحد مساوي دی له:

$$u = 1,66 \times 10^{-24} \text{ g} = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg} = 931 \text{ Mev}/c^2 = 1,5 \times 10^{-10} \text{ J}/c^2$$

درېم څپرکۍ

- ۱-۳ داتوم کلمه يو يوناني ويی (لغت) دی اوپه کيمياوي کړنلارو سره نه ويښونکي مانا لري. اټوم د يوه کيمياوي عنصر تر ټولو کوچنۍ عنصر تشکيلوي چې که تر دې نورو ویشل شي نو ديوه عنصر ټاکلي کيمياوي خواص د لاسه ورکوي. د اټوم په مرکز کې يوه هسته ده چې دپروټونو او نيوترونو څخه جوړه ده
- ۲-۳ يو اټوم چې د کتلې شميره او داتوم شميره په واسطه بشپړ ټاکل شوی وي
- ۳-۳ ديوه اټوم په ايزوټوکې د نيوترونو شمير سره يوشان نه وي او داتوم په ايونوکې دالکترونو شمير سره يوشان نه وي




- ۳-۴ اکسریز داتوم په مدارونو او دگاموړانگې د هستې په مدارونو کې منځ ته راځي. د بلې خوا دهغوی دانرژي شپېکترم سره یوشان نه دی
- ۳-۵ دپرتونو شمیر ه یې سره توپیر لري
- ۳-۶ ایزوتوپ هغو عنصرانو ته ویل کیږي چې په هسته کې دهغوی د پرتونو شمیر سره یوشان خو د نیوترونو شمیر یې د یوه بل څخه توپیر ولري
- ۳-۷ ایونایزیشن یوه داسې فزیکي کړنلاره ده چې یوڅنډی اتم او یا مالیکول یو یا ډیر الکترونونه د لاسه ورکړي او یا یې ځان ته راوینسي.

څلورم څپرکی

- ۴-۱ کله چې د یوه اتم په هسته کې دنیوترونو شمیر او دپرتونو شمیر تناسب د یوه بل څخه دپرتوپیر ولري نو په پایله کې هستې څخه د فوټون وړانگې او د بڅرکو وړانگې خپریږي. نوموړې کړنلارې ته رادیواکتیویټي وايي.
- ۴-۲ درادیواکتیویټي واحد بیکاریل دی او یوه تجزیه په یوه ثا نیه کې ده
- ۴-۳ دورانگه پوله ، فزیکي نیمایي وخت ، دورانگو انرژي ، بیالوژیکي نیمایي وخت او اغیزمن نیمایي وخت پورې اړه لري
- ۴-۴ څلور نیم ملیارده کاله
- ۴-۵ دکتلي نمبر یې دوه سوه دیرش اواتومي نمبر یې نوي دي ځکه پلارنی عنصر دالفا وړانگه خپروي
- ۴-۶ دنیمایي عمر شمیر HVL دلاندني فرمول په مرسته تر لاسه کولای شو ($N=N_0/2^{HVL}$) اومساي دي له الف: یونیمایي وخت 1HVL، درې عشریه درې نیمایي وختونه 3,3 HVL او شپږ عشریه شپږ نیمایي 6,6HVL وخت
- ۴-۷ الف: څرنګه چې د کوبا لټ سرچینې نیمایي وخت پینځه عشریه درې کاله دی 5,3 years اودهغه وخت نه تر اوسه پورې لږڅه دوه دیرش کاله تیر شوي دي اونوموړې موده د شپږونیمایي عمر 6HVL سره مساوي ده نو دیونیمایي وخت څخه ۵۰٪ ددوه نیمایي وخت نه ۲۵٪ درې نیمایي وخت نه یو په اتمه برخه دڅلور نیمایي وخت نه یو په شپاړسمه برخه دپینځه نیمایي وخت نه یو په دوه دیرشمه برخه اود شپږ نیمایي وخت نه یو په څلور شپیتمه برخه کمښت مومي.
- ۴-۷ ب: دکوبالټ سرچینې وزن یو ګرام نه دی داځکه چې نوموړی عنصر په نیکل تجزیه کیږي. ددوه دیرش کالونو څخه وروسته دکوبا لټ یو ګرام څخه یوازې لږڅه پینځه لس ملي ګرام پاتې کیږي اوپاتې یې یا نې نهه سوه پینځه اتیا ملي ګرامه په نیکل (Ni) اوږی
- ۴-۸ وروسته له شپږونیمایي وخت څخه د ترکار یواکتیویټي صفر ته رالویږي او دخوراک وړ دي.

پینځم څپرکی

- ۵-۱ په دوه ډوله ویشل شوي دي چې د سم سیخ اونه سم سیخ ایونایز کونکو وړانگو په نامه سره یادېږي. نوموړي وړانگې په ماده کې اتمونه ایونایز کوي او په تحریک یې راولي.
- ۵-۲ په فضا کې دانرژي انتقال ته وايي
- ۵-۳ هستوي وړانگې هغو وړانگو ته ویل کیږي چې د اتم یوې هستې څخه خپریږي اود الفا ، بیتا اوګاما وړانگو په نامه سره یادېږي.
- ۵-۴ لږڅه شپږ زره ایونونه په یوه سانتي متر هوا کې تولیدوي
- ۵-۵ دهستي څخه دوه پرتونه اوده نوپرتونونه راوځي چې دهیلیم اتم هسته ده . دکتلي نمبر (A-4) یې دڅلورو په واحد او داتوم نمبر یې ددوپه واحد (Z-2) را ښکته کیږي



۶-۵ ایونایزکونکې وړانگې د اټوم هستې بریښنايز چارج اود اټوم په مدارونو کې بریښنايز چارج تعادل دمنځه وړي په دې مانا چې یو الکترون د اټوم څخه راوبا سي او یا دا چې ورباندې زیاتوي يي. ۷-۵ دغه ډول هستوي کرنلاره دالفا تجزيې په نوم یادیږي اود تجزيې په پایله کې دالفا یوه ذره اودرادون غاز پیدا کیږي. په نوکلید چارټ کې درادون هسته د بلار مور هستې په پرتله دوه واحده کیني خواته اودوه واحده بنکته خواته ځای نیسي داځکه چې دنوموړیدغاز دوه نیوترونه اودوه پروتونه درادیم په پرتله لږ دي.

شپږم څپرکی

۱-۶ دفوتواغیزه اود جوړې ذرو پیدایښت اغیزه کې دورانگوتوله انرژي په ماده کې جذب کیږي او دکمپټون په اغیزه کې دانرژي انتقال تر سره کیږي. ۲-۶ دورانگو لومړني شدت I_0 لسمه برخه ور څخه تیر یږي اونوي په سل کې په ماده کې جذب کیږي. ۳-۶ داوبولپاره د لسم ارزښت پنډوالی پینځوس سانتي متره، دپخوڅښتو لپاره دوه دیرش سانتي اود کانکریت لپاره یوویشت سانتي متره قیمت لري. ۴-۶ د مادي په پنډوالي، کثافت، اټوم نمبر او دورانگو په انرژي پورې اړه لري. ۵-۶ داځکه چې په یوه ماده کې دفوتواغیزه د اټوم نمبر سره په طاقت د څلور متناسب ده


اووم څپرکی

۱-۷ دایون ډوز په نامه سره یادیږي اوواحد یې کولومب پر یوکیلوگرام دی ۲-۷ کله چې دورانگو یوژول انرژي په یوه کیلوگرام ماده کې جذب شي نویو گړې ورته ویل کیږي ۳-۷ څرنګه چې دالفا او بیتا وړانگې په هوا کې جذب کیږي نودکارگرتول بدن ته یوازي دکاماورانگې رسیري چې قیمت یې یوملي سیورت دی. ۴-۷ هو، دواړوته دمعادل ډوزکچه یوشان ده. داځکه چې ډوز مساوي ده له انرژي تقسیم په کتله ۵-۷ لس ژول تقسیم په سل کیلوگرام مساوي ده له سل ملي گري (0,1 Gy) ۶-۷ دالفا وړانگومعادل ډوزدوه سوه ملي سیورت اودبیتا وړانگومعادل ډوز لس ملي سیورت دی. داپه دې مانا چې ددواړوډول وړانگومعادل ډوزسره یوشان نه دی.

اتم څپرکی

۱-۸ دورانگوسم سیخ ایونایز کونکې اغیزه هغه غبرګون ته وایي چې د یوه بیومالیکول سره سم سیخ د ایونایزیشن او تحریک کولوپه پایله کې تر سره کیږي. دورانگونه سم سیخ اغیزه هغه غبرګون ته وایي چې یوه بیومالیکول ته د کیمیاوي تعامل په کرنلاره سره زیان ورسیري. دا په دې مانا چې دورانگودانرژي جذب کیدل اودورانگوبیالوژیکي اغیزه په توپیر لرونکومالیکولو کې تر سره کیږي. د بیلګې په ډول لکه د وړانگو په واسطه داوبوتجزیه یا نې رادیو لایز

۲-۸ رادیکال بریښنا یز خنثی چارج لري خودانرژي په تراو راپارول شوي اټومونه دي چې دورانگود نه سم سیخ اغیزوپه پایله کې منځ ته راځي. رادیکال په باندني مدار کې یو طاق سپا بین الکترون (Spin elctron) لري او له دې کبله کیمیاوي ډیر فعال خاصیت ښيي او دحجرو لپاره سخت زهر تشکیلوي.



۸-۳ په DNA کې د بازونیمګرتیا، د بازو بایلل، دیوه تار پرې کیدل، د غبرګو تارونو پرې کیدل او د موتیشن نور هر اړخیز ډولونه

۸-۴ په DNA کې د غبرګو تارونو پرې کیدل د وړانګوانرژي ډوز سره سم سیخ او دیوه تار پرې کیدل د وړانګوانرژي ډوز سره په مربع تړاو لري.

۸-۵ حجره (ژونکه) ځان وژنه کوي او یا د اچې د سرطان په حجره (ژونکه) اوري.

۸-۶ د مالیکولویونایزیشن، د آزادو رادیکالو لکه OH^- او H^+ منځ ته راتلل، د بیومالیکولونو کیمیاوي تجزیه بیا لویځي بدلون لکه په دې این ای DNA کې موتیشن او په پایله کې کلینیکي ناوړه اغیزې

۸-۷ په دې این ای کې بدلون، د کروموزوموناسمي، د حجرې ویش په تپه درول، په حجره (ژونکه) کې دمیتابا لیزم بدلون، د حجرې په میمبران کې بدلون او د حجرې مرګ تر سره کول

۸-۸ یونایزیشن، د آزادو کیمیاوي رادیکالو منځ ته راتلل، د دې این ای DNA زیانمن کیدل، په کروموزومو کې ناسمي، موتیشن او په اخیر کې یا داچې حجره (ژونکه) ځان وژنه کوي او یا داچې په یوه سرطاني حجره (ژونکه) اوري

۸-۹ **لومړۍ ستو خاستیک اغیزې:** د وړانګویو ټاکلې لیمیت (حد) نه لري دا په دې مانا چې په هره کچه وړانګې کولای شي چې د سرطان ناروغۍ منځ ته راولي. د پېښیدلو احتمال یې د وړانګو ډوز سره سم سیخ تر اولري، په کروموزومو کې موتیشن منځ ته راولي او په کالونه وروسته د سرطان ناروغۍ رابرسیره کيږي.

دویم: نه ستو خاستیک اغیزې: نوموړې پېښه هغه وخت پېښیږي چې د وړانګو ډوز د یوه ټاکلې لیمیت څخه واورې، ناوړه اغزه یې په زیاته کچه په یوه غړي کې منځ ته راځي او په دې این ای کې ډیر لږ لیدل کيږي، د زیان کچه یې د وړانګو ډوز سره سم سیخ پورته ځي. په پایله کې د وړانګو ناروغي منځ ته راځي (Radiation sickness)

نهم څپرکی

۹-۱ طبیعي یورانیم دیورانیم دوه سوه اته دیرش، یورانیم دوه سوه پینځه دیرش او یورانیم دوه سوه څلور دیرش څخه جوړ دی.

۹-۲ په غریب شوی یورانیم کې د چاودیدونکي یورانیم دوه سوه پینځه دیرش برخه نیمایي ته رالویږي او له دې کبله ورته غریب شوی یورانیم ویل کيږي


۹-۳ هستوي بټۍ یوه داسې دستگاه ده چې هلته هستوي انرژي په حرارتي انرژي بدلیږي. دبیلګي په ډول دیورانیم دوه سوه پینځه دیرش ایزوټوپ په چاودنه کې انرژي ازاده کيږي او بیا په حرارتي انرژي بدلیږي

۹-۴ د د سنتریفوګ کرنلاره، د ډیفوزیون یا د نفوذ کرنلاره او د لیزر کرنلاره

۹-۵ دیورانیم دوه سوه پینځه دیرش کچه په طبیعي یورانیم کې لږترلږه نوي په سل کې بډای شي

لسم څپرکی

۱۰-۱ د طبیعي یورانیم هغو وروسته پاتې فاضله موادو ته ویل کيږي کوم چې د چاودیدونکي یورانیم دوه سوه پینځه دیرش U-235 د بډای کولو په کرنلاره کې خوشي پاتې کيږي. د غریب شوي یورانیم رادیو اکتیویټي د طبیعي یورانیم په پرتله لږ څه شپېته په سلو کې ټیټه ده.



۲-۱۰ دېبلگه په ډول د هډوکو خورېدل، د غړو کمزورتيا، تبه لرل، عصبي تکليف، دسترگو ديد کمښت، سرخوړېدل، دحافظي کمښت، ژورخفگان (Depression) او داسي نور.

۳-۱۰ د غريب شوي يورانيم فزيکي نيمايي عمر څلورنيم مليارده کاله او بيا لوژيکي نيمايي عمري تر شپاړسو کالونو اټکل کيږي.

۴-۱۰ د غريب شوي يورانيم پوځي استعمال او هم ملکي يانې غير نظامي استعمال وښيي؟

۴-۱۰ د غريب شوي يورانيم پوځي استعمال لکه: دټانکونو په جوړولو کې، دسرگولويو اودتوغنديو په جوړښت کې. ملکي استعمال لکه: په الوتکو کې، په طبابت کې دراديو اکتیوسرچيني د وړانگو مخ نيوي په موخه اونور.

۵-۱۰ په چاپيريال کې د غريب شوي يورانيم کوچنی ذرې دکومو لارو څخه بدن ته ننوتلای شي؟

۵-۱۰ دتنفس له لارې، دخوراک څښاک له لارې او د بدن پوستکي له لارې

۶-۱۰ په طبيعي يورانيم کې دچاډيدونکي يورانيم دوه سوه پينځه ديرش کچه لږڅه دوه ځله لوړه ده.

۷-۱۰ د غريب شوي يورانيم څخه دالفا وړانگې خپريږي او انرژي يې لږڅه څلورميگا ترون ولټ ده.

يوولسم څپرکی

۱-۱۱ ب: نيمايي رڼا شوې حجرې مړې کوي

۲-۱۱ دحجرې ميتوزيا نې ويشنې پر او G2 پر او

۳-۱۱ سپرما تيد حجرې (جنسي غدې Gonads)

۴-۱۱ الف: ستو خاستيک يا نې تصادفي پيښه ده اوددي احتمال شته دي چې ديوزر رڼا شووکسانو څخه د پينځو کسانو په ماغزو کې د سرطان ناروغي راپارول شي (0,5% per Gy)

۵-۱۱ الف: شپږ سيورت

۶-۱۱ الف: يو ملي سيورت

۷-۱۱ دلږڅه دوه زرو بازو Base په جوړښت کې بدلون راځي، د دي اين اي DNA لږڅه يو زرځانگري تارونه او پينځوس دواړه غبرگ تارونه پرې کيږي.

۸-۱۱ د بدن په غړو کې دسرطان ناروغي راپارول، د عمر لنډيز، اوجېنېټيک ناوړه اغيزې

۹-۱۱ ټولې هغه ناروغي چې دورانگود اغيزوسره سم سيخ د بدن په يوه غړي کې پيل کيږي (Radiationsyndrom) لکه نس ناسته، قی کول، د سپينو کروياتو کمښت، دسترگو ليد کمښت، د اوبښتانو تويدل، د پوستکي سوروالی، اونور

۱۰-۱۱ دسکېليټ کوچنيوالي، يو په سل دذکاوت تناسب کمښت Intelligence quotient = IQ

هايډروسېفالوس Hydrocephalus


دسرکوچنيوالي Microcephaly

کوچني سترگي Microphthalmus دسترگو نشتوالی Anophthalmus

دوولسم څپرکی

۱-۱۲ د عام ولس سلو څخه به پنځوس په سل کې 50% رڼا شوي کسان دديرشو ورځو 30 days په موده کې مړه شي.

۲-۱۲ په ۱۹۰۴ م کال د يوه نامتو امريکايي انجينر اديسن يو مرستيال د سرطان په ناروغي مړ شو. نوموړي ته درونتگن د ستگاه د پلورلو په کړنلاره کې ډاکسريز وړانگې رسيدلي وې.



۱۲-۳ هغه ناروغی چې دورانگو سره تر اولري لکه استفراق (لوسټل)، نس ناسته ، دويني په جوړښت کي بدلون، دپوستکي سوروالی، خواگرزی او نور

۱۲-۴ لومفو سیت (Lymphocytes) سمدلاسه دپینځو زروڅخه تر یو زر پورې کمښت مومي

۱۲-۵ کله چې ټول بدن ته په یوه وار دشیپرسیورت څخه پورته وړانگې ورسیري نو دمرگ سبب (لامل) گرځي؟

دیا رلسم څپرکی

۱۳-۱ دورانگو سرچیني څخه په لیري واټن دریدل ، دتم کیدو وخت لنډول، دیوه شي تر څټ ځان خوندي کول اود رادیو اکتیو موادوڅخه د ځان ککړتیا مخ نیونه

۱۳-۲ یو ملي سیورت 1 mSv

۱۳-۳ څلور نیمایي پنډوالی

۱۳-۴ ب: یو ملي سیورت

۱۳-۵ دالارا پرنسیپ **ALARA** په گوته کوي چې د هر اړخیزو کړنلارو په مرسته سره تر خپله وسه پورې هڅه و شي چې په ورځني ژوند کي دورانگو نه دگټي اخیستلو په موخه دورانگو اندازه دومره ټیټه وساتل شي څومره چې دیوې خوا ورته اړتیا لیدل کیږي او دبلې خوا امکان ولري

۱۳-۶ هغه مرغی چې په یوه متر کي ناسته ده اته اتیا نانوسیورت 88 nano Sv او په نیم متر کي دری سوه دوه پینځوس نانوسیورت 352 nano Sv وړانگي ورته رسیږي.

څوارلسم څپرکی


۱۴-۱ طبیعي وړانگي هغه وړانگي دي چې د طبیعي سرچینو څخه خپریږي. د بیلگي په ډول لکه دالفا، بیتا او گاما هستوي وړانگي ، هستوي ذري لکه پروتونه ، نیوترونه الکترونونه او میونونه او نور. نوموړي وړانگي دځمکي لاندې رادیواکتیو ډبرو او همدارنگه د فضا څخه دځمکي مخ خواته راځي. دطبیعي وړانگو په څنګ کي په مصنوعي ډول هم وړانگي تر لاسه کیدای شي.

د مصنوعي وړانگو سرچیني لکه هستوي ازمویني ، هستوي بټی او په طبابت کي درادیواکتیو ایزوتوپوکارول او نورو تلي بیلگي دي

۱۴-۲ طبیعي وړانگو کچه دځمکي په هرځای کي توپیر لري خو منځنی قیمت یي لږ څه دوه نیم ملي سیورت او یوه کال کي اټکل شوی دی.

۱۴-۳ دځمکي لاندې څخه د یورانیم دتجزیې په سلسله کي د رادون رادیواکتیو غاز منځ ته راځي چې بیا دځمکي مخ ته او هم دکورونوپه تګلویوکي راټولیدي. د بیلگي په ډول په امریکا کي لږڅه دیرش زره کسان په یوه کال کي دنوموړي غازدالفا وړانگوله کبله د سږي سرطان په ناروغی مړه کیږي. ۱۴-۴ دطبیعي وړانگولپاره دسرطان ناروغی د خطر ضریب صفر عشا ریه صفر صفر پینځه په سل اویو ملي سیورت اټکل کیږي (0,005% per mSv). دا په دې مانا چې که سل زره وگړي په یو ملي سیورت وړانگو رنځي نودهغوی څخه به پینځه تنه دسرطان په ناروغی اخته شي.

۱۴-۵ نوموړي تیوري په ډاګه کوي چې دانرژي ډوز اود هغی د ناوړه اغیزو ترمنځ سم سیخ اړیکي شته دي. دبیلگي په ډول که چیرته سل ملي سیورت ایکس ناروغی x منځ ته راولي نو پینځوس ملي سیورت نیمایي ناروغی x/2 منځ ته راولي.



پينځلسم څپرکی

۱-۱۵- ددوه سوه اويا زرو څخه تر درې سوه زره وگړو پورې اټکل کيږي

۲-۱۵- ماليکونوم يو خطر لرونکی پړسوب دی او سرطان هم يو خطرناک پړسوب دی چې د اېپېټېل نسجونو (Epithelial tissue) نسجونو څخه پيل کيږي

۳-۱۵- کله چې د سرطان ناروغي د درمل کړنلارې څخه يو څه موده وروسته بېرته راوگرزي نو د ريسيدو کلمه ورته کارول کيږي او کله چې د سرطان نسجونه د درمل کړنلارې په پايله کې کمښت ومومي يانې د سرطان ناروغي په څټ وگرزي او يا داچې د ناروغ دردونه د پخوا په پرتله لږ شي نو د ريميزيون کلمه ورته کارول کيږي. نوموړی کميت په سليزه سره ښودل کيږي.

۴-۱۵- اپيډيميولوژي دپوهنې يوه څانگه ده چې په يوه ټولنه کې دهر اړخيزونا روغيو دوښتوب ، دنا روغيو تکثريا ډيرښت او په خلکو باندې ددغو ناروغيو کلينيکي، فزيکي روحي او کيمياوي ټاکونکي وروستۍ اغيزې تر څيړنې لاندې نيس

۵-۱۵- نوموړې تيوري په ډاگه کوي چې دورانگو دخطر احتمال که په ټيټه اوکه په لوړه کچه وي شته دی او له دې کبله يوه ځانگړې هستوي ذره هم دسرطان ناروغي را پارولی شي

شپاړلسم څپرکی

۱-۱۶- هغه موتیشن چې په کروموزومو کې منځ ته راغلي وی ډير کاله وروسته هم ثبوت کولای شو او دورانگو انرژي کچه يې اټکل کولای شو. د بيلگي په ډول که دوه کروموزومونه يوه اوبل ته ځيني جينونو برخي انتقال کړي دا په دې مانا چې ديوه کروموزوم يوه برخه په بل يوه کروموزوم وښلي او برعکس نو دغه ډول موتیشن د Translocation ويل کيږي. د کروموزوم هغه برخه چې دجينو راکړه ورکړه پکې تر سره شوې ده په توپير سره رنگ اخلي او له دې کبله پيژندل کيدای شي.


۲-۱۶- د يو مليون يوه برخه يا 1 parts per million

۳-۱۶- يوه فزيکي کړنلاره ده چې دگاما وړانگو انرژي او اکتیويټي اندازه کولای شي او له دې کبله هريوراديو ايزوتوپ په ځانگړي ډول سره پيژندل کيدای شي
۴-۱۶- د انډکټيو کپلډ پلازما کتلې شپېکټرومټر په يوه مرکب کې دراديو اکتیو اونه راديو اکتیو ايزوتوپ په پيژندلو کې تر ټولو وتلی، دباور وړ، حساسه او دقيقه فزيکي کړنلاره ده
۵-۱۶- په وړانگو رڼا شوې وينه کې د مکروسکوپ په مرسته سره په هريوه لمفوخيټ (Lymphocyte) کې ددوه پلازمينو کروموزومو شميرگڼل کيږي.

اوولسم څپرکی

۱-۱۷- ځکه چې کارکونکو دنوموړې بټۍ په څلورم بلاک کې ډير ناسم تخنيکي چلن کړي وه .
۲-۱۷- د بيلگي په ډول په غرنيو حيواناتو کې داکټیويټي کچه شل زربیکاريل يه يوه کيلوگرام غوښه کې د شلو کالو وروسته اندازه شوې ده.

۳-۱۷- نوموړي غاز ثبوت کوي چې په گاوندۍ چاپير يال کې يوه هستوي بټۍ ناسم کارکوي او يا چاودلې ده.



۴-۱۷ دگاما شپيکتر و متري په نامه سره يادېږي او د يوه نيم هادي ديدېکتور، يوه زيگنال ستروونکی، يوه انا لوگ زيگنال په ديگيټال زيگنال اړونکی، يوه ډير چينل تحليلونکی او يوه کمپيوټري سيستم څخه جوړ دی.

اتلسم څپرکی

۱-۱۸ لومړۍ عمليات، دويم دور انگو درملنه او دريم کيمياوي درملنه

۲-۱۸ يو ناوړه پرسوب بې کنټروله غټيږي، په گا ونډيو نسجونو او غړو کې ننوځي او دمنځه يې وړي. نوموړی پرسوب کولای شي چې په لمفايد غدو کې او همدارنگه د وينې جريان له لارې د بدن په نورو غړو کې ميتاستازي metastases منځ ته راولي. يو ښه ډوله پرسوب د سرطان حجرې نه لري او بې کنټروله هم نه غټيږي. همدارنگه د بدن نورو برخو ته هم ميتاستاز نه کوي

۳-۱۸ دريسيدو Rezidive په نامه سره يادېږي


۴-۱۸ د ټپي ټکي د پرسوب غټوالی، د اړين ټکي د لمفاد غدو غټوالی او په ناروغۍ اخته کيدنه او دايم ټکي دا په ډاگه کوی چې گڼه يوه ناروغي خو به د بدن نورو برخو ته نه وي غزېدلې.

۵-۱۸ ايونايژکونکي وړانگي کولای شي چې د سرطان ناروغي منځ ته راولي او د خطر ضريب يې پينځه په سل په سيورت 5%/ Sv دی. داپه دې مانا چې که يومليون وگړي په ټول بدن او په 0,01Sv رڼا شي نوبه د سرطان پينځه سوه زياتی ناروغۍ منځ ته راشي. نوموړی قيمت د هغه سرطان څخه چې په طبيعي ډول منځ ته راځي لږ څه لسمه برخه تشکيلوي.

۶-۱۸ ددې کتاب ۳۴۲ مخ وگورۍ


۷-۱۸ تومور مارکر هغه پروټين او بيالوژيکي موادو ته وايي چې د يوه ټاکلي تومور څخه پخپله جوړېږي

۸-۱۸ ځينو ستاتيکا Zytostatika يو ډول کيميا وي مواد دي چې د سرطان حجرو د ویشلو کړنلاره په ټپه دروي او له دې کبله دهغوی د ډير ښت مخه نيسي




ويپانگه (Glossary)


English انگليسي	Pashto پښتو
A	
Atom	اتوم يا ذره : اتوم د يوناني اتوموس (Atomos) کلمې څخه اخيستل شوی دی او مانا يې ده (نه ویشونکئ). اتوم د هرکيمياوي عنصر تر ټولو کوچنی برخه ده چې په کيمياوي کرنا لرونور د ویشلو وړ نه دی، ځکه چې خپل کيمياوي خواص د لاسه ورکوي. نن ورځ جوته شوي ده چې اتوم په فزيکي کرنا لرو سره په نورو کوچنيو بڼو ویشل کېدای شي چې شمير يې تر څو سوو پورې رسېږي. د اتوم هسته د پروتون او نيوترونو څخه جوړه ده چې دهغې په شاوخوا بېضوي بڼه مدارونو او ټاکلي واټن کې الکترونونه راڅرخېږي.
Atomic Energy	د اتومي انرژۍ چې د هستوي تعامل په پايله کې ازادېږي
Absorbed Dose	انرژي دوز: د ورانگو هغه اندازه انرژي ده چې د يوې مادې په کوچنی کتله کې جذب کېږي. واحد يې يو گري دی چې مساوي دی په يو ټول تقسيم په يو کيلو گرام
Absorbed dose rate	د انرژي دوز قدرت
Activity (Bq)	اکتيويتي : هغه عنصرونه چې بي له بهرنۍ اغيزې څخه يوه نا ځاپه په نورو نوو عنصرونو تجزيه کېږي او په څنک کې وړانگې خپروي. کله چې يوه هسته په يوه ثانيه کې تجزيه شي نو واحد يې بېکاريل دی.
Accelerator	يوه آله ده چې په يوه الکتروستاتيک اويا الکترومقناطيسي ساحه کې هستوي بڅرکي گرندې کوي او انرژي يې د پروي
Aerosol	غاز يا اېرو زول ، گرد




ALARA As low as reasonably achievable	آلار آ: دایونایز کونکو وړانگو څخه دځان ساتنې نړیوال کمیسیون یوه نامتو سپار بڼته په گوته کوي چې عام ولس ته دوس سره سم څومره چې امکان ولري دومره لږ وړانگې ورسپړي.
Alpha decay	دالفا تجزیه: دیوه اتوم هستې څخه دالفا یوه ذره یانې دهیلیم اتوم هسته خپریږي
Alpha particle	دالفا بڅرکی: دهیلیم اتوم هسته ده چې ددوه نیوترونواودوه پروتونوڅخه جوړه ده اودیوه درانده رادیواکتیو عنصر لکه یورانیم دوه سوه اته دیرش اویا پلوتونیم دوه سوه نهه دیرش څخه خپریږي
Alpha irradiation	دالفا په وړانگوسره رڼا کول
Alpha ray	الفا وړانگه: دهیلیم اتوم هسته ده چې د دوو پروتونو اودوو نیوترونو څخه جوړه ده
Annual Limit of Ingestion=ALI	دخوراک له لارې کلنۍ لوړ لېمېټ
Annual Limits of Inspiration=ALI	دتنفس له لارې کلنۍ لوړ لېمېټ
Anode	انود: دیوې بریښنايز سرکټ یا آلي مثبت قطب الکتروود ده چې الکترونونه ورباندې لکيږي
Anoxic Necrotic Cell	اکسیجن نه لروونکي پیاوړلرونکي حجرې
Apoptosis	دیوې حجرې د ځان وژنې پروگرام شوي کرنلاره ده چې د سرطان ناروغۍ په پرمختیا اوپارولوکی اړین رول لوبوي
Appendices	ملونه
Archaeology	لرغون پوهنه
Aristoteles	یونانی فیلسوف اود لوي اسکندر ښوونکی چې لږ څه څلورسوه کاله دمیلاد نه دمخه یې ژوند کولو
Asbestos	اسبېست: یومینرال دی چې داور او اسید په مقابل کې دیر مقاومت ښيي او نه سو ځي
Atomic Mass Unit = amu = 1u	داتوم کتلې واحد: دکتلې ترتولوکوچنۍ واحد دی چې داتوم او مالیکول کتله ورباندې ښودل کیږي. نوموړی واحد دکاربون اتوم C^{12} دکتلې دولسمه برخه تشکیلوي. $1\text{ u} \approx 1.66053886 \times 10^{-27}\text{ kg} \approx 931.49\text{ MeV}/c^2$
Atomic Weight	اتومي وزن: نوموړي کمیت ته اتومي کتله هم وايي. دعنصرواتومي وزن دټاکلولپاره دکاربن عنصرچې شپږپروتونه اوشپږ نیوترونه لري د یوه ستاندارد یانې معیاري واحد په توګه ټاکل شوی دی. نور ټول عنصرونه چې دکاربن عنصر څخه درانده او یا سپک دی ورسره په تله کیږي. دېبلګه په ډول




	دکاربن اتومي وزن د هايډروجن اټوم په پرتله لږ څه دوولس واره زيات دی.
Atom diameter	داتوم قطر: يو انگستروم Å يا ديوه متر لس په طاقت دمنفي لس دی. $0,0000000001 = 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ Å}$
Attenuation coefficient	دکمزورتيا فکتور
Atto	لس په طاقت د منفي اتلس 10^{-18}
Average time = Ta	د يوه راډيواکتيو عنصر دتجزیې منځنۍ وخت
Avogadro constant	داووکادرو عدد(شميره) $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
B	
Background radiation	ټولې هغه ايو نايږ کونکې وړانگې دي چې دطبيعي سرچينو لکه فضا ، اتموسفير، دځمکې لاندې راډيو اکتیوموادو اومصنوعي سرچينوڅخه راوړي
Base ten	قاعدې د لسو $(\log 10^7 = 7)$
Basis	قاعده
Becquerel ($\text{Bq} = \text{s}^{-1}$)	بېکارل: د اکتیوبتي واحد دی اومساوي ده له يوه تجزيه په يوه ثانيه کې
Benign tumours	د نسجونو شه ډوله پړسوب او يا شه تومورچې دسرطان نا روغي ورڅخه نه پيداكيږي
Beta decay	بيتا تجزيه: د يوه راډيواکتيو اټوم هستې څخه الکترونونه اويا پوزيټرونونه خپريږي.
Beta rays	بيتا وړانگې گړندې الکترونه دي چې دراډيواکتيو اټوم هستې څخه راوځي. داتوم په هسته کې يو نيوترون په پروتون او الکترون باندې اوړي. دنوموړو وړانگو سرعت لږڅه دنور سرعت پورې ورنږدې کيږي.
Binding energy	دټرون انرژي: هغې انرژي ته ويل کيږي چې داتوم هستې څخه ديو پروتون او يا نيوترون دبيلولواو يا ازادولو لپاره په کارده.
Biological Dosimetry	بيا لورژيکي ډوزيمټري يوه کرنلاره ده چې دکروموزومو نا سمې دورانگوداغيزوپه اړوند ترخپرنۍ لاندې نيسي. د بيلگه په ډول دکروموزومودوه مرکزنه او يا کله چې د يو کروموزوم يوه برخه پرې شي اوپه يوه بل کروموزوم ونېلي(Translocation)
Biological half life = T_{bio}	بيالوژيکي نيمايي وخت: هغه وخت ته وايي چې په دې موده کې بدن ته دجذب شوي




	رادیواکتیو موادو څخه د فزیکي او بیالوژیکي پروسو په بنسټ نیمایي برخه د بدن څخه ووځي
Biological Therapy	بیالوژیکي تیرابي
Biopositive Model	دورانگوکتور هورمېزېس موډل
Bone marrow and stem Cell transplants	دهډوکومازغو او د سټم حجرو ترانسپلانت
Bonesarkome	د هډوکو سرطان
Breast cancer	دبڼڅو دتیو سرطان
Bremsstrahlung	دبریمز (بریک break) وړانګې کله چې یوالکترون د هستې په نږدې ساحه کې تیرېږي نو د کولمب قوې داغیزې او غبرګون په پایله کې د رونتګن یا اکس غیر کرکټریستیک یا بریمز وړانګې منځ ته راځي
Bunker Bomber	سمڅ یا سنگر بمونه
C	
C	دکاربن عنصر
c ($c = 3 \times 10^8$ m/s)	دنور سرعت: درې سوه زره کیلو متره په ثانیه کې
Cancer disease	دسرطان ناروغي: دنسجونوې بریده، بې بندیزه پړسوب او دحجم غټوالی چې ګاونډی نسجونه تر فشار لاندې راولی اود بدن نورې برخې ته غوړیږي
Cancer genes	دسرطان جینونه
Cancer Treatment	دسرطان ناروغۍ د درملنې یا د علاج تګ لارې
Capillary	د وینې یو ډیر کوچنی رګ (شریان)
Carcinogen	ټول هغه مواد یا اجنت agent چې دسرطان ناروغۍ فزیکوینسې اوراپارول په ولس کې پیروي
Carcinogenesis	
Carcinom (Krebs)	کارسینوم: (دسرطان ناروغي ډیپل پړاو). داسې اټکل کېږي چې دغه یوه یوناني کلمه وي داځکه چې پېنځه سوه کاله دمیلاد نه دمخه د یونان درمل پوه سوکراتیس ډیوستکي سرطان ناروغۍ لپاره په کار ولې ده. هغه نسجونه چې بې له کنټروله او په خپل سر غټیږي خودشاوخواګا ونډیونسجونو او غړوته لاهه وي غوړیدلي
Cataract	دسترګو دلیډ کمښت




Cathod Rays	دکتود وړانګې چې الکترونوڅخه جوړې دي
Cell	حجره(ژونګه): دژوند دټولو نه ورکوټی واحد دې چې ځان ساتونکی، ځان پايونکی او دځان په څیر کټ مت يوشان بله حجره جوړولای شي
Characteristic X- Ray)	ډاکسريز هغه وړانګې چې داتوم په قشرونوکې منځ ته راځي
Chemotherapy	کيمياوي تيرابي
Chromosomes	کروموزومونه (رنگوړو): دحجرې په هسته کې د دې اين اي DNA يوغت ماليکول تشکيلوي چې هلته دژوند ټول جنيتک مالومات خوندي شوي دي .
Clinical dosimetry	کلينيکي دوزيمټري
Computer tomography (CT)	کمپيوټر ټوموگرافي دناروغيو دتشخيص يوه کرنلاره ده چې درونتګن وړانګې څخه کار اخلي
Concentration	غلظت
Cosmic rays	کازمېکي وړانګې
Contamination	ککړتيا: په راديواکتيو موادود بدن ، چاپيريال اويا يوه شي ککړتيا
Coulomb force	د چارج شوو ذرو تر منځ دفع کونکي اويا ځکړونکي قوه
Curie	ميرمن کيوري يوه فرانسوي فزيک پوهه وه
Curie = Ci	ډاکټيوپټي پخوانی واحد کيوري نومېږي. يو کيوري د اوه ډيرش بيلياردۀ تجزيی په يوه ثانيه کې اويا مساوي ده 370000000000 Bq
D	
Decay Shema	د اټوم هستي تجزيي شېما
Dehydration	دبدن څخه داوبو بايلل (ضايع)
Deka	لس
Democrit	ديموکريت يو يوناني فيلسوف اود لويکيپوس شاګرد چې داتوم تيوري يې نوره هم پراخه کړه
Depleted uranium	غريب شوی يورانيم: د يورانيم ايزوټوپونويومرکب دی چې په هغه کې د يورانيم دوه سوه پينځه ايزوټوپ برخه دطبيعي يورانيم په پرتله لږڅه شپيته په سل کې را کمه شوي وي.
Depression	ژورخفګان
Desamination	ډامينوګروپ NH ₃ د لاسه ورکول
Determinesic effects	دورانګو ټاکونکي ناوړه اغيزي: هغه وخت منځ ته راځي چې د انرژي دوزقيمت ديوه ټاکلي ليميټ




	څخه واورې لکه دپوستکي سوروالی
Deoxyribonucleic acid (DNA)	ډي اوکسي ريبنوکلېک اسيد - ډي.اين.اي. يا ژونخور دحجرې په کروموزومو کې يو ډير مهم ماليکول دی چې دحجرې دژوند سرليک او جېنېټيک ټول مالومات پکې خوندي دی. نوموړی ماليکول دحجرې دنده او جوړښت کنټرول کوي.
Dezi	يوپه لسمه (1/10)
Dicentric Mutation	دوه پلازميني موتيشن
Dose risk factor	د ډوز خطر ضريب
Dose	په طبابت کې د دواگانو واحد دی او اندازه يې په يوه گولۍ ښودل کيږي. په فزيک کې هغه کچه انرژي ده چې په بدن او يا نورو اورگانو کې جذب شوې وي.
Double helix	ډي.اين.اي. تاوشوی غبرگ مزي
E	
Effective dose (1G ray= Gy)	اغيزمن ډوز: مجموعه د حاصل ضرب بدن هريوه غړي معادل ډوز او دهمغه غړي د وزن فکتور
Effective half life = T _{eff}	اغيزمن نيمايي وخت
Electromagnetic radiation	الکترو مقناطيسي وړانگې
Electron volt	الکترون ولټ: هغه انرژي ده چې د الکترون يوه ذره يې د يوولټ پوټنسيال توپير په تيريدلو سره تر لاسه کوي
Element	عنصر (ټوکی):
Elementary particles	بنسټيز بڅرکي
Embryo	نطفه يا زيږوړی: دمور په رحم کې هغه جنين دي چې وروسته يو ماشوم ورڅخه لويږي
Energy dose (1Gray=Gy)	انرژي ډوز يا انرژي اندازه
Epidemiology	اپيديميوالوژي: دطبي علومو هغه برخه ده چې په اولس کې دساري ناروغيو د خپریدلو او يا نه خپریدلو شميرنه او دهغوي دمخ نيولولارې، علتونه، خطرونه او په راتلونکي وخت کې ناوره اغيزې تر څيړنې لاندې نيسي
Epidemiological cancer register statistic	د سرطان اپيدېميوالوژي شميرنې پر ليکه کول
Epidermis	د پوستکي پاسنی پټ
Epithel tissue	اپيټېل نسجونه




Equivalent dose (1Sievert = Sv)	معادل دوز
Erythem	دورانگو دناوړه اغيزې په پايله کې د پوستکي سوروالي
Excited state	هيڅاني حالت
Excitation	داتوم تحريک کول: کله چې دفوتون وړانگې داتوم الکترونونه يوازې دومره انرژي انتقال کړي چې دنني مدار څخه باندنې لوړپوړي مدار ته وځيږي.
External Radiation	بهرنۍ وړانگې
F	
Fission	فيزيون: ديوه درانده عنصرچاوديدنه لکه ^{235}U په دوه سپکواولرڅه يوبرابر عنصرولکه څنگه چې په هستوي بټۍ کې تر سره کيږي. په دې ترڅ کې دواړه سپکې ذرې په لوړه کچه حرکي انرژي لري اودوه تر دريونيوترونونه او گاما وړانگې خپريږي
Force	قوه يا ځواک:
G	
Gamma rays	گاما وړانگې الکترومقناطيسي وړانگې دي چې داکسريزيا د روننگ وړانگوته ورته دي خوانرژي يې دنوموړو وړانگو په پرتله ډيره لوړه ده. کله چې د يوې راډيواکتيف هستې څخه دبېتا او الفا وړانگې راووي نو هغه نوی هسته سمدلاسه بنسټيزاوترتولوتيت انرژي ليدل نه غوره کوي بلکه د هيڅان په حالت کې پريوځي. ددې لپاره چې نوموړې هسته د اضافې انرژي څخه ځان خلاص کړي وي نو دگاما وړانگو په شکل يې خپروي.
Genes	دوراثت بيالوژيکي واحد چې په کروموزومو پراته دي.
Genetic cell	جنسي حجرې
Giga	يو ميليارډ
Glioblastom	د مازغو سرطان يودول ناروغي نوم دی
Gray (1Gy = 1Joule/1 Kilogramm)	گرې: يوژول انرژي تقسيم په يو کيلو گرام کتله
Ground state	ټيټ لېول يا بنسټيز ترټول لږ انرژي ليدل
H	
Half life = $T_{1/2}$	فيزيکي نيمايي وخت يا د عمر موده هغه وخت ته ويل کيږي چې په نوموړې موده کې د يوه ټاکلي راډيواکتيو عنصردهستو شميردلومړني وخت هستوشميرپه پرتله نيمايي ته راولويږي.
Half-value layer = HVL	د نيمايي ارزښت پنډوالی د يوې مادې هغه پنډوالی ته وايي چې دورانگو شدت د هغې




	دټيريدلو څخه وروسته د لومړني شدت په پرتله د جذب کولو انعکاس په پايله کې نيمایي ته را کم کړي.
Hekto	سل
Henri Becquerel	يو فرا نسوي فزيک پوه چې په ۱۸۹۶ م کال کې بې ديورانيم معدني ډبرې راديو اکتیویتی کشف کړه
Herz (Hz)	فريکونس يا د اهتزاز شمير په واحد ټا نيه کې
Hippokrates	يو يوناني درمل پوه چې لږ څه پينځه سوه کاله دمخه ديونان اتن په ښار کې ژوند کولو
Hypoxic cell	د لږ اکسيجن لرونکي حجري
I	
Immune System	د بدن دفاع سيستم
Impulse Mass Spectrometer	د يورانيم ايزوټوپونو د پيژندلو يوه نامتو دستگاه
Incident photon	رالويدونکي فوټون
Induction	راپارول يا د يوې ناروغۍ منځ ته راوستل
Ingestion	د خوراک او څښاک له لارې بدن ته ننوتل
Inhalation	تنفس کول
Interaction of ionizing radiation with matter	دمادي سره د ايوناييز کونکو وړانگو غبرگون
International Atomic Energy Agency = IAEA	داتومي انرژۍ نړيوال سازمان
International Commission of Radiation Protection = ICRP	د ايوناييز کونکو وړانگو د خطر څخه د ځان ساتنې نړيوال کميسيون
In vitro	هغه تجربې چې د ژوندۍ اورگانيزم څخه بهر په يوه لابراتوار کې تر سره کيږي
In vivo	ټول هراړخيزې تجربې چې په ژوندي اورگانيزم باندې او يا ژونديو حجرو باندې تر سره کيږي
Ion	يو اټوم او يا مالیکول چې د الکترونو په را نيولولو يا بايللو سره يې يو بريښنايز چارج پيداکړی وي.
Ion dose (1C/kg)	داينو دوز چې واحد يې يو کولومب پريو کيلو گرام
Ionization	ايوناييزيشن: يوه فزيکي کر نلاره ده چې يو اټوم يا مالیکول يو بريښنايز چارج گټي او يا يې بايلي
Ionization Chamber	د بريښنايز چارجونو اندازه کولو اله




Ionizing radiation	ا یونایز کوونکی وړانګې: هغو وړانګو اویا هستوي بڅرکو ته ویل کیږي چې په یوه بیالوژیکي ماده کې دایونوجوره منځ ته راولي. د بیلګې ډول لکه د ګاما وړانګې، بېټا وړانګې اونیوترونه
Isomers	دیوي هستې هیجاني حالت چې نسبت نوروته اوږد عمر لري
Isotopes	دیوه اټوم هغه نوکلید چې دپروتونو شمیر یې سره یوشان خونیوترونو شمیر یې توپیر ولري
J	
Joule = J	د میخانیکي انرژي واحد
K	
Kathode	کتود: دیوه بریښنا یز سرکټ دمنفي قطب برخه
Kelvin (K)	کلون: دتود وځی (حرارت) واحد
Kinetic energy = E_k	حرکي انرژي (خوځېدونکي) انرژي
L	
Laser processes	د لیزر کرنلاره
Laser rays	دلیزر وړانګو
Lens	د سترګو کسي
Letal Dose = LD ₅₀	د وړانګو هغه اندازه چه پنځوس په سل کې وګړي وژني
Leukaemia	دویني سرطان
Leukippos	لوپیکپوس یونانی فیلسوف چې لږڅه پینځه سوه کال دمیلاد نه دمخه یې داتوم نظریه راپیدا کړه
Light Water Reactor	دسپکو اوبو هستوي بټی
Linear Energy Transfer = LET	دانرژي سم سیخ یا خطی انتقال
Linear non threshold theory = LNT	سم سیخ لیمیت نه لروونکی تیوري په ډاګه کوی چی دورانګوخطر دانرژي دوز سره سم سیخ خطي تناسب لري. دا په دې مانا چې که وړانګې په ډیره ټیټه کچه هم وي بیا هم دروغتیا لپاره خطر لري اوله دې کبله کوم لاندنی برید نه شته چې بې خطر وګنل شي. نو ددې احتمال شته دی چې حتی یو فوتون هم دسرطان ناروغی راپاروی
Linear Particle accelerator	دبڅرکي خطی تعجیل کوونکي دستگاه
Linear Quadratic Theory	سم سیخ مربع تیوري
Lipid	واژه
Liver	ینه




Logarithmus Naturalis = Ln	طبیعی لوگاریتم
Longitudinal plane	په اوږدو سطحه
M	
Macrophages	د بدن په غړو کې ځانگړو حجرو ته وايي چې د بدنې حجرې او یا مایکروبوونه د اپنزايمو په مرسته سره دمنځه وړي
Magnetic moment	مقناطیسي مومېنټ
Malignant tumors	د نسجونو ناوره پړسوب چې بې پولې او بې بنددیزه سترېږي او گاونډي غړی تر فشار لاندې راولي او هم د بدن نور وېرځو ته غوړيږي
Mamma	بڅینه او یا نارینه تي
Mass Spectrometer	د کتلي شپکترومېټر
MBq	مېگا بېکارېل: یو ملیون بېکارېل
Mega	یو ملیون
Metastase	میتا ستاز: کله چې د سرطان نا روغي د بدن نور وېرځو ته هم و غوړيږي
Mikro	یو ملیونمه برخه (0,000001)
Milli	زرمه برخه
Milling/Refining	دیورانایوم اکساید اوره کول
Mining	د یورانایوم در اېستلو کړنلاره
Mitosis	میتوزیس: د حجرو د پېرېښتی ویش
Mol (mol)	مول - د مادي اندازه کولو واحد. کله چې د یوه عنصر اټومي وزن په گرام سره ونښوونو د مادي یو مول لاس ته راځي
Mother nuclid	مورنی هسته
MRT= Magnetic Resonance Tomography	ماگنېټیک ریزونانس توموگرافي
Mutation	موتیشن: د بدني او یا جنسي حجرو په ډي این ای کې بیا لویځي او کیمیاوي بدلون ته وايي.
N	
Nano	یو په ملیار دمه برخه
Natural Logaritm	طبیعی لوگاریتم
Natural radiation sources	د طبیعي وړانگو منابع




Natural radioactivity	طبیعی رادیواکتیویټي
Neutrino = νe	نیوترینو: یوینسټیز هستوي بڅرکی دی چې بریښنايز چارج نه لري اودلیپټونو Leptons ذرې په ډله کې شمیرل کیږي
Nuclear energy levels	داتوم هستی دانرژي لیول
Nuclear forces	هستوي قواوې، هستوي ځواکونه
Nuclear medicine	هستوي طب
Nuclear radiation	هستوي وړانګي
Nuclear Energy	هستوي انرژي : کله چې ډیورانایوم ۲۳۵هسته په حرارتي نیوترونو بمبارد شي نو په نتیجه کې د یورانایوم ۲۳۵ هسته په څو برخو جلا کیږي او په پایله کې په منځني ډول د دوو نه تر دریو پورې نیوترونه ازادیږي او ۲۰۰ میګا الکترون ولته انرژي په لاس راځي
Nuclear Reactor	هستوي بټی: دبرېښنا د تولید په موخه یوه هستوي دستگاه ده چې هلته تر کنترول لاندې یو چاودیدونکی ځنځیري هستوي تعامل صورت نیسي اوپخپله پایښت مومي.
Nuclear reaction	هستوي تعامل: کله چې یوه لوړ انرژي ذره لکه پروتون، نیوترون، پروتون او نور په یوه نښه (Target) لکه داتوم یوه هسته ولګیږي اوپه پایله کې دغه هسته وچوي اونورې ذرې، ګاما وړانګي، الکترومقناطیسي وړانګي اورادیونوکلید مینځ ته راشي
Nucleid	نوکلید: هغه اټوم چې په ځانګړي ډول داتوم نمبر، اټوم کتلي او انرژي لیول سره ښودل شوی وی
Nucleus	هسته یا منځي
O	
Orbits	مدارونه یا پیرونه
Organ Dose	دغړي دوز
P	
Pair Production	د جوړه بڅرکو پیدایښت
Particles radiation	د ذرو یا بڅرکو وړانګي
Pb= Plumbum	یو فلز دی چې سرب ورته وايي
Pellets	ټوټې یا مردکي
Photon	فوتون : د یوناني ژبې کلمه ده چې مانا یې رڼا ده . فوتون دنورانرژي ترټولوکوچنی ذره تشکیلوي
Photon radiation	د فوتون وړانګي
Physical effects	فزيکي اغيزي




Pico	لس په طاقت د منفي دوولس
Positron	پوزيټرون: یوه هستوي بڅرکی دی چې کتله یې د الکترون سره برابرې خو مثبت بریښنايز چارج لري
Positron Emmission Tomography = PET	پوزيټرون ايميزيون توموگراف : دهستوي طب يوه فزيکي کرنلاره ده چې دسرطان ناروغيوپه پيژندنه کې کارول کيږي. دنوموړې موخې لپاره ناروغ ته يو راډيواکتيو ايزونوپ لکه کاربن يوولس، نايټروجن ډيارلس، اکسيجن پينخلس اوفلور اتلس نوکلید په رگونوکې ور پيچکاري کيږي. نوموړي نوکلید په هغو نسجونو کې چې د سرطان په ناروغي ، انتاني ناروغي اخته وي او يا التهاب ولري دنورويه پر تله ډير جذب کيږي. څرنگه چې نوموړي ايزوتوپونه د پوزيټرون ذرې خپروي او د بدن څخه بهرته را وتلای شي نوډيوه ډيډيکتوريه مرسته سره اندازه کيدلای شي.
Proton	پروټون يوه داتوم هستې يو ه بنسټيزه ذره ده چې مثبت بریښنايز چارج لري او کتله يې مساوي ده $1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$
probability	احتمال اوددې چانس چې يوه ټاکلې پيښه کيدای شي چې منځ ته راشي
Profelax	پروفېلاکس: ټولې هغه کرنلاري لکه واکسين، دوايې خوړل، ځانگړی خوراک اونورې لارې چارې چې ډيوې ناروغي دمخ نيوي په موخه پخوا پيل کيږی
Prostata	پروستا تا غده
Q	
Quality Factor = Q_R	کوالتي فکتور يا دورانگو دوزن فکتور: دتوپير لرونکو وړانگو بيالوژيکي اغيزې په پام کې نيسي ډبلگه په ډول که يوه ناروغ ته د گاما وړانگو په ځاي الفا وړانگې ورکړ شي نودمعادل دوز په مرسته يې د خطرکچه اټکل کولاي شو
Quant	کوانت: دالکترو مقناطيسي وړانگود انرژي تر ټولوکوچنی اندازه ده چې دخپريدلوورتيا لري اوانرژي يې مساوي ده له حاصل ضرب فریکوينسي اودپلانک ثابت عدد. د بېلگه په ډول لکه دنورکوانت (فوتون کوانت)، د گاما کوانت، اکسريزکوانت (روننگن کوانت)
R	
Radiation Attenuation law	په ماده کې دورانگودکمزورتيا قانون
Radiation Measurement	دورانگو اندازه کول
Radiation Physics Terminology	دراديوفيزيک نومونپوهنه




Radiation Protection	دورانگو نه ساتنه
Radiation sickness syndrome	دورانگو دناروغی سپندروم
Radio sensitive cell	دورانگو په مقابل کې حساسیت لرونکي حجرې
Radioactive decay	رادیواکتیف تجزیه
Radiobiology	دورانگو بیالوژي
Relative biological effectiveness = RBE	نسبي بیالوژیکي اغیزمن ضریب : په نسجونو کې دکوبا لټ شپېته رادیواکتیو عنصر د مقایسه کونکو وړانگو یا د ستاندارد (Standard) وړانگو او دخیرونکو وړانگو انرژي اندازې د حاصل تقسیم سره مساوي دی
Radiocarbon Methode	درادیو کاربن طریقه
Radiochemistry	رادیوکیمیا
Radiological weapons	رادیولوژیکي اویا د یورانیم وسلې
Radiolyse	داوېدتجزيي کرنلاره
Radiophysics	دورانگو فزیک
Radiotherapy	دورانگو په واسطه درملنه
Radiation Range	د وړانگو دخپريدلوواتن
Range in water	په اوبو کې دخپريدنې واټن
Reciprocal value	معکوس قیمت
Recombination	بیرته یو ځای کیدل
References	اخځونه
Regeneration	بیرته پوره کیدل، بیرته جوړیدل
Retina	د سترګې تر څنې پوستکي
Röntgen	رونټګن: یو جرمنی فزیک پوه وه چې په ۱۸۹۵ م کال کې یې د اکسریز وړانګې کشف کړې
Röntgen unit =R	درونټګن واحد: یو رونټګن په یو کیلو ګرام وچه هوا کې دایونایز کونکو وړانگو په واسطه پیداشوي بریښنايز چارجونه دي چې قیمت یې لږ څه دوه نیم په لس زرمه برخه د کولومب ده ($1R = 2,58 \times 10^{-4}$)
S	
Sagittal plane	د بدن په اوږدو سطحه
Screen	پرده
Sensitive	ډیره حساسه



Shell	قشر ، مدار، کرشی،
Sievert	سیورت: د معادل دوزواحد سیورت دی اودتوپیرلرونکو وړانگو زیان په پام کې نیسي. نوموړی واحد په بدن کې جذب شوي انرژي دوز او د کوالیټي فکتور د حاصل ضرب څخه تر لاسه کيږي
Single strand break	د یوه مزي یا هېلکس پرې کیدل
Somatic cell	د بدن حجري پرته له جنسي حجري
Somatic Mutation	د بدن حجرو موتیشن
Spectrum	شپيکټرم یا طیف او یا وړانگویش: دورانگوتولي څپې د بر سر نه تر ښکته سره پورې پکې وي. د بېلگه په ډول لکه د کازميکي وړانگي څخه تر رادیوي څپې پورې
Spectroscopy	شپيکټروسکوپي: د فزیکي او کیمیاوي کرنلارو په مرسته سره دمادي د یوې نمونې مالیکولي جوړښت، دورانگوطیف تحلیل اوترکیب رابرسیره کوي
Spontaneous cancer	د سرطان هغه ناروغیو ته وايي چې بې له کوم څرگند علت په طبیعي ډول یوه ناڅاپه او پخپله پیدا کيږي.
Staging systems	د سرطان ناروغی د ستروالي اود بدن نورو برخو ته د غوریدلو درجي سیستم په گوته کوي
Stimulate	هیجان
Stochastic effects	ستو خاستیک اغیزی: د وړانگو تصادفي زیان ته ویل کيږي چې د پېښیدلو احتمال یې دورانگودوز سره سم سیخ پورته ځي اود وړانگوکوم ټاکلی ټیټ لیمیت نه لري. دورانگو نوموړی زیان په کالونو وروسته منځ ته راځي. د بېلگه په ډول لکه د سرطان ناروغی.
Surgery	عملیات
System International de Units = SI	د واحدونو نړیوال سیستم
T	
T cell leukaemia	د ویني ټي حجري سرطان
Target	نښه
Tenth-value layer = TVL	لسم ارزښت پندوالی : دیوې مادي هغه پندوالی دی چې دلویدونکو وړانگو شدت لسمه برخه ورڅخه تیريږي
Terrestrial radiation	دځمکي لاندې وړانگي
Therapy	درملنه یا علاج
Thyroid Cancer	د تايرایډ سرطان ناروغی
TNT (Trinitrotoluene)	ټي این ټي : د کیمیاوي او یا هستوي انرژي هغه کچه رابښي چې په یوه چاودنه کې د تودوخې په شکل منځ ته راځي. د بېلگه په ډول




	يو كيلو گرام تي اين ٽي د لږ څه څلورنيم مليونوژول ميخانيکي انرژي سره سمون لري
Trisomie 21	تريزومي يوويشت: ديوې جنسي حجري مونيشن يوډول دی چې اولادونه يې د بدن په ټولو حجرو کې يوويشتم کروموزوم ديوې جوړې په ځای درې واره پيدا کيږي.
Tumor	تومور: د بدن نسجونوهر اړخيزپرسوب اود حجم غټوالي ته ويل کيږي. لکه التهاب او د سرطان نسجونوې کنټروله ويشتوب
Tumorsuppressorprotein	په بدن کې يولپروټين شته دي چې د سرطان ناروغۍ دمنځ ته راتلومخ نيوي کوي. د بېلگه په ډول لکه P53 پروټين چې په اولسم کروموزوم کې ديوه جين په مرسته جوړيږي.
U	
Uranium enrichment	د يورانيم دغني يا بډاي کولو کړنلاره
Uranium mining and production	د يورانيم د لاس ته راوستلو او توليد ټکنالوژي
Urine	ميتيازی
Uterus carcinom	درحم سرطان (زيلانخي سرطان)
V	
Vectors	وېکتورو نه
Virus	وايرس
Visible light	د ليدلو وړ وړانگي
W	
Watt	واټ: دقدرت واحد دی. يوواټ مساوي دي يوولټ ضرب امپير.
World Health Organization = WHO	دنړيوال روغتيا سازمان
X	
X – Bremsstrahlen	د اکس برېمز وړانگي
X-ray tube	د اکسريز دستگاه
X-rays	اکسريز يا رونتگن وړانگي الکترومقناطيسي وړانگي دي چې دنور وړانگو څخه يې انرژي لوړه ده. نوموړې وړانگي په طبابت کې دناروغيو د پېژندلو او درملنې په موخه ورڅخه گټه اخيستل کيږي.
Z	
Zygote	زايگوت : نطفه يا زيروړی:




Subject index
داصطلاحاتو لیست


الف	
اتوم، ۱۱، ۱۷،	الفا ذري انرژي، ۵۲
اتوم بم، ۶، ۱۷،	الکترو مقناطیسی و رانگی، ۵۳
اتوم هسته، ۱۸، ۱۹، ۶،	انتي نیوترینو، ۵۹
اتوم تحریک، ۲۳، ۳۷۲،	الفا تجزیه، ۶۱
اتوم قانون، ۹، ۱۶۷،	اکسریز عکس، ۷۴
اتوم کتله، ۱۱،	ارتجاعي ضربه، ۸۳،
اتوم کتلي واحد، ۷، ۱۲،	ایون دوز، ۹۵، ۹۶، ۹۸، ۱۰۰،
اتوم مطلق کتله، ۱۴، ۱۳،	ایونایزیشن چمبر، ۹۸، ۵۲،
اتوم موډل، ۱۷، ۱۸،	اکسریز آلہ، ۹۹،
اتوم نسبي کتله، ۱۲، ۱۴،	انرژي دوز، ۱۰۰، ۱۰۹، ۱۱۶، ۱۹۲،
اتوم نمبر، ۲۸، ۶۱،	اغیزمن معادل دوز، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۸،
اتومي انرژي، ۶، ۱۶۷، ۲۴۱،	انرژي دوز قدرت، ۱۰۵،
اتومي بقی، ۲۵۲، ۱۶۷،	انرژي خطی انتقال، ۱۲۱، ۱۲۲،
امپیرمتر، ۵، ۹۹، ۳۸۱،	انتشار فاصله، ۱۲۵،
اتومي وزن، ۱۲،	اوبو تجزیه، ۱۳۲،
اتومي وسلي، ۲۷۰، ۳۴۸،	آزاد رادیكال، ۱۳۵،
اغیزمن دوز، ۱۱۹، ۱۵۴،	اوبه زن الکترون، ۱۳۰،
الفا تجزیه، ۳۶۷، ۶۱، ۷۷، ۶۰،	اپیتیل نسجونه، ۱۳۹،
الفا ذره، ۶۱، ۶۳، ۷۰،	اپوپتوزیس، ۱۴۲، ۱۴۳،
الکترو مقناطیسی و رانگی، ۵۴، ۵۷،	اونکوجین، ۱۵۲،
اتوم شعاع، ۸،	اتومي انرژي قانون، ۱۶۷،
الکترون، ۷۰، ۱۸، ۷۴،	ایزوتوپ، ۱۷۶،
الکترون ولت، ۷۱، ۷۳، ۷۷،	ایروزول، ۱۸۰،
اتوم مدار، ۲۱،	اینشتاین، ۱۷۴،
اووگادرو عدد، ۱۲، ۳۲، ۱۳،	ایرو تیم، ۲۰۴، ۲۰۸،
ایزوتوپ، ۳۶، ۳۹، ۴۳، ۵۸، ۷،	اورگانوگنیزیس، ۲۲۱،
ایزوتون، ۷،	الارا پرنسیپ، ۲۴۵،
ایزوبار، ۷،	ایپی دیملوجی، ۳۵۱، ۲۴۱،




ايڪسپونينسيال تابع، ۱۴	اڀي ڊيمولوجي شميرنه، ۳۵۱
ايڪسپريز، ۲۱، ۱۸۵	اتوم جورڻيٽ، ۱۷
ايونائيزيشن، ۵۲، ۱۵	اتوم ڪلمه، ۱۷
اتومي انرژي سازمان، ۱۷۷، ۲۶۱	ايونائيزيشن انرژي، ۵۲
اڪٽيوٽي واحد، ۳۱	اتوم او قرآن، ۱۷
اويلر عدد، ۳۴	اريسٽوٽيل، ۱۸
اڪسپونينسيال تابع، ۳۵	اتوم مڊل نيلزبور، ۱۸، ۱۹
اغيز من نيمائي وخت، ۴۵	الڪٽروسٽاٽيڪ قوه، ۱۹
الفا ورائنگي ڪتله، ۵۱	انرژي طيف، ۲۱
ب	
بلاستوگينيزيس، ۲۲۱	بنسٽيز واحد، ۱
بحراني ڪتله، ۱۶۵	بيٽا انرژي، ۶۹، ۱۲۹، ۲۴۴
بدن اناٽومي محورونه، ۳۴۳	بور اٽوم مڊل، ۱۸، ۱۹
براگ ڪلپمن قانون، ۱۲۶	براگ ڪلپمن قانون، ۱۲۶
بريڊر هسٽوي ٻٽي، ۱۵۸	بيوپسي، ۱۹۵
برهمز ورائنگي، ۷۱، ۷۴	بيو ڪيميائو تعامل، ۱۹۵
بهرني ورائنگي، ۱۸۰	بيالوژيڪي اغيزي، ۳۴۹، ۱۱۴، ۳۴۶
بيا لوژيڪي ڊوزيمٽري، ۲۸۵، ۲۸۴	بايسٽنڊر اغيزه، ۳۴۹
بخڙڪو ورائنگي، ۵۳	بيالوژيڪي بدلون، ۳۶۲
بيالوژيڪي نيمائي وخت، ۴۵	بيومالڪيول، ۳۶۲
بيٽا تجزيه، ۶۴، ۶۵	بيالوژي، ۹
بيٽا ورائنگي، ۷۶، ۳۶۰، ۵۱	بيالوژيڪي نمونه، ۳۲
بيڪاريل، ۲۴۰، ۲۶	بيالوژيڪي غيرگون، ۱۳۱
بيننگن پروسوب، ۳۲۲	بيٽا ذره، ۸۲، ۵۲
بيٽا مثبت تجزيه، ۶۵	بيٽا ورائنگو انرژي، ۱۱
پ	
پلوٽونيم، ۲۸	پروٽون، ۲۵، ۲۷، ۳۰، ۵۹
پلازما، ۲۸۷	پاراسيلزيوس، ۹۵
پلازما ڪتلي شپڪٽروسڪوپي، ۲۸۶	پلانڪ ٿا بٽه، ۲۱، ۵۶
پلانڪ ٿا بٽه، ۵۶	پروٽون ڪتله، ۸، ۵
پلوٽونيم، ۱۵۷، ۱۵۸	پي ميزون، ۵۳
پلور اڊيو اڪٽيو سلسله، ۲۸	پي پي ايم، ۲۸۹
پوزيٽرون، ۳۰، ۸۱، ۳۷۸، ۶۵	پي ميزون، ۳۰
پولي مبرازي انزايم، ۲۲۰	پيسنابلينڊي، ۱۲۷
ت	
تاير ايد، ۳۳۸، ۱۵۳	تجزئي ثابت، ۳۸




تجزیې ثابت، ۳۸	تخنېسیم نیمایي وخت، ۳۸
تخنېسیم، ۳۷	ترا نسېسیون ۹۲،
ترا نسېسیون ۹۲،	تریزومي، ۲۱۱،
تریزومي، ۲۱۱،	توریم رادیو اکتیو سلسله، ۲۸،
توریم رادیو اکتیو سلسله، ۲۸،	تومور، ۱۴۷،
تومور، ۱۴۷،	تومور سپرېسر جین، ۱۵۲، ۱۵۰،
تومور سپرېسر جین، ۱۵۲، ۱۵۰،	تومور مارکر، ۳۳۷،
تومور مارکر، ۳۳۷،	ترون انرژي، ۶۸، ۷۸، ۷۵،
ترون انرژي، ۶۸، ۷۸، ۷۵،	تومور مخه نیوونونکی جین، ۱۴۸،
ب	
تي این ایم سیستم، ۳۳۵	تیته کچه وړانګې، ۳۴۶، ۳۴۸،
تیته کچه اغیزمن دوز، ۲۵۶،	تیته لیول، ۳۷۳،
تی ان تي، ۳۸۰، ۲۲۸، ۱۷۸،	تیته لمېت، ۳۸۰،
تي این ایم سیستم، ۳۳۵،	تي حجري سرطان، ۳۸۰،
تي انتي هستوي انرژي، ۶،	تي ان تي معادل حرارتي انرژي، ۵،
تیته مدار، ۱۹،	دتیته فریکونس برخه، ۵۷،
ج	
جوره ذرو پیدایښت، ۸۰، ۷۸، ۱۳۰،	جوره ایونونه، ۷۲،
جنېتیک موتیشن، ۲۰۹،	جوره مثبت ایونوالکترونو، ۹۶،
جین تیرایي، ۳۳۸،	جوره چارجونو، ۹۹،
جنسي حجري، ۱۳۹،	جین، ۲۰۵، ۲۱۵، ۲۵۱،
جینېتیک وروستی اغیزې، ۲۳۳،	جین حجري، ۳۳۱،
جین نمبردری پنخوس، ۱۴۸،	جول، ۱۰۱،
ح	
حجره (ژونکه)، ۱۳۷،	حجري کثافت، ۱۲۳،
حجري چېک پوینت، ۱۴۰،	حجري حجم، ۱۲۳،
حجري گرزیدونکي پړاونه، ۱۴۰،	حجري رادیولایزیشن، ۱۳۲،
دحجري ډي این ای DNA، ۱۳۵،	حجري جوړښت، ۱۳۷،
خ	
خطي طیف، ۲۸۲، ۳۷۹،	خنثي لیول، ۱۳۲،
خطي تعحیل کوونکی، ۷۱،	خپلواک رادیکال، ۱۳۲،
خطر اټکل، ۱۰۹،	خنثي مالیکول، ۱۳۶،
خطر احتمال، ۱۱۸،	خطیز شپکتزم، ۲۸۲،
د	
دویترون، ۱۵،	دید کمېنت، ۱۶۸،
درندي اوبه، ۱۵،	دوه مرکز ه موتیشن، ۲۱۰،




دلتا الکترون، ۸۳،	دیدیکتور، ۲۰۴، ۲۸۳،
دبل انرژي دوز، ۲۱۳،	ډي اين اي. غبرگ تارونو پري کيدل، ۲۱۶،
دبل سترانگ، ۲۱۶، ۲۱۷،	ډي اين اي کريک وائسن موډل، ۱۵۲،
دبل هيلیکس، ۲۱۶، ۲۱۷،	ډي. اين. اي. هيلیکس، ۱۳۸، ۱۳۸،
دوز ضريب، ۱۷۴،	ډي اوکسي ريبنونوکلېک اسيد، ۱۳۸، ۱،
دوز، ۹۵،	ډي اين اي، ۱۴۰، ۱۳۸،
دوز خطر ضريب، ۲۷۳،	دوز يمټري، ۹۵،
دبل وخت، ۳۲۹،	دبل حجم، ۳۲۹،
ر	
رادون، ۲۰۱، ۲۵۲، ۲۵۷،	راديو اکتيف، ۲۶، ۳۷، ۵۱،
راديو اکتیویټي، ۲۶، ۳۲، ۲۹،	راديو اکتیو سلسلې، ۲۸،
راډيم، ۲۷،	راډیو تیراپي، ۳۳۸،
راډیو اکتیو قانون، ۳۴،	راډیو لوژیکي وسلې، ۱۶۷،
راډیو اکتیو تجزیه، ۲۹،	راډیوم، ۱۸۴،
راډیو ایزوټوپ	رونټگن وړانگې، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۲۴۸،
س	
سرطان ناروغی، ۱۸۶، ۲۰۵، ۲۱۷، ۲۴۰،	سیمولاسیون ټکنالوژي، ۳۴۰،
سپکو اوبو بټی، ۱۶۰،	سیورت، ۱۱۵، ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۹،
سپکي اوبه، ۱۵،	ستم ججري، ۱۳۹،
سرطان ناروغی جین، ۲۵۵، ۲۵۷، ۳۱۶،	سیکلوترون، ۸۱، ۱۶،
سرطان ناروغی رومبی شکمنی نښی، ۳۴۲،	سوپر نووا، ۱۵۵، ۱۵۶،
سره کرویات، ۱۳۹،	سوماتیک حجرې، ۱۳۹،
سم سیخ ایونایزکونکي وړانگې، ۵۳،	سوماتیک موتیشن، ۲۰۹،
سم سیخ لیمیت نه لروونکی تیوري، ۲۶۲، ۲۷۱،	سم سیخ مربع تیوري، ۲۶۳،
ط	
طبیعی رادیو اکتیویټي، ۲۶،	طبیعی سرچینې، ۳۶۴،
طبیعی لوگاریتم، ۳۴،	طبیعی رادیو اکتیو مواد، ۲۸،
طبیعی یورانیم، ۱۵۵، ۱۵۶،	طبیعی رادیو اکتیو عنصر، ۲۵۳،
طبیعی وړانگې، ۲۵۱،	طبیعی رادیو اکتیو سلسله، ۲۸،
غ	
غریب شوي یورانیم، ۱۶۲، ۱۶۵، ۱۷۱، ۱۷۰،	غري دوز، ۱۱۶، ۱۱۷،
ف	
فوتو اغیزه، ۷۸، ۱۳۰،	فوتون انرژي، ۵۶،
راديو اکتیو باران (فال اوبت)، ۲۲۹،	فوتون وړانگې، ۵۳،
فزیکی نیمايي وخت	فوزیون، ۱۸۴،




فزيکي نيمايي وخت، ۳۴	فيلا دلفيا کروموزوم، ۱۵۰،
فلوريسينس تگلاره، ۲۸۵،	فېتوگېنېزيس، ۲۲۱
فوتون، ۱۹، ۲۱،	فوتون متمدادي طيف، ۲۲
ک	
کولومب قوه، ۳۰،	کروموزوم، ۱۳۸،
کازمېکي وړانگې، ۲۵۱،	کارسينو جېنيک، ۱۷۰،
کتلي نمبر، ۱۱، ۱۹، ۶۱،	ککړ تيا وړانگې، ۱۹۰،
کوانت، ۶۶، ۲۸۲، ۳۷۸،	ککړ تيا، ۱۹۹،
کيوري، ۳، ۳۱،	کاتارکټ ناروغي، ۲۰۷،
کيلوبيکارييل، ۳۱،	کازميکي وړانگې، ۲۵۱،
کازمېکي وړانگې، ۴۳،	کولېکټيډوز، ۲۷۲،
کلود چمبر، ۵۲،	کتلي شپېکټرومتر، ۲۸۸،
خپريدلو واتن، ۵۹،	کانسر، ۳۰۱،
دورانگو کمزورتيا قا نون، ۸۳،	کمپيوټر توموگرافي، ۳۰۱،
کمزورتيا فکټور، ۸۵، ۸۷،	کيمياوي تيراپي، ۳۳۸،
کمزورتيا خطي ضريب، ۸۵، ۸۸،	کواليتي فکټور، ۱۱۵،
کتلي کمزورتيا ضريب، ۸۷، ۸۸، ۸۹،	کتلي دروونکي قدرت، ۱۲۵،
کمپټون اغيزه، ۷۹، ۱۳۰،	کيمياوي ډوزيمټري، ۱۳۶،
کوبا لټ شپېته، ۱۲۸، ۲۹۲، ۳۷۹،	کلونوگېنيک مړينه، ۱۴۳،
گ	
گاما شپېکټرومېټري، ۱۶۷،	گراف، ۸۹،
گري، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۱۰،	گري تقسيم په وخت، ۹۰،
گلف سيندروم، ۱۷۰، ۱۸۳،	گرام پرسانتي متر مربع، ۹۳،
ل	
لسم ارزښت پندوالی، ۹۲، ۹۱،	لور فشار او بوتي، ۱۶۰،
لارمور فريکونسي، ۳۰۹،	لوري کچي اغيزمن ډوز، ۲۵۶،
لومفوسيت، ۲۱۲،	ليټال ډوز، ۱۲۸،
م	
مدار، ۱۸، ۱۹، ۲۱،	متمدادي طيف، ۲۱، ۴۸، ۵۴،
مېگا بيکارييل، ۱۰۹،	مخصوصه ايونايژيشن، ۱۲۴، ۱۲۵،
ماري کيوري، ۲۷،	مخصوصه راډيو اکتیويټي، ۳۲، ۱۷۴،
ماليگن پړسوب، ۳۲۲،	مشخصه طيف، ۲۲،
مايکروڅپي، ۹۴، ۵۳، ۵۲،	معادل انرژي ډوز، ۲۰۰، ۱۲۹،
مايوزيس، ۱۳۹،	مقناطيسي ريزونانس توموگرافي، ۳۰۴،
مايوزيس، ۱۳۹، ۲۰۹،	ملي سيورت، ۱۰۷، ۱۱۷، ۱۲۸،
ملي کيوري، ۲۵۸، ۴۱،	مولار کتلي وزن، ۳۸،



منځنی وخت، ۴۰	موډراتور، ۱۵
مولټیپل میولوما، ۳۳۷	میرمن کیوري، ۱۸۵، ۳۷۲، ۷۵
موتوجېنیک، ۱۷۰	میتاستاز، ۳۲۲
موتیشن، ۱۹۵، ۱۵۳، ۱۱۴، ۱۳	میتولیشن، ۱۹۶
مول، ۱۲، ۱۴، ۳۲	متمادي طیف، ۲۲
ملي سیورت، ۱۸۶، ۱۱۰، ۱۰۵	ملي گري، ۱۱۵
ن	
نوکلید، ۲۷، ۱۷۶	نیپتونیم، ۱۵۸
نسبي بیالوژیکي اغیز منټیا، ۱۲۷	نیکروزیس، ۱۴۲
نسجونو وزن فکتور، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۱۸	نیمایي عمر، ۲۸
نسجونو خراب ډوله پړسوب، ۳۲۱	نیمایي پنډوالی، ۸۹
نطفه، ۲۲۱	نه سم سیخ ایونایز کوونکي وړانگي، ۵۳
ننه وړانگي، ۱۹۰	نور سرعت، ۵۵
نه ایونایز کوونکي وړانگي، ۵۳	نوکلید چارټ، ۷۵، ۷۶، ۳۶۲
ه	
هارمون تیراپي، ۳۳۸	هستوي ځنځیري تعامل، ۱۶۵
هایدروسېفالوس، ۲۲۳	هستوي ټټي سونگ مواد، ۱۶۵
هایدروجن پر اکساید، ۱۴۸	هستوي طب، ۲۵۳
هسته، ۱۸۶، ۱۵۷، ۱۳۸، ۱۳۷	هستوي قوه، ۳۰
هستوي ازمویني، ۲۳۱، ۲۳۰	هستوي وړانگي، ۵۸
هستوي انرژي، ۱۶۶	هستوي ټټي، ۱۵۹
هستي ریزونانس، ۳۱۰	هستوي چاودنه، ۱۶۶، ۶۸، ۶۳
هورمېزېس موډل، ۲۶۳	هیرسپیتین، ۲۹۹
هډوکو سرطان، ۱۸۵	هېنري بېکاریل، ۱۸۵
و	
وړانگي، ۵۱، ۲۸، ۲۴، ۱۸، ۱۵	وړانگو درملنه، ۳۴۱، ۳۳۹
ویني سرطان، ۱۹۴، ۱۵۰	وړانگو ستوخاصتیک اغیزې، ۲۴۰، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵
وړانگو اغیزې، ۱۳۰	وړانگو فزیکي اغیزې، ۱۴۸، ۱۳۰
وړانگو اندازه کول، ۱۳۰	وړانگو کلنۍ ډوز، ۲۷۳، ۲۴۷، ۲۴۵
وړانگو انرژي، ۱۳۰، ۱۲۸، ۱۲۷	وړانگو کوالیټي فکتور، ۱۹۹
وړانگو بایستیندر اغیزه، ۳۵۰، ۲۶۵	وړانگو ناروغی زیندروم، ۲۳۸، ۲۳۴، ۲۲۸، ۲۲۶
وړانگو بیالوژي	وړانگو ناروغی زیندروم، ۲۳۸، ۲۳۴، ۲۳۳
وړانگو خطر نه ژغورنه، ۲۴۶، ۲۴۲	وړانگو ناوړه اغیزې، ۲۶۶، ۲۶۴، ۲۶۲، ۲۶۰، ۲۵۵
وړانگو خطر، ۲۶۲، ۲۵۶، ۲۰۳	وړانگو نه ساتنه، ۲۴۶، ۲۴۲، ۲۴۰
وړانگو دخطر مطلق موډل، ۲۶۹، ۲۶۸	وړانگو نه سم سیخ اغیزې، ۱۴۷، ۱۴۶
وړانگو وزن فکتور، ۲۴۴، ۱۱۸	وړانگو اندازه کولو تگلارې، ۲۹۸، ۲۸۶، ۲۸۴، ۲۸۳



ورانگو ډوز او دواتن مربع قا نون، ۱۰۹،	ورانگو انرژي ډوز، ۲۶۲، ۲۵۳، ۲۱۶، ۲۰۴،
ورانگو بيلالوژيکي اغيزي، ۱۴۸، ۱۳۲،	ورانگو زهرجنې اغيزي، ۱۸۵،
ورانگو بيلالوژي، ۱۲۶، ۱۲۶،	ورانگو ژرورانې، ۲۱۰،
ورانگو تصادفي اغيزه، ۲۷۴، ۱۵۴،	ورانگو سرچينې، ۲۵۱،
ورانگو تيراتوگين اغيزي، ۲۲۲،	ورانگو سم سيخ اغيزي، ۱۴۷، ۱۴۵، ۱۴۶،
ورانگو د خطر نسبي مودل، ۲۶۹، ۲۶۸،	ورانگو سوماتيک ورانې، ۲۱۰،
ورانگو دخپروني واټن، ۱۲۶،	ورانگو فزيک
ورانگو کمزورتيا قا نون، ۲۴۴، ۸۴،	ورانگو کمزورتيا قا نون، ۲۴۴، ۸۴،
ورانگو کيمياوي اغيزي، ۱۴۸، ۱۳۲،	ورانگو کيمياوي اغيزي، ۱۴۸، ۱۳۲،
ورانگو لور ليميت، ۱۸۹، ۱۸۷،	ورانگو ډوز خطر ضريب، ۳۵۰، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶،
ورانگو موټيشن اغيزي، ۲۶۲،	ويني دفاع سيستم، ۱۹۴،
ورانگو ټاکونکي اغيزي، ۲۱۱، ۲۰۸، ۲۰۷،	ورانگو څخه دځان ساتنې سيمي، ۲۴۹،
ې	
يورانيوم اکسايډ، ۱۶۰، ۱۵۸،	يورانيوم نفوز کړنلاره، ۱۶۱،
يورانيوم دوه سوه اته ديرش، ۱۵۸، ۱۵۶،	يورانيوم وسلې، ۱۶۷،
يورانيوم دوه سوه پينځه ديرش، ۱۵۶، ۱۵۸،	يورانيوم، ۱۵۹،
يورانيوم سلسله، ۲۸،	يورانيوم اوږه کول، ۱۶۰،
يورانيوم استخراج، ۱۵۹،	يورانيوم بډای کول، ۱۶۱، ۱۵۹،
يورانيوم تجزيه، ۱۷۴،	يورانيوم هيکسا فلورايد، ۱۶۰،
يورانيوم زيرمي،	يورانيوم سپنټريفوگ کړنلاره، ۱۶۳،
يورانيوم سرگولی، ۱۷۷،	يورانيوم معدني ډبره، ۱۶۰، ۱۵۹،
پای	



ملونه Appendices

دراديو ايزوتوپو جدول (Radioisotops Table) ☢

په ۴۴- جدول کې د مهمو راديو نوکلید (Radionuclides) فزیکي خواص راټول شوي دي چې هر یو یې په لاندې ډول تشریح کيږي.

★ دکتلي تورلیکل شوی شمیر هغه ایزوتوپونه تشکیلوي چې په طبیعت کې اکثر (ډیرځلې) پیدا کيږي .


★ دکتلي شمیرچې په قوس کې لیکل شوي وي هغه طبیعي راديو ایزوتوپ دي چې فزیکي نیمايي عمر یې بې حده اوږد وي.

★ هغه راديو ایزوتوپونه چې په درملنه کې ورڅخه ګټه اخیستل کيږي په (Therapeutic = Th) سره بنودل شوي دي.

★ فزیکي نیمايي عمر ($T_{1/2}$) ساعت (h = hour) کال (a = Year) اوورځ په (d = day) تورو باندې لنډ لیکل شوي دي.

★ دراديو ایزوتوپونو عمده (بنسټیز) انرژي کمپو نېنت (برخه) په مېگا الکترون ولټ (MeV) بنودل شوي ده.

★ د ګاما توري Γ_H د همغه راديو ایزوتوپ د ډوز قدرت ثابته ده چې واحد یې مایکروسیورت متر مربع په ساعت په ګیګا بېکاریل ($\mu\text{Sv m}^2 \text{h}^{-1} \text{GBq}^{-1}$) ده.



د غما ثابتہ Γ_H	دورانگوانرژي MeV	فزيکي نيماي عمر	دمستقرو اور اديوايزو توپو د کتلي شمير	د عنصر نوم

Zerfallschema für ^{59}Fe , ^{60}Co , ^{90}Sr , ^{131}I , ^{137}Cs , ^{198}Au und ^{226}Ra

Erläuterung: Der Abstand zwischen den Energieniveaus ist proportional der Energie der β oder γ -Strahlung (nicht der α -Strahlung). Schräge Pfeile nach links: α -Zerfall, nach rechts: β -Zerfall, senkrechte Pfeile: γ -Übergang, gestrichelte Pfeile: innere Konversion (IC).

Isotopentabelle mit den wichtigsten radioaktiven Nukliden

Eine Tabelle der in der Nuklearmedizin verwendeten radioaktiven Isotope befindet sich im Kapitel Nuklearmedizinische Diagnostik.

Erläuterungen:

Fettgedruckte Massenzahlen: Häufigstes natürliches Isotop.

Massenzahlen in Klammern: Natürliche Radioisotope mit extrem langer Halbwertszeit.

(Th): Vorwiegend therapeutische Anwendungen

$T_{1/2}$ (Halbwertszeit): a = Jahre; d = Tage; h = Stunden


MeV: Energie der Hauptstrahlungskomponenten

Γ_H : Dosisleistungskonstante in $\mu\text{Sv m}^2 \text{h}^{-1} \text{GBq}^{-1}$ (einschließlich Vernichtungsstrahlung bei Positronenstrahlern sowie charakteristischer Röntgenstrahlung bei K-Einfang und IC).


K: K-Strahler, siehe „ β -Zerfall“.

Element	Massenzahlen Stabile Isotope	Radio- isotope	$T_{1/2}$	MeV α β γ	Γ_H
1 H Wasserstoff	1, 2				
2 He Helium	3, 4				
3 Li Lithium	6, 7				
4 Be Beryllium	9				
5 B Bor	10, 11				
6 C Kohlenstoff	12, 13				
7 N Stickstoff	14, 15				
8 O Sauerstoff	16, 17, 18				
9 F Fluor	19				
10 Ne Neon	20, 21, 22				
11 Na Natrium	23				
12 Mg Magnesium	24, 25, 26				
13 Al Aluminium	27				
14 Si Silicium	28, 29, 30				
15 P Phosphor	31				
16 S Schwefel	32, 33, 34, 36				
17 Cl Chlor	35, 37				
18 A Argon	36, 38, 40				

Literatur: Martin, M.J. u. Bleichert-Toft, P.H., „Radioactive Atoms“, Nuclear Data 8 (Oct. 1970), Nr. 112



عنصر	د مستقر اور اڈیویز	نیمای	دور انگو	د گاما	عنصر	د مستقر اور اڈیویز	نیمای	دور انگو	د گاما
توپو د کتلی شمیر	توپو د کتلی شمیر	عمر	انرژی	ثابتہ	توپو د کتلی شمیر	توپو د کتلی شمیر	T _{1/2}	انرژی	ثابتہ
19 K Kalium	39, 40, 41	42	12 h	—	3,58	1,51	37		
20 Ca Calcium	40, 42, 43, 44, 45, 48	45	164 d	—	0,25	—	—		
		47	4,5 d	—	0,66	1,29	150		
21 Sc Scandium	45	46	84 d	—	0,36	1,12	290		
22 Ti Titan	46, 47, 48, 49, 50								
23 V Vanadium	50, 51	48	16 d	—	0,70	1,32	420		
24 Cr Chrom	50, 52, 53, 54	51	28 d	—	K	0,32	4,8		
25 Mn Mangani	55	52	5,6 d	—	0,58	1,46	500		
		54	313 d	—	K	0,84	130		
		56	2,6 h	—	2,81	0,94	230		
26 Fe Eisen	54, 56, 57, 58	59	45 d	—	0,45	1,10	170		
27 Co Kobalt	59	56	77 d	—	1,50	1,23	480		
		57	272 d	—	K	0,12	15		
		58	71 d	—	0,47	0,81	150		
(Th)		60	5,3 a	—	0,31	1,33	350		
28 Ni Nickel	58, 60, 61, 62, 64	65	2,6 h	—	2,10	1,12	75		
29 Cu Kupfer	63, 65	64	13 h	—	0,57	0,51	29		
30 Zn Zink	64, 66, 67, 68, 70	65	244 d	—	K	1,12	83		
31 Ga Gallium	69, 71	66	9,4 h	—	4,14	0,51	310		
		67	3,3 d	—	K	0,30	21		
		68	1,1 h	—	1,88	0,51	150		
		72	14 h	—	0,96	2,20	360		
32 Ge Germanium	70, 72, 73, 74, 76	71	11 d	—	K	—	—		
33 As Arsen	75	74	18 d	—	1,36	0,59	120		
		76	1,1 d	—	2,97	0,55	63		
		77	1,6 d	—	0,68	—	—		
34 Se Selen	74, 76, 77, 78, 80, 82	75	120 d	—	K	0,27	55		
35 Br Brom	79, 81	82	1,5 d	—	0,44	0,77	390		
36 Kr Krypton	78, 80, 82, 83, 84, 86	85	11 a	—	0,67	0,52	0,3		
37 Rb Rubidium	85, 87	86	19 d	—	1,80	1,08	14		
38 Sr Strontium	84, 86, 87, 88	85	65 d	—	K	0,51	79		
		87m	2,8 h	—	—	0,39	49		
(Th)		89	50 d	—	1,46	—	—		
		90	28 a	—	2,75	—	—		
39 Y Yttrium	89	88	107 d	—	K	1,89	360		
		90	2,7 d	—	2,25	—	—		
		91	58 d	—	1,54	1,20	0,5		
40 Zr Zirkon	90, 91, 92, 94, 96	95	64 d	—	0,39	0,75	110		
41 Nb Niob	93	95	35 d	—	0,16	0,76	120		
42 Mo Molybdan	92, 94, 95, 96, 97, 98, 100	99	2,7 d	—	1,23	0,14	39		
43 Tc Technetium	—	99	210000 a	—	0,29	—	—		
		99m	6,0 h	—	—	0,14	16		
44 Ru Ruthenium	96, 98, 99, 100, 101, 102, 104	103	39 d	—	0,21	0,49	77		
45 Rh Rhodium	103	105	1,3 d	—	0,56	0,30	12		
46 Pd Palladium	102, 104, 105, 106, 108, 110	109	13 h	—	1,02	0,09	15		
47 Ag Silber	107, 109	110m	250 d	—	0,53	0,88	410		
		111	7,5 d	—	1,04	0,34	4		
48 Cd Cadmium	106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116	115m	45 d	—	1,61	0,94	5		
49 In Indium	113 (115)	113m	1,7 h	—	—	0,39	48		
		114m	50 d	—	1,98	0,19	26		
50 Sn Zinn	112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124	113	115 d	—	K	0,39	74		
51 Sb Antimon	121, 123	122	2,7 d	—	1,40	0,57	69		
		124	60 d	—	2,31	1,71	260		
		125	2,8 a	—	0,30	0,60	78		
52 Te Tellur	120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130	132	3,2 d	—	2,12	0,95	390		
53 I Jod	127	123	13 h	—	K	0,16	43		
		125	59 d	—	K	0,03	39		
		131	8 d	—	0,61	0,36	59		
		132	2,3 h	—	2,12	0,67	340		
54 Xe Xenon	124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136	133	5,2 d	—	0,34	0,08	14		
55 Cs Caesium	133	134	2,1 a	—	0,65	0,80	240		
(Th)		137	30 a	—	0,52	0,66	86		




عنصر	د گاما ثابتہ	دورانگو انرژی	نیمای عمر $T_{1/2}$	د مستقرو اور اڈیو ایزوتوپو د کتلی شمیر	عنصر	د گاما ثابتہ	دورانگو انرژی	نیمای عمر $T_{1/2}$	د مستقرو اور اڈیو ایزوتوپو د کتلی شمیر
عنصر	د گاما ثابتہ	دورانگو انرژی	نیمای عمر $T_{1/2}$	د مستقرو اور اڈیو ایزوتوپو د کتلی شمیر	عنصر	د گاما ثابتہ	دورانگو انرژی	نیمای عمر $T_{1/2}$	د مستقرو اور اڈیو ایزوتوپو د کتلی شمیر
56 Ba Barium	130, 132, 134, 135, 136, 137, 138	131 133 140	12 d 10.5 a 13 d	— — —	80 Hg Quecksilber	196, 198, 199, 200, 201, 202, 204	197 203	2.7 d 47 d	— —
57 La Lanthan	(138), 139	140	1.7 d	—	81 Tl Thallium	203, 205	204	3.8 a	—
58 Ce Cer	136, 138, 140, 142	141 144	33 d 284 d	— —	82 Pb Blei	204, 206, 207, 208	210	22 a	—
59 Pr Praseodym	141	143	14 d	—	83 Bi Wismuth	209	206 210	6.3 d 5.0 d	— —
60 Nd Neodym	142, 143, 144, 145, 146, 148, 150	147	11 d	—	84 Po Polonium	—	208 210	2.6 a 138 d	— —
61 Pm Promethium	—	147	2.6 a	—	85 At Astatium	—	—	—	—
62 Sm Samarium	144, (147), 146, 149, 150, 152, 154	—	—	—	86 Rn Radon	—	222	3.8 d	—
63 Eu Europium	151, 153	152 154 156	13.5 a 6.6 a 4.8 a	— — —	87 Fr Francium	—	—	—	—
64 Gd Gadolinium	152, 154, 155, 156, 157, 158, 160	—	—	—	88 Ra Radium	—	223 224 226 228	11.4 d 3.7 d 1600 a 5.75 a	— — — —
65 Tb Terbium	159	—	—	—	89 Ac Actinium	—	227	22 a	—
66 Dy Dysprosium	155, 156, 160, 161, 162, 163, 164	—	—	—	90 Th Thorium	(232)	227 228 230 234	19 d 1.8 a 75400 a 24 d	— — — —
67 Ho Holmium	165	—	—	—	91 Pa Protactinium	(231)	233	27 d	—
68 Er Erbium	162, 164, 166, 167, 168, 170	—	—	—	92 U Uran	(235), (238)	233 234	160000 a 244500 a	— —
69 Tm Thulium	169	170	129 d	—	93 Np Neptunium	—	235, 236, 237, 238, 239	—	—
70 Yb Ytterbium	168, 170, 171, 172, 173, 174, 176	175	4.2 d	—	94 Pu Plutonium	—	238, 239, 240, 241, 242	—	—
71 Lu Lutetium	175, (176)	177	6.7 d	—	95 Am Americium	—	238, 239, 240, 242, 243, 244, 246	—	—
72 Hf Hafnium	174, 176, 177, 178, 179, 180	175 181	70 d 42 d	— —	96 Cm Curium	—	240, 242, 243, 245	—	—
73 Ta Tantal	181	182	114 d	—	97 Bk Berkelium	—	245, 247, 248	—	—
74 W Wolfram	180, 182, 183, 184, 186	185 187	76 d 1.0 d	— —	98 Cf Californium	—	246, 249	—	—
75 Re Rhenium	185, (187)	186	3.8 d	—	99 Es Einsteinium	—	249, 250, 251, 252, 253, 254, 255	—	—
76 Os Osmium	184, 186, 187, 188, 189, 192	191	15 d	—	100 Fm Fermium	—	250, 251, 252, 254	—	—
77 Ir Iridium	191, 193	192	74 d	—	101 Md Mendelevium	—	255, 256	—	—
78 Pt Platin	190, 192, 194, 195, 196, 198	197	18 h	—	102 No Nobelium	—	253, 254	—	—
79 Au Gold	197	198 199	2.7 d 3.1 d	— —	103 Lr Lawrencium	—	257	—	—

1) Ohne Strahlung der Folgeprodukte

Im radioaktiven Gleichgewicht:

	MeV	α	β	γ	T_H
Radium ($^{226}\text{Ra} + ^{222}\text{Rn} + \dots$)	7.68	1.65	1.76	230	
Mesothorium ($^{230}\text{Th} + ^{226}\text{Ra} + \dots$)	8.78	2.25	2.62	310	
Actinium ($^{227}\text{Ac} + ^{227}\text{Th} + ^{223}\text{Ra} + \dots$)	7.36	1.44	0.87	59	

Dosisleistungskonstante D_0 nach H. M. Weiß, PTB Braunschweig.



دارو اښاد ډاکټر حاجي محمد سلطانزي خدران دلومري تلين په ياد


دا کتاب د هیواد پیاوړي فرهنگي او علمي شخصیت ارواښاد ډاکټر حاجي محمد سلطانزي په یادوراندې کوو چې د دې کتاب په لیکلو کې یې ستره ونډه په غاړه اخیستې وه. خوپه ډیره خواښینۍ سره د کتاب د بشپړ کیدو څخه مخکې یې د فاني نړۍ څخه ناڅاپه سترگې پټې کړې.



ارواښاد ډاکټر حاجي محمد سلطانزي خدران

د زېږېدونېټه : ۱۰ / ۱۲ / ۱۹۴۶ م
د مړینې نېټه : ۴ / ۹ / ۲۰۰۶ م
(۵۹ کلن)

په ۱۹۴۶م کال کې ارواښاد ډاکټر حاجي محمد سلطانزي دارو اښاد الحاج ډگروال الله داد خان سلطانزي زوی د پکتيا د ولايت په خدرانو کې زېږېدلی و.



لومړنۍ زده کړې يې په کابل کې د بي بي مهرو په ښوونځۍ کې او منځنۍ زده کړې يې د رحمان بابا په لېسه کې تر سره کړې دي. په ۱۹۶۵م کال کې له نوموړې لېسې څخه فارغ او د لوړو زده کړې لپاره د ننگرهار پوهنتون د طب په پوهنځۍ کې شامل شو. په ۱۹۷۳م کال کې هغه د ننگرهار طب پوهنځۍ په برياليتوب سره پای ته ورسوله. د څه مودې لپاره يې په غزني اوډيکتیکا په کتواز کې د ډاکټر په توګه دنده تر سره کړه. په ۱۹۷۴م کال کې لويديځ جرمني هیواد ته ولاړ.

ارواښاد ډاکټر حاجي محمد سلطانزئ يو تکړه جراح اود انستيزي څانګې مسلکي مشر متخصص ډاکټر وو. ۱۹۷۴م کال څخه راپدې خوا يې د جرمني په معتبرو روغتونونو کې د ډاکټر په توګه دنده تر سره کوله.

دارواښاد څخه يوه لور او دوه ځامن هريو دانيستيزي څانګې متخصص ډاکټر صالح محمد سلطانزئ، د طب ډاکټره ميرمن حليمه سلطانزئ بېرکزی ځدراڼ او دښوونځۍ زده کوونکې تنکې ځوان يما سلطانزئ پاتې شوي دي. دارواښاد اولادونو خپلې لوړې زده کړې د المان په پوهنتونونو کې تر سره کړي او د پښتونولۍ، افغانيت په لوړه روحيه روزل شوي دي

ارواښاد د ۲۰۰۶ م کال د سيپټمبر مياشت په څلورمه نيټه په جرمني کې د ورپېښې شوي زړه ناروغۍ له امله ددې نړۍ څخه د تل لپاره خپلې پلارنۍ هديرې ته وکوځېد.

(ارواډې يې ښاد وي)


څاڅکي څاڅکي يې له سترګو څڅيده

سحرګه وه د نرګس ليمه لاندې

ده وې ژوند مي دی يوه خوله خنډيده

ما وې څه دي ښکليه ګله ولې ژاړې

(نازوانا)



لورونه

مور دا کتاب دځدرا نو پياوړي ولسي او ملي مشر خداى بښلي شهيد تره کرنيل نور محمد خان سلطانزې چې دخپل ولس دسرلورنې، پرمختگ او هوساينې په لاره کې يې خپل ژوند دلاسه ورکړ او همدارنگه زموږ پلار خداى بښلي الحاج ډگروال الله داد خان سلطانزې ځدرا ن د دريم تلين په درناوى او نمانځنې ليکو چې دوى:

دلرافغانستان دخپلواکۍ په لاره کې د ارواښاد غازي حاجي ميرزا علي خان (ايبې فقير) سره په يوه سنگر کې دځان او مال درنې قربانى څخه تير او جنگيدلى وه.

خپل ماشومان يې تل په پښتو مورنۍ ژبه د کتابونو ليکلو او لوستلو ته هڅولي وه.

ديرش کاله دخپل هيواد په چوپړ کې د يوه رښتينې پوځي مسلکي افسر دنده، د وطن پالنې، ملي يووالۍ، ملي واکمنۍ ته په درناوي او پوځي مورال سره کلک ولاړ وه.

د يو ملي شخصيت په توگه هسکه غاړه له دغې فاني نړۍ څخه سترگې پټې کړې.

(ارواډې يې ښاد وي)

Publishing Medical Textbooks

Honorable lecturers and dear students!

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue we have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. In the past three years we have successfully published and delivered copies of 136 different books to the medical colleges across the country.

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-1014) states:

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari and Pashtu. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and give students access to state – of – the – art information. In the meantime, translation of English language textbooks and journals into Dari and Pashtu is a major challenge for curriculum reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to overcome this deficit. One approach is to mobilize Afghan scholars who are now working abroad to be engaged in this activity.”

Students and lecturers of the medical colleges in Afghanistan are facing multiple challenges. The out-dated method of lecture and no accessibility to updates and new teaching materials are the main problems. The students use low quality and cheap study materials (copied notes & papers), hence the Afghan students are deprived of modern knowledge and developments in their respective subjects. It is vital to compose and print the books that have been written by lecturers. Taking the situation of the country into consideration, we desperately need capable and professional medical experts who can contribute to improving the standard of medical education and Public Health throughout Afghanistan. Therefore enough attention should be given to the medical colleges.

For this reason, we have published 136 different medical textbooks from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh and Kapisa medical colleges and Kabul Medical University. Currently we are working to publish 20 more medical textbooks for Nangarhar Medical Faculty. It should be mentioned that all these books have been distributed among the medical colleges of the country free of cost.

All published medical textbooks can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org

The book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook. We would like to continue this project and to end the method of manual notes and papers. Based on the request of Higher Education Institutions, there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

As requested by the Ministry of Higher Education, the Afghan universities, lecturers & students want to extend this project to the non-medical subjects e.g. Science, Engineering, Agriculture, Economics, Literature and Social Science. It should be remembered that we publish textbooks for different colleges of the country who are in need.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise their lecture notes or written books and share them with us to be published. We will ensure quality composition, printing and distribution to the medical colleges free of cost. I would like the students to encourage and assist their lecturers in this regard. We welcome any recommendations and suggestions for improvement.

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books according to the international standards but if there is any problem in the book, we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in order to be corrected for future revised editions.

We are very thankful to German Aid for Afghan Children and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. We would also like to mention that he has provided funds for 40 other medical textbooks in the past three years which are being used by the students of Nangarhar and other medical colleges of the country.

I am especially grateful to GIZ (German Society for International Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & Development) for providing working opportunities for me during the past four years in Afghanistan.

In Afghanistan, I would like to cordially thank His Excellency the Minister of Higher Education, Prof. Dr. Obaidullah Obaid, Academic Deputy Minister Prof. Mohammad Osman Babury and Deputy Minister for Administrative & Financial Affairs Prof. Dr. Gul Hassan Walizai, Chancellor of Nangarhar University Dr. Mohammad Saber, Dean of Medical Faculty of Nangarhar University Dr. Khalid Yar as well as Academic Deputy of Nangarhar Medical Faculty Dr. Hamayoon Chardiwal, for their continued cooperation and support for this project.

I am also thankful to all those lecturers that encouraged us and gave us all these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues Ahmad Fahim Habibi, Subhanullah and Hekmatullah Aziz in the office for publishing books.

Dr Yahya Wardak

CIM-Expert at the Ministry of Higher Education, February, 2014

Karte 4, Kabul, Afghanistan

Office: 0756014640

Email: textbooks@afghanic.org

wardak@afghanic.org

Message from the Ministry of Higher Education



In history books have played a very important role in gaining knowledge and science and they are the fundamental unit of educational curriculum which can also play an effective role in improving the quality of Higher Education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and based on educational standards, new learning materials and textbooks should be published for the students.

I appreciate the efforts of the lecturers of Higher Education Institutions and I am very thankful to those who have worked for many years and have written or translated textbooks.

I also warmly welcome more lecturers to prepare textbooks in their respective fields so that they should be published and distributed among the students to take full advantage of them.

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available new and updated learning materials in order to better educate our students. Finally I am very grateful to German Committee for Afghan Children and all those institutions and individuals who have provided opportunities for publishing medical textbooks.

I am confident that this project should be continued and textbooks can be published in other subjects too.

Sincerely,

Prof. Dr. Obaidullah Obaid

Minister of Higher Education

Kabul, 2014

Book Name	Cancer and Environmental Radioactivity
Authors	Dr Nazar M Sultansei, Dr Med Haji M Sultansei, Dr M Ghazi Sultansei
Publisher	Nangarhar Medical Faculty
Website	www.nu.edu.af
No of Copies	1000
Published	2014, second edition
Download	www.ecampus-afghanistan.org
Printed by	Afghanistan Times Printing Press

This Publication was financed by German Aid for Afghan Children, a private initiative of the Eroes family in Germany.

Administrative and Technical support by Afghanic.

The contents and textual structure of this book have been developed by concerning author and relevant faculty and being responsible for it. Funding and supporting agencies are not holding any responsibilities.

If you want to publish your textbooks please contact us:

Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Kabul

Office 0756014640

Email textbooks@afghanic.org

All rights reserved with the author.

Printed in Afghanistan 2014

ISBN 1 – 893909 – 24 – 7